

Physiologie de la digestion 2 (Débuter la digestion des Bases Nucléiques)


ADN et ARN:

➤ L'ADN (acide désoxyribonucléique) et l'ARN (acide ribonucléique) sont des composants essentiels de la cellule.

➤ On retrouve l'ADN dans les noyaux des cellules eucaryotes et il contient l'information génétique, c'est-à-dire les codes nécessaires au fonctionnement des cellules.

➤ Toutes les cellules contiennent de l'ADN qu'elles soient d'origine végétale ou animale.

➤ ADN et ARN ont une structure similaire. Ils sont tous les deux constitués de pentoses et de bases azotées ou nucléiques.




ADN:

➤ L'ADN ressemble à une échelle dont les montants sont constitués de groupements phosphates et de pentose (sucre à 5 carbone).

➤ Les barreaux sont fait d'une paire de bases azotées.

➤ On dénombre 4 bases

- thymine (T),
- adénine (A),
- guanine (G)
- et cytosine (C).



ARN:


➤ L'ARN (acide ribonucléique) possède une structure proche de l'ADN et permet de sortir l'information du noyau de la cellule (transcription) et de fabriquer des protéines. On parlera alors d'ARNm ou ARN messager.

➤ L'ARN est composé d'un seul montant de groupements phosphates et de pentose (sucre à 5 carbone).

➤ Les barreaux sont fait d'une seule base azotée.

➤ On dénombre 4 bases :

- uracile (U),
- adénine (A),
- guanine (G)
- et cytosine (C).



Nucléases pancréatiques:

➤ Les nucléases pancréatiques (désoxyribonucléase et ribonucléase) vont découper l'ADN et l'ARN en nucléotides qui ne sont pas encore absorbables.

➤ Un nucléotide est en général formé d'une base nucléique, d'un sucre (pentose) et d'un phosphate.

