


Physiologie de la digestion 2

(Débuter la digestion des Lipides)


Les lipides:

- Les lipides ne peuvent être digérés en l'état en raison de leur insolubilité.
 - Ils sont constitués essentiellement de triglycérides.
- Ils se présentent à la sortie de l'estomac sous forme de gouttes plus ou moins grandes.
- La première étape va être d'émulsifier les lipides, c'est-à-dire les transformer en gouttelettes de toute petite taille.




Sels biliaires:

- L'émulsification des lipides va se faire grâce aux sels biliaires (produits par le foie et fabriqués à partir du cholestérol),
- Les sels biliaires ont comme caractéristique d'être amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils possèdent un côté hydrophile et un côté hydrophobe.
 - Ils sont donc parfaits pour émulsionner les lipides.



Emulsification des lipides:

- L'émulsification consiste à disperser sous forme de gouttelettes une substance dans une autre, c'est-à-dire des lipides dans un milieu aqueux.
- Les sels biliaires vont permettre cette transformation.




Physiologie de la digestion 2

(Débuter la digestion des Lipides)


Digestion des lipides:

- **L'émulsification grâce aux sels biliaries va rendre les lipides accessibles à l'action de la lipase pancréatique.**
- **C'est le premier rôle des sels biliaries.**
- **Dans un second temps, la lipase pancréatique va transformer (hydrolyser) les triglycérides en monoglycérides et en acides gras libres.**

Emulsification des lipides



Action de la lipase pancréatique



Formation de micelles:

- **Les acides gras vont alors former avec les sels biliaries des micelles, c'est-à-dire à nouveau des petites gouttelettes lipidiques.**
- **C'est le second rôle des acides biliaries.**
- **Le micelle possède ainsi une partie hydrophobe (l'intérieur formé des acides gras) et une partie hydrophile (extérieur grâce aux acides biliaries).**
- **Les micelles seront alors absorbables au niveau des entérocytes.**

