


Physiologie de la digestion 2

(Etage Duodénal) Rappels

- Le duodénum fait suite à l'estomac
- constitue la première partie de l'intestin grêle.
- est un carrefour d'une importance capitale:
 - **au niveau de sa seconde partie**, il reçoit **les sécrétions biliaires et pancréatiques** qui vont participer activement à la transformation du chyme.
 - **Le conduit cholédoque et le conduit pancréatique (ou canal de Wirsung)** s'abouchent au niveau de l'ampoule de Water dans le duodénum.




Bilan après l'étape gastrique

- 1- A la sortie de l'estomac, **le chyme gastrique** est particulièrement **acide**.
- 2- **La digestion des protéines** a déjà commencé et on les retrouve sous **forme de polypeptides non encore absorbables**.
- 3- **La digestion des amidons** est **partiellement réalisée sous forme de maltose (étape réalisée au niveau buccal)**. Le lactose et le saccharose n'ont pas été transformés pour l'instant.
- 4- **Les lipides** n'ont quasiment pas été digérés.

Paroi duodénale:

Pour rappel, le tube digestif est composé de 4 couches cylindriques qui sont de l'intérieur jusque vers l'extérieur :

- **La muqueuse** composée de l'épithélium, d'un chorion et de la musculaire muqueuse.
- **La sous muqueuse** constituée d'un tissu conjonctif contenant des vaisseaux sanguins, des nerfs appartenant au système sympathique.
- **La musculuse** composée de cellules musculaires lisses.
- **La tunique externe**



Les plexus de Meissner et d'Auerbach contiennent des ganglions nerveux ayant un rôle dans la motilité de l'intestin.