

L'oméprazole retarde la vidange gastrique des repas digestibles

L Benini ¹, G Castellani, E Bardelli, C Sembenini, M T Brentegani, S Caliari, J Vantini

Affiliations + développer

PMID : 8617117 DOI : [10.1007/BF02282320](https://doi.org/10.1007/BF02282320)

Résumé

Nous avons étudié la vidange gastrique d'un repas solide et réaliste (800 cal, 15 % de protéines, 45 % de matières grasses, 40 % de glucides) chez 21 sujets sains deux fois, avec et sans un prétraitement de quatre jours avec 40 mg d'oméprazole. La dernière dose du médicament a été prise 24 heures avant l'essai, afin d'éviter d'hypothétiques effets secondaires non sécréteurs du médicament. La vidange gastrique a été mesurée par ultrasons de diamètre antral. Les résultats montrent que les zones transversales antrales postprandiales basales et maximales étaient les mêmes au cours des deux essais. Une plus grande distension résiduelle de l'antra était présente tout au long de l'étude après le traitement à l'oméprazole, la différence étant significative aux moments 120 et 240. L'oméprazole a induit un retard très important dans la vidange gastrique [témoin 199,6 (12,6) vs oméprazole 230,9 (12,7) min, moyenne (1 MEB) ; $P < 0,003$]. Le retard n'était pas dû à une phase de décalage prolongée, mais plutôt à un effet sur la pente de la courbe de vidange. Cette étude montre que chez les sujets normaux, l'oméprazole retarde la vidange gastrique d'un repas solide digestible.