

PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION : LE COLON

LE COLON



- Le côlon montre sur la totalité de sa longueur des « poches » appelées, haustrations, séparées par des « creux » nommés plis semi-lunaires.
- Les bandelettes ou tenia coli sont des fibres musculaires lisses à l'origine des haustrations du côlon.

HISTOLOGIE DU COLON

- Au niveau du côlon, on ne retrouve plus de villosités intestinales.
- En revanche la muqueuse (épithélium + chorion + musculaire muqueuse) est occupée par de nombreuses cryptes de Lieberkühn.
- Les cryptes sont composées de nombreuses cellules (caliciformes en majorité et entérocytes).

L'APPENDICE

- L'appendice se situe à l'**extrémité du caecum**.
- On y retrouve de **nombreux entérocytes**, de très nombreuses **cellules endocrines** ainsi que de nombreuses **cellules immunitaires** dont **les cellules M**.
- Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agit d'un vestige laissé par l'évolution, devenu inutile désormais.
- Mais en fait, on sait désormais que **l'appendice joue un rôle très important dans les réponses immunitaires face aux pathogènes**.
- Il semblerait que l'appendice soit aussi **une réserve de bactéries commensales**.



RECTUM

- Le rectum et l'anus représentent la partie terminale du tube digestif.
- Si la paroi du rectum ressemble beaucoup à celle du côlon
- en revanche, au niveau de la **muqueuse anale**, il existe des spécificités dont **les valvules de Morgagni** qui sont des **replis longitudinaux** reliés à leur base par des replis transversaux, et dont **l'ensemble constitue la ligne pectinée**.

ANUS

- L'anus, quant à lui, est constitué de deux sphincters : un interne et un externe.
 - Le **sphincter anal interne** est **un muscle lisse** et il est **sous le contrôle du système nerveux autonome**.
 - Le **sphincter anal externe** est **un muscle strié**, **sous le contrôle de la volonté**.

