

PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION : LE COLON

DIGESTION CHIMIQUE

- Si la plupart des micronutriments sont absorbés au niveau de l'intestin grêle, **la cellulose** (polysaccharide contenu dans la paroi des végétaux) **n'a subi à l'entrée dans le côlon aucune transformation.**
- En effet, l'organisme humain ne possède **pas l'enzyme nécessaire à sa digestion : la cellulase.**
- **La cellulose** va alors **servir de substrat énergétique** à de nombreuses **espèces bactériennes** présentes dans le côlon.
- **Le résultat de cette transformation est la synthèse des acides gras à courte chaîne (AGCC) :**
 - **Butyrate**
 - **Propionate**
 - **Acétate**
- **Le butyrate** est **un AGCC** particulièrement important pour la santé intestinale :
 - **Source d'énergie pour les cellules du côlon (côlonocytes) ; son absence provoque une dégradation de ces dernières**
 - **Inhibition des cellules tumorales coliques**
 - **Anti-inflammatoires**
 - **Rôle dans la résistance à l'insuline et l'obésité**
- **L'acétate et le butyrate** agissent aussi sur la synthèse des lipides.
- **Le propionate** sert à la production de glucose.

SYNTHESE DES VITAMINES

- Au niveau du côlon, **grâce aux bactéries présentes**, l'organisme humain **produit de la vitamine B12.**
- Malheureusement, cette production intervient après le site d'absorption qui se situe au niveau de la dernière anse iléale.
- Au niveau du côlon, il y a aussi production **de vitamine K2 (facteurs de coagulation) et de vitamine B8.**