

DEFECATION

- Lorsque les fèces arrivent au niveau du rectum, l'étirement de la paroi rectale entraîne **le réflexe de défécation**.
- Pendant la défécation, les muscles du rectum se contractent. Les muscles abdominaux et le diaphragme accompagnent en se contractant aussi.
- Enfin, il y a une contraction du muscle élévateur de l'anus qui tire le canal anal vers le haut.
- Pour éliminer les matières fécales, l'ampoule rectale est dotée de récepteurs qui sont sensibles à l'étirement. Lorsqu'ils sont activés, c'est-à-dire quand l'ampoule rectale se remplit, cela provoque l'envie d'aller à la selle.
- **Le réflexe défécatoire est contrôlé par deux types de muscles :**
 - Des muscles lisses sous contrôle végétatif.
 - Des muscles striés sous le contrôle de la volonté.
- Si on ne va pas à la selle au moment où le besoin se fait sentir, il va y avoir un « combat » entre les deux systèmes et on peut perdre ce réflexe qui est très susceptible.
- Cela arrive souvent dans la petite enfance.


REFLEXE DEFECATOIRE

- Enfin la position est importante pour la défécation.
- En effet, la position assise n'est pas idéale car elle provoque une angulation qui empêche la vidange totale du rectum.


ASSIS

versus

ACCROUPI



Muscle contracté



Muscle relâché



MAUVAISE
position



BONNE
position