

L'IMPORTANCE DE LA MASTICATION

- Des centaines de publications établissent désormais un lien entre santé optimale et bonne mastication.

LA MASTICATION

- Il y a une communication permanente entre la bouche et le cerveau, notamment le centre de la satiété mais pour cela, le repas doit durer au moins 40 minutes. Cela permet aussi de comptabiliser les calories.
- Donc, il faut manger en pleine conscience, en mastiquant, en mangeant lentement et en prenant du plaisir et cela va optimiser la digestion dans son ensemble.

REEDUCATION A LA MASTICATION

- La mastication (et la déglutition) sont des automatismes.
- Une fois les mouvements appris, ces informations vont être stockées au niveau du cervelet et on fera alors ces gestes sans s'en rendre compte.
- Si l'apprentissage est mauvais, la séquence sera mauvaise et cela va donc impliquer une rééducation afin de stimuler puis de mettre en place le nouveau circuit.
- On estime qu'il faut environ 2 à 3 mois pour faire ce travail.
- Ainsi, à chaque fois que l'on mastique comme il convient, il faut y penser pour que petit à petit cela devienne des automatismes.
- Sinon les vieilles habitudes reviennent vite et on aura perdu les bénéfices des efforts précédents.

Masticatory function and its effects on general health*

Professor Minoru Nakata

First published: 06 September 2011 | <https://doi.org/10.1111/j.1875-595X.1998.tb00489.x> | Citations: 49

† Review initiated by and paper approved by the FDI Commission.

PDF TOOLS SHARE

Abstract

Summary

One of the main goals of dentistry is to preserve a lifelong healthy masticatory function. Recent studies have shown that mastication is of great importance, not only for the intake of food but also for the systemic, mental and physical functions of the body. The purpose of this review is to compile the latest scientific information concerning the relationship between mastication and general health.

Résumé

La fonction masticatoire et ses effets sur la santé générale

L'un des principaux objectifs en odontologie est de préserver la vie durant une fonction masticatoire saine. De récentes études ont montré que la mastication est d'une importance considérable, non seulement pour l'ingestion de nourriture, mais aussi pour les fonctions générales, mentales et physiques du corps. L'objectif de cette étude est de compiler les plus récentes informations scientifiques sur les rapports entre mastication et santé générale.

Relationship between cognitive function and mastication in elderly females

H. Miura, K. Yamasaki, M. Kariyasu, K. Miura, Y. Sumi

First published: 25 July 2003 | <https://doi.org/10.1046/j.1365-2842.2003.01124.x> | Citations: 67

✉ Dr Hiroko Miura, Department of Speech Therapy, Faculty of Health Science, Kyushu University of Health & Welfare, 1714-1 Yoshino-cho, Nobeoka-shi, Miyazaki 882-8508, Japan. E-mail: hmiura@phoenix.ac.jp

Résumé

Au Japon, la population âgée souffrant de démence augmente rapidement. Plusieurs études animales ont indiqué une relation entre une fonction masticatoire réduite chez le sujet âgé et une déficience cognitive. Cependant, les études épidémiologiques examinant cela ont été rares. À l'aide d'une approche épidémiologique, la présente étude a examiné cette relation chez 44 femmes atteintes et 44 non atteintes de démence, toutes âgées de plus de 65 ans. L'âge et les activités de base de la vie quotidienne, telles que la marche, l'alimentation, l'excrétion, le bain et l'habillement, ont été appariés dans les deux groupes. La déficience cognitive des sujets a été mesurée à l'aide de l'échelle révisée d'évaluation de la démence Hasegawa. La fonction masticatoire a été évaluée en fonction du nombre de dents présentes, de la force de morsure maximale, de la zone de contact occlusale et du score de mastication. Le nombre de dents présentes chez les sujets cognitivement normaux était significativement plus élevé que chez les sujets ayant une déficience cognitive ($P < 0,05$). De plus, la force de morsure maximale, la zone de contact occlusale et les scores de mastication des sujets cognitivement normaux étaient significativement plus élevés que ceux des sujets ayant une déficience cognitive ($P < 0,01$). Ces résultats suggèrent que la fonction masticatoire chez la personne âgée est associée à un état cognitif.