

BIOSYNTHESE DES HT

I⁻ + NIS + NA⁺ + ATP => dans Thyrocyte

TPO

I⁻ + PENDRINE

=> dans Colloïde

=> besoin d' AA PRECURSEUR

TYR-TG-TYR

PRECURSEUR T4 :
2x DIT (Di-iodotyrosine)

PRECURSEUR T3 :
DIT (Di-iodotyrosine) + MIT (Mono-iodotyrosine)

TG-I-
+ ENZYME
+ COFACTEUR
+ HYDROLYSE

(MIT+DIT libérées +desiodées dans le thyrocyte)

T4-T3

TBG

ORGANES CIBLES

IODE +complexe TYR -TG (Thyroglobuline) -TYR (tyrosine) + TPO
(enzyme thyroperoxydase = Tg-I- (thyroglobuline iodée))

LA PENDRINE

⇒ Transporte l'iode vers
la substance colloïde

NIS SYMPORT IODE SODIUM

⇒ Transporte l'iode via sodium
dans la thyrocyte
⇒ Transport actif nécessitant de
l'ATP

+ SODIUM NA⁺

IODE = I⁻
acheminé via la circulation
sanguine

TSH

(libéré par l'hypophyse va activer la libération
des HT

TBG (thyroxinebinding globuline)
⇒ Transporteur sanguin de T4 +T3
vers les organes cibles

CAPILLAIRE SANGUIN

COLLOIDE

POLE APICAL

THYROCYTE

Tg-I-

Tg-I- va subir une
cascade enzymatique
+ Cofacteurs
+ hydrolyse
= production

T4

T3

POLE BASAL