

1

ALLERGIES

TYPE I IMMEDIATE

- SYMPTÔMES AIGUS /MEDIÉE PAR IgE
- LIBÉRATION D’HISTAMINE
- MANIFESTATIONS CLINIQUE :
ŒDÈME, RHINITE, SÉCRÉTION DE MUCUS, DEMANGAISONS, URTICAIRE
- DIAGNOSTIC PRICK TEST
- PRISE DE SANG RECHERCHE IgE

TYPE III SYMPTOMES RETARDÉES
QQ HEURES A 2 / 3 JOURS

- SE MANIFESTE QUAND ANTIGÈNE TRAVERSE LA BARRIÈRE INTESTINALE
- PROTEINE PEUT ÊTRE ANTIGÉNIQUE SI MINIMUM 9 ACIDES AMINÉS QUI TRAVERSE CETTE BARRIÈRE CAR PERMÉABILITÉ INTESTINALE
- MEDIÉE PAR LES IgG

3

LE LAIT
LAIT & CALCIUM

Le lait de vache est très riche en calcium (13 mg/100 ml)
➢ Mais il est moins assimilable que le calcium végétal
50 à 70 % du calcium présent dans les légumes seront assimilés par l’organisme.
Les produits laitiers sont riches en acides aminés branchés (BCAA) dont la leucine :

➢ Les protéines du petit-lait (whey, 14%),
➢ les caséines (10%)
➢ Le lait écrémé en poudre en contient près de 3g pour 100 g de lait

En excès, la leucine, est pro-inflammatoire
➢ **Active la voie mTor**
➢ **Activée en excès , la voie mTor devient pro-inflammatoire**

MALADIE COELIAQUE

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune
➢ Provoque une destruction des villosités intestinales (atrophie villositaire). L’intestin devient dysfonctionnel et ne peut plus absorber correctement l’ensemble des nutriments. le gluten est découpé par des enzymes dont la transglutaminase , personnes prédisposées =réaction système immunitaire fabrication

➢ Les personnes atteintes de maladie cœliaque souffrent de carences et déficiences,le Fer, calcium et acide folique (vitamine B9).
Traitement : ÉVICTION TOTALE DE TOUT ALIMENT AVEC PROTÉINES DE BLÉS.

ALLERGIES & INTOLERANCES

REEMPLACER LE LAIT

Par les légumes :	Légumes verts (épinards, blettes, haricots verts, salades...) Crucifères (chou, chou-fleur, brocoli, chou kale...)
Par les oléagineux	Amandes, noix, noisettes
Par les laits végétaux	Amande, noisette, riz, quinoa
Par les sardines	A la condition de manger les arêtes
Par les algues	Kombu, Wakamé
Par les eaux minérales riches en calcium	Contrex, Hepar, Courmayeur, Chateldon

2

INTOLERANCES

LACTOSE

ENZYME LACTASE MANQUANTE
DIFFICULTE A LE DIGÉRER

SABOE

SEIGLE - AVOINE
BLE -ORGE -EPEAUTRE

Céréales	Prolamines	Gluténines
Avoine	Avénines	Gluténines
Blé	Gliadines	Gluténines
Orge	Hordéines	Gluténines
Seigle	Sécalines	Gluténines

LE GLUTEN

COMPOSER DE 2 PROTÉINES
1-GLIADINES= ÉLASTICITÉ
(famille des prolamines)
2-GLUTENINES= EXTENSIBILITÉ

LE BLÉ (HYBRIDATION POUR PLUS DE PRODUCTION :
Blé diploïde (blé ancestral)
Blé tétraploïde (blé dur)
Blé tetraploïde (blé tendre)
Le petit épeautre contient moins de gluten que le blé dont plus digeste ainsi que l’Avoine variété “Nave”.
AUTRES CEREALES PAS DE GLUTEN
➢le teff ➢ le mil ➢ le maïs
➢ le sorgho ➢ le riz ➢ L’amarante,
➢Legumineuses➢le quinoa ➢le sarrasin

LE GLUTEN & ZONULINE

La zonuline est une protéine produite par les entérocytes, impliquée dans la régulation de la perméabilité intestinale.
• la zonuline est considérée comme un biomarqueur de la perméabilité intestinale. la consommation de gluten peut entraîner une augmentation de la zonuline. **PROLAMINES ET GLIADINES stimulent la production de zonuline ouvrent les jonctions serrées =reponse inflammatoire par les macrophages et reactions immunitaires.**
Résultat :
• **Les jonctions serrées entre les cellules de la paroi intestinale s’ouvrent trop.**
• **Cela peut provoquer ce qu’on appelle un “intestin perméable” (ou leaky gut).**
• **Des substances non digérées ou toxiques peuvent passer dans le sang → ce qui peut entraîner inflammation, allergies, troubles auto-immunes, etc.**
➢ Son dosage peut être effectué dans le sang/selles.