

■ Fiche de Révision – Les Associations Alimentaires

1■■■ Fondements

Chaque aliment demande un milieu (pH) et un temps de digestion spécifique. Objectif : optimiser la digestion, éviter les fermentations, gaz, acidité et fatigue postprandiale. Inspiré des travaux du Dr Howard Hay et du Dr Shelton.

2■■■ Temps de digestion des aliments

Catégorie	Temps de digestion
Eau / jus	15–30 min
Fruits	15–35 min
Crudités / légumes cuits	30–50 min
Féculents / grains	1h–1h30
Légumineuses	1h30–2h
Produits laitiers	1h30–2h
Graines / oléagineux	2h–3h
Œuf entier	45 min
Poisson	30 min–1h
Volaille	1h30–2h
Viande rouge	3h–5h

■ Astuce : consommer les fruits 30 min avant ou 3 h après les repas.

3■■■ Milieu acido-basique

- Féculents : digestion alcaline (amylases, pH ~7)
- Protéines : digestion acide (acide chlorhydrique, pH ~2)
- **Éviter** : protéines + féculents → neutralisation → fermentation et ballonnements.
- **Préférer** : Féculents + légumes ou Protéines + légumes.

4■■■ Classification des aliments

Catégorie	Exemples
Protéines fortes	Viandes, poissons, œufs, fromages cuits
Protéines faibles	Légumineuses, soja, tofu, graines, oléagineux
Protéines lactées	Fromages frais, yaourts, chèvre/brebis
Amidons forts	Céréales à gluten (blé, orge, seigle, maïs)
Amidons faibles	Riz, quinoa, sarrasin, légumes amyliacés

Fruits acides	Agrumes, kiwi, ananas
Fruits mi-acides	Pomme, poire, pêche
Fruits doux	Banane, datte, figue, raisin

5■■■ Roue des associations alimentaires

- 1■■■ Légumes verts et colorés : s'associent avec tout.
- 2■■■ Protéines fortes + amidons faibles (+ légumes).
- 3■■■ Protéines faibles + amidons forts/faibles (+ légumes).
- 4■■■ Protéines lactées + fruits ou seules.
- 5■■■ Fruits crus hors repas.
- 6■■■ Melon, pastèque, miel → seuls.

6■■■ Exemples de repas équilibrés

- Poulet + haricots verts + salade
- Poisson + crudités
- Riz complet + lentilles + légumes vapeur
- Fromage frais + salade ou fruits (hors repas)
- Fruits seuls au goûter (banane + amandes)

7■■■ Conseils naturopathiques

- 50 % de légumes dans l'assiette.
- Mâcher lentement, favoriser la digestion enzymatique.
- Éviter les repas copieux et combinés.
- Alternier repas protéiques et végétariens.
- Écouter ses signaux digestifs : lourdeur, somnolence, gaz...