

HE de Gingembre

Nom latin : Zingiber officinale

Famille botanique : Zingiberaceae

partie utilisée : rhizome

procédé d'extraction : distillation par entraînement à la vapeur d'eau.

odeur fraîche : gingembre frais

odeur chaude : " " sec

Composition Biochimique :

- Sesquiterpènes (50-60%) : α -zingibèrene, β -sesquiphellandène, β -bisabolène, α -cucumène, α -faunésène, α -phellandène, muurolène. (mult HE gingembre séché).
- monoterpènes (15-25%) : camphène, α -pinène, limonène.
- oxydes : 1,8 énéole.
- sesquiterpénols (4-6%) : zingibérol
- Monoterpénols (2-4%) : bornéol, géraniol, linalol, citronellol
- aldéhydes monoterpéniques (1-3%) : géraniol
- voir des cétones monoterpéniques.

Propriétés :

- * anti-infectieuse : (bactéries et champignons).
- * immunomodulatrice
- * stimulante digestive +++, antitumorale, antinauséeuse

- * anti inflammatoire, antalgique, antispasmodique ++
- * antitussive
- * expectorante
- * décongestionnante veineuse ; lymphatique et prostatique
- * Régénérante tissulaire
- * anti hypertensive
- * antioxydante
- * réchauffante
- * sudorifique
- * facilite l'élimination des toxines et réduit les risques d'intoxication alimentaire (surtout les produits avec de l'eau)
- * tonique générale
- * tonique sexuelle, surtout masculine ++
- * relaxante
- * aide à la prise, à traverser les crises, à transformer les peurs et à stimuler la créativité.

Peut être utilisé pour tout ce qui est digestif : inappétence, nausées (dont maux des transports, et en olfaction pour les nausées de femmes enceintes), flatulences, constipation.

pour douleurs articulaires, rhumatismes, musculaires, etc...

abcès dentaires, ou dentologie, toutes sortes de douleurs

En application locale (et diluée) pour tout ce qui est douleurs.

Système reproducteur : douleurs menstruels, de la ménopause, en cas d'impuissance ou de frigidité

Travaille sur les méridiens des reins et de la vessie.

penurie les mucosités

en cas de chute de cheveux (facilité la microcirculation et stimule)

troubles de la concentration

Précaution d'emploi :

par précaution : femmes enceintes (en dessous de 3 mois) et enfants ≤ 3 ans

Déconseillée si prise d'anticoagulants (l'HE est fluidifiante)

en applicat° locale (diluée dans une HV par précaution), par voie orale, diffusion.