

Fiche plante : *Tripterygium wilfordii* (Vigne du tonnerre divin)

Famille : Célastracées

Origine : Chine, principalement provinces du Hunan, Sichuan, Yunnan.

Parties utilisées : Écorce de racine (radix *Tripterygium wilfordii*), parfois feuilles purifiées.

Principes actifs majeurs

- **Triptolide** : diterpène époxy très actif, responsable de la majorité des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs.
- **Triptiolide, triptonide, celastrol** : molécules secondaires à action antioxydante et cytomodulatrice.
- **Glycosides du *Tripterygium*** : formes purifiées utilisées en pharmacopée chinoise (*Tripterygium glycosides*).

Actions et propriétés

- Anti-inflammatoire puissant : inhibition de $\text{TNF-}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$, IL-6 , et du facteur $\text{NF-}\kappa\text{B}$.
- Immunomodulatrice : régule la prolifération lymphocytaire T et B, réduit les auto-anticorps.
- Antioxydante : protection cellulaire contre le stress oxydatif et la fibrose tissulaire.
- Antidouleur : action sur la douleur articulaire et viscérale liée à l'inflammation chronique.
- Antifertile : inhibition temporaire de la spermatogenèse et de l'ovulation à forte dose.
- Antitumorale (expérimental) : induction d'apoptose dans diverses lignées cancéreuses (sein, pancréas, côlon, poumon).

Indications principales

- Maladies auto-immunes et inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux, spondylarthrite ankylosante, psoriasis, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique.
- Douleurs chroniques et inflammation articulaire persistante.
- Recherche clinique sur les cancers et fibroses chroniques.

Posologie et formes d'usage

Seuls les extraits standardisés purifiés (*Tripterygium glycosides*) sont utilisés en médecine chinoise : 10–30 mg/jour selon protocole, pendant 4 à 8 semaines maximum.

En Europe, usage réservé à la recherche ou aux praticiens formés à la pharmacopée chinoise. Vente libre très rare.

Contre-indications et précautions

- Grossesse, allaitement, désir de conception (effet antifertile).
- Insuffisance hépatique ou rénale.
- Traitements immunosuppresseurs en cours (interaction possible).
- Cure supérieure à 8 semaines sans encadrement médical.

- Utilisation de parties non purifiées de la plante (toxicité hépatique).

Alternatives plus sûres pour l'entretien

- **Curcuma longa** : anti-inflammatoire et antioxydant global.
- **Boswellia serrata** : comparable à la mésalazine, sans effet immunosuppresseur.
- **Prunella vulgaris** : régulation douce de l'immunité auto-immune.
- **PEA (palmitoylethanolamide)** : alternative non immunosuppressive pour Crohn et RCH.