

NAFLD & NASH

LITHIASSE BILIAIRES

1 Définitions simples

NASH = Non-Alcoholic SteatoHepatitis

👉 **stéatose + inflammation + destruction cellulaire**, NASH = forme inflammatoire et agressive du NAFLD.

NAFLD = NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE , STEATOSE HEPATIQUE NON ALCOOLIQUE (en français) **Accumulation de graisse dans les cellules du foie, Foie gras sans inflammation ni destruction cellulaire.**

2 Où se place NAFLD/NASH dans ton tableau ?

NAFLD et NASH sont des pathologies de cytolysé hépatique, pas de cholestase.

→ Le problème principal est la souffrance et la destruction des hépatocytes, pas l'écoulement de la bile.

3 Lecture biologique

Paramètre	NAFLD	NASH
Transaminases (ALAT/ASAT)	N ou ↑ léger	🔥 ↑↑↑
Gamma-GT	↑ modéré	↑
Phosphatases alcalines	N	N ou ↑
Bilirubine	N	N ou ↑ tardif
Ferritine / Fer	↑	↑↑
LDH	N	↑
Cholestérol, TG	↑	↑↑
TP, Albumine	N	N (jusqu'aux stades avancés)
Vitamines A-D-E-K	N	parfois ↓ (si cholestase secondaire)

4 Logique physiopathologique

NAFLD STEATOSE SIMPLE

- Graisse stockée dans l'hépatocyte
- Peu ou pas de destruction cellulaire
- Cytolyse faible ou absente


NASH FORME GRAVE

- Graisse + stress oxydatif + inflammation
- Destruction des hépatocytes
- Cytolyse chronique élevée
- Peut évoluer vers fibrose → cirrhose → cancer du foie

Facteurs favorisants = diabète de type 2 , obésité , hyperlipidémie (trop de triglycérides) donc albumine = bas , HDL = bas , triglycérides = très haut +++, première cause d'élévation des transaminases chez l'obèse , volume du foie très important.

OBJECTIF EN NATUROPATHIE AGIT CAUSES DU SYNDROME MÉTABOLIQUE

Voir cours cardio pathologie.



5 Ce que montre une prise de sang

Profil biologique	Interprétation
Graisses $\uparrow$ + transaminases peu élevées	NAFLD
Transaminases très élevées + ferritine $\uparrow$ + LDH $\uparrow$	NASH

6 En résumé

NAFLD	NASH
Foie gras simple	Foie gras inflammatoire
Cytolyse faible	Cytolyse forte
Réversible	Peut évoluer vers fibrose
Métabolique	Métabolique + inflammatoire

DIFFÉRENCE CHOLESTASE / CYTOLYSE	Cholestase	Cytolyse
Problème principal	La bile ne sort pas, BILE ÉPAISSE	Les cellules du foie meurent
Marqueurs clés	PAL, GGT, bilirubine	ALAT, ASAT
Mécanisme	Blocage des voies biliaires	Destruction des hépatocytes



Différence clé

	NAFL (stéatose simple)	NASH
Graisse	Oui	Oui
Inflammation	✗ Non	✓ Oui
Cytolyse	✗ Non	✓ Oui
Fibrose	✗ Non	✓ Oui
Risque de cirrhose	Très faible	Élevé
Risque de cancer	Non	Oui

ACCOMPAGNEMENT EN PHYTOTHÉRAPIE

→ Vérifier si traitement en cours et interaction médicamenteuse

→ Vérifier si antécédents de calculs biliaires car si calculs de pas aller vers les plantes stimulant la production de bile (cholérétique) par peut déboucher sur pancréatique.

→ travailler sur phase 1 et phase 2

	CHOLÉRÉTIQUE	CHOLAGOGUE	PHASE I	PHASE II	HEPATO PROTECTEUR	NASH
ROMARIN	+	+	+	++	++	++
ROMARIN JEUNE POUSSE	+++	+++	+	++	+++	+++
GENEVRIER JEUNE POUSSE	++	++	--	+++	++	++
CHRYSANTELLUM AMERICANUM				+	++	++
SANDRA			++	+		++++

D'après LPEV

LITHIASSE BILIAIRES

1 DEFINITION

Calculs qui se forment dans la vésicule biliaire / diagnostic échographie asymptomatique ou douleurs côtés en haut a droite abdomen.

Peut boucher le canal pancréatique et provoquer une pancréatite .

2 CAUSES ET FACTEURS AGGRAVANTS


- Diabète
- age avancé
- Grossesse multiples
- Terrain
- Obésité
- Variation de la composition chimique de la bile (cholestérol calcifié)

3 QUESTIONS A POSER

- « Y-a-t-il des calculs biliaires dans votre famille? »
- « Avez-vous encore votre vésicule biliaire? »
- « Quel est votre taux de cholestérol? »
- « Vos selles sont-elles grasses ? »
- « avez-vous encore ta vésicule ? »
- « avez-vous des calculs connus ? »
- « avez-vous des douleurs après un repas gras ? »

4 ANALYSE BIOLOGIQUE

= LES ACIDES BILIAIRES, evaluation de la qualité de la bile. **Laboratoire LIMS**



ACIDES BILIAIRES PRIMAIRES				
CA	Acide cholique	0.01	µmol/L	0.01 - 0.4
CDCA	Acide chénodésoxycholique	0.008	µmol/L	0.017 - 0.45
ACIDES BILIAIRES SECONDAIRES				
DCA	Acide désoxycholique	0.15	µmol/L	0.06 - 0.45
LCA	Acide lithocholique	0.009	µmol/L	0.002 - 0.022

ACIDES BILIAIRES CONJUGUÉS				
GCA	Acide glycocholique	0.017	µmol/L	0.02 - 0.25
AGCDCA	Acide glycochenodésoxycholique	0.006	µmol/L	0.11 - 1.35
TCA	Acide taurocholique	0.017	µmol/L	0.03 - 0.775
ACIDES BILIAIRES TERTIAIRES				
UDCA	Acide ursodésoxycholique	0.013	µmol/L	0.004 - 0.085

Carence en fer ?

Carence en vitamine B3 ?

Manque de cholestérol ?

Dysbiose ?

Malabsorption des vitamines ADEK ?

Manque de L-glycine ou taurine ?

ACCOMPAGNEMENT NATUROPATHIQUE

« Ne pas prescrire de plantes hépatiques au risque de provoquer la migration des calculs »

→ La majorité des plantes dites « hépatiques » sont : cholérétiques et cholagogues c'est-à-dire qu'elles augmentent la production de bile et la contraction de la vésicule biliaire. Cela provoque une vidange de la vésicule.

Or si des calculs sont présents :

- la contraction peut expulser un calcul
- qui peut bloquer le canal cystique ou le cholédoque

→ provoquant :

- ✓ colique hépatique
- ✓ cholécystite
- ✓ pancréatite aiguë (mortelle dans 5–10 % des cas)

La vésicule biliaire se contracte sous l'effet de la cholécystokinine (CCK).

Les plantes cholagogues stimulent cette voie.

Quand la vésicule se contracte → la pression intra-vésiculaire augmente → les calculs migrent.

Exemples de plantes dangereuses AVEC calculs

Toutes ces plantes sont cholagogues :

Plante	Effet
Artichaut	↑ contraction de la VB
Radis noir	↑ éjection biliaire
Chardon-Marie	↑ flux biliaire
Bolda	↑ pression biliaire
Pissenlit	↑ bile
Desmodium	cholérétique

👉 Chez une personne avec lithiases = risque réel de colique et pancréatite

🔪 Après ablation de la vésicule (cholécystectomie)

Sans vésicule :

- ✓ la bile coule en continu
- ✓ elle est moins concentrée
- ✓ la digestion des graisses est souvent insuffisante
- ✓ les selles deviennent parfois grasses (stéatorrhée)

Dans ce cas, on peut :

- ✓ améliorer la qualité de la bile
- ✓ soutenir la digestion lipidique
- ✓ soutenir le foie

⚠ Conclusion scientifique

Situation	Plantes hépatiques
Calculs présents dans la vésicule	✗ CONTRE-INDIQUÉ
Calculs expulsés ou VB retirée	✓ souvent utiles
Cholestase	⚠ prudence
NASH / stéatose	✓ souvent indiquées
