


SOMMAIRE


- I. Introduction
- II. Pathologies rénales
 1. Rappels d'anatomie physiologie
 2. Cystite
 3. Calculs rénaux
- III. Pathologies génitales de l'homme
 1. Rappels d'anatomie physiologie
 2. Déficit androgénique lié à l'âge (DALA)
 3. Hypertrophie bénigne de la prostate
 4. Prostatite

INTRODUCTION

Pour toutes les pathologies, nous verrons :

- La définition
- Les symptômes
- Le diagnostic
- Les causes possibles
- Les questions à poser en consultation
- Les bilans recommandés
- Les traitements allopathiques
- L'accompagnement naturopathique







6


PATHOLOGIES RENALES

Rappels d'anatomie-physiologie



ROLES DES REINS


- **Filtration glomérulaire** (eau + solutés plus petits que les protéines)
- **Réabsorption tubulaire** (eau, glucose, acides aminés, ions dont Ca^{2+})
- **Sécrétion tubulaire** (ions H^+ et K^+ , créatinine)
- **Maintien de l'équilibre électrolytique et du pH**
- Production d'**urine**
- Production de **rénine physiologie**,
- Production d'**érythropoïétine**




CYSTITE

	CYSTITE
Définition	Inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse de la vessie .
Symptômes	Douleurs supubienne, brûlures à la miction , mictions fréquentes avec émission de seulement quelques gouttes d'urine. Contient parfois du sang. Fièvre si passage à une infection des voies urinaires.
Diagnostic	Basé sur la clinique. Examen cytot bactériologique des urines (ECBU) si indication donnée par le médecin.

Causes possibles




MIEUX COMPRENDRE LA CYSTITE



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « A quelle fréquence avez-vous des cystites ? »
- « Vous soignez-vous avec des antibiotiques d'une manière générale et pour vos cystites ? »
- « Avez-vous réalisé un ECBU dernièrement ? »
- Intéressez-vous de près au système digestif.

Menez l'enquête - Les liens entre les systèmes



Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- Le bilan du statut en acides gras pour évaluer l'inflammation avec le **rapport AA/EPA**
- **La zonuline** pour évaluer la perméabilité intestinale
- Le microbiote intestinal pour évaluer la diversité du microbiote

Ce que l'on peut proposer :



En allopathie

OBJECTIF

Éliminer les germes pathogènes au niveau de la vessie

Antibiotiques

En général très efficace mais peut destabiliser la flore intestinale

En naturopathie



OBJECTIF

Éliminer les germes pathogènes au niveau de la vessie de façon à **éviter les récives** en rééquilibrant la flore intestinale et en renforçant la barrière intestinale

Différent selon s'il s'agit d'une **cystite aigüe ou chronique**

Moins efficace que les antibiotiques mais préserve la flore intestinale

Ce que l'on peut proposer en naturopathie :

CAS 1 : CYSTITES AIGÜES

✓ Le consultant est sous antibiotiques :

Proposer un probiotique pour limiter la perturbation du microbiote intestinal

✓ Le consultant n'est pas sous-antibiotiques :

Proposer un complexe en **AROMATHERAPIE (HE antibactériennes)** à prendre par voie orale dès les premiers symptômes


Stimulation des reins



+

PHYTOTHERAPIE = plantes diurétiques = piloselle, orthosiphon, reine des prés

D-Mannose




Complément à base de **canneberge**



Sauna fortement déconseillé car économise les reins

D-Mannose = sucre endogène possédant comme récepteurs des points d'ancrage des **bactéries E.COLI**.¹⁸

Son mécanisme d'action : inhibition de l'adhérence des **bactéries E.COLI** à l'endothélium vésical. Les bactéries se retrouvent piégées et sont ensuite éliminées dans les urines.



Exemples de complexes aroma :

APPORTS NUTRITIONNELS	POUR 1 CAPSULE	POUR 3 CAPSULES
Huile de cameline	440 mg	1320 mg
Huile essentielle de girofle	18 mg	54 mg
Huile essentielle de cannelle	18 mg	54 mg
Huile essentielle d'origan	18 mg	54 mg
Huile essentielle de citron	5,3 mg	16 mg

D'après LPEV

Ingrédients

- Son de riz (Belgique) - Silice
 - HE Cannelle, rameaux (*Cinnamomum zeylanicum*) - (non UE)
 - HE Pamplemousse, écorces (*Citrus paradisi*) - (non UE)
 - HE Origan, plante entière (*Origanum compactum*) - (Espagne)
 - HE Tea tree, feuilles (*Melaleuca Alternifolia*) - (non UE)
 - HE Clou de girofle, clous (*Syzygium aromaticum*) - (non UE)
 - HE Thym, sommités fleuries (*Thymus vulgaris* L. *linalol*)
 - HE Basilic, parties aériennes (*Ocimum Basilicum*) - (non UE)
 - HE Romarin, sommités fleuries (*Rosmarinus cinéole officinalis*) - (non UE)
- Enveloppe de la gélule marine (gélatine de poisson)

D'après Biophenix

Exemples de complément à base de canneberge :

Informations nutritionnelles moyennes pour 3 cuillères à café (environ 15 ml)		
Macérât aqueux de plantes dont :		
Feuille de busserole		450 mg
Sommité fleurie de bruyère		450 mg
Queue de cerise		450 mg
Feuille de bouleau		450 mg
Racine de chiendent		450 mg
Extrait de canneberge		240 mg
titré en proanthocyanidines		36 mg (PAC)
Ellirose™ : Extrait breveté d'hibiscus		200 mg
dont polyphénols		100 mg
Jus concentrés dont :		
Carotte		180 mg
Betterave		127 mg
Canneberge		127 mg

D'après COPMED

[https://www.laboratoire-lescuyer.com/nos-actifs/d-](https://www.laboratoire-lescuyer.com/nos-actifs/d-mannose#:~:text=Les%20bienfaits%20du%20D%2Dmannose,la%20paroi%20de%20la%20vessie.)

[mannose#:~:text=Les%20bienfaits%20du%20D%2Dmannose,la%20paroi%20de%20la%20vessie.](https://www.laboratoire-lescuyer.com/nos-actifs/d-mannose#:~:text=Les%20bienfaits%20du%20D%2Dmannose,la%20paroi%20de%20la%20vessie.)

Ce que l'on peut proposer en naturopathie - CAS 2 : CYSTITES CHRONIQUES

- **Éliminer les germes pathogènes au niveau de l'intestin de façon durable avec :**
 1. **Alimentation anti-inflammatoire et alcalinisante**
 2. **« Nettoyage » de l'intestin** à chaque changement de saison. Préconisations à adapter en fonction du système digestif du consultant (Argile, Chlorophylle, Aloe Vera, Charbon végétal...)
 3. **Renforcement de la barrière intestinale** (L-glutamine, Zn, L-thréonine, Quercétine, vitamine A,...)
 4. **Stimulation de la peau** hors phase aiguë si terrain acidifié (Sauna)
 5. **Maintien d'une flore intestinale équilibrée** dans le temps (symbiotiques alimentation + complément)

Exemples d'aliments prébiotiques :

Prébiotiques = fibres = glucides non digestibles fermentés par les bactéries intestinales


Fructanes (inuline)	Amidons résistants	Béta-glucane
Chicorée Ail Topinambour Poireau Artichaut Banane	Légumineuses Banane peu mûre Pommes de terre Céréales complètes (Cuites puis refroidies +++)	Paroi des céréales (Avoine +++)
Favorisent la synthèse de butyrate	Régulent la glycémie, effet satiétogène	Favorisent la synthèse de butyrate

Livre, Les erreurs qui vous empêchent de maigrir


CALCULS RENaux

Calculs rénaux (ou lithiases urinaires)

	CALCULS RENaux
Définition	Calculs qui se forment dans les reins et qui peuvent migrer dans les uretères et la vessie . Proviennent de la concrétion de substances présentes en solution dans l'urine. Oxalate de calcium ou phosphate de calcium et plus rarement acide urique .
Symptômes	Asymptomatique ou douleur intense dans le bas ventre et le dos. Hématurie .
Diagnostic	Radiologie



Causes possibles



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « A quelle fréquence avez-vous des calculs ? »
- « Avez-vous fait des coliques néphrétiques récemment et dans le passé ? »
- « Connaissez-vous ta taille et la nature de vos calculs ? »
- « Etes-vous sujet aux infections urinaires ? »
- Evaluer l'équilibre acido-basique du consultant. A-t-il des signes d'acidification ?
- Si pas d'analyses, renvoyer chez un néphrologue pour avoir à minima le calcium, l'acide urique et la PTH.

Ce que l'on peut proposer :



En allopathie

OBJECTIF

Éliminer les calculs et prévenir la formation de nouveaux calculs

Petits calculs (< 5 mm) : s'éliminent spontanément par les voies naturelles.

Gros calculs d'acide urique : dissous par des médicaments rendant les urines alcalines.

Autres calculs : ablation chirurgicale, lithotripsie extracorporelle (les calculs sont pulvérisés par des ondes de choc) + endoscopie.


Boire abondamment (sauf en cas de colique néphrétique) et régime évitant les substances présentes dans les calculs.

Éviter les aliments :

- Riches en **acide oxalique** : épinards, amandes, persil, rhubarbe, betterave...
- Riches en **acide urique** : protéines animales, crevettes, champignons, tofu, spiruline

70

	Hypercalciurie	Hyperuricémie	Hyperparathyroïdie	Adénome de la prostate (HBP)
Définition	Augmentation anormale de la quantité de calcium excrétée dans les urines	Augmentation du taux d'acide urique dans le sang	Excès de sécrétion de PTH	Tumeur bénigne de la partie centrale de la prostate
Causes	Trouble de réabsorption tubulaire du Ca, hyperabsorption intestinale du Ca	Perturbation du métabolisme des bases puriques, régime alimentaire trop riche en purines	Primaire : Dérèglement d'une ou plusieurs glandes parathyroïdes Secondaire : hypocalcémie et/ou hyperphosphorémie	Touche 85 % des hommes entre 60 et 70 ans
Traitement allopathique	Régime alimentaire pauvre en Ca, diurétiques thiazidiques	Régime dépourvu de purines, médicaments hypo-uricémiants	Ablation de l'adénome parathyroïdien, vitamine D, médicaments pour baisser le taux de phosphore	Alphabloquant, inhibiteurs de la 5-alpha-réductase ou chirurgie



Ce que l'on peut proposer en naturopathie en curatif :

- ✓ Le consultant a des calculs < 5 mm et il n'en souffre pas

OBJECTIF

Evacuer les calculs par les voies naturelles

- **HYDROTHERAPIE** : bain chaud pour dilater les uretères
- Boire 2 à 3 L d'eau faiblement minéralisée (Mont Roucou, Rosée de la Reine)

⊘ Sauna fortement déconseillé car économise les reins



- ✓ Le consultant a des calculs et il en souffre (= coliques néphrétiques)

OBJECTIF

Soulager la douleur

- En complément des traitements allopathiques (anti-inflammatoires, anti-douleurs)
- **HYDROTHERAPIE** : bain chaud pour dilater les uretères

Ne surtout pas boire



Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif :

- ✓ Le consultant a des calculs rénaux de façon chronique

OBJECTIF

Comprendre l'origine des calculs et éviter la formation de nouveaux calculs en retrouvant un équilibre acido-basique

Traitement allopathique en fonction de la cause + **rééquilibrage acido-basique** en fonction de la forme et la nature des calculs.

Calculs arrondis = phosphates et carbonates → urine alcaline

Calculs pointus = urates et oxalates → urine acide



Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif :

Informations nutritionnelles moyennes pour 3 cuillères à café (15 ml)

Extrait de fleur de bruyère

Extrait de feuille de myrtille

Extrait de feuille de romarin

Extrait de feuille de thym

Extrait de vinaigre de cidre

Phosphore



D'après COPMED

• Si urine alcaline :

Cure d'eau distillée régulières

• Si urine acide :

Alimentation alcalinisante (avec cures de jus de citron régulières)

Stimulation de la peau (Sauna)


Stimulation plusieurs fois par an des reins avec plantes diurétiques

II. PATHOLOGIES GENITALES DE L'HOMME


Rappels d'anatomie-physiologie : La prostate

ROLES DE LA PROSTATE


- Produire le liquide prostatique qui permet la survie, la maturation et la mobilité des spermatozoïdes, produits par les testicules
- Permettre l'éjaculation




TESTOSTERONE = principale représentante des hormones androgènes



TRANSPORT ET REGULATION DE LA TESTOSTERONE




D'après COPMED



SHBG et Albumine = protéines de transport de la testostérone

SHBG = Sex Hormone Binding Globulin Testosterone libre = testostérone active qui permet la majorité des effets androgéniques chez l'homme

✓ Equilibre fragile entre testostérone, DHT et œstrogènes




EVALUATION DU STATUT EN TESTOSTERONE

Dosage du FAI (Free Androgen Index) = $100 \times (\text{testostérone totale} / \text{SHBG})$

✓ Plus de la moitié des hommes ont un déficit en testostérone après 70 ans

- ⇒ Baisse de libido, dysfonction érectile, perte de masse musculaire au profit de la masse grasse.
- ⇒ Augmente le risque de maladie cardio-vasculaire, ostéoporose et maladies inflammatoires

<https://www.julienvenesson.fr/conservez-naturellement-un-taux-de-testosterone-eleve/42>



DEFICIT ANDROGENIQUE LIE A L'AGE (DALA)

	DALA
Définition	Syndrome clinique associé à l'avancée en âge , marqué par une altération de la qualité de vie et/ou la fonction de certains systèmes. Dû à une baisse anormale et constante des androgènes sanguins, parfois associé à une perte de sensibilité à la testostérone.
Symptômes	Perte de force et masse musculaire, augmentation de l'adiposité viscérale, perte de densité osseuse, perte de libido, troubles du sommeil, sueurs,...
Diagnostic	Clinique et FAI < 30

Tableau 1 : Signes et symptômes du déficit androgénique lié à l'âge

Symptômes	Signes
↓ force musculaire et/ou endurance	↓ progressive de la masse musculaire
↓ performance professionnelle ou athlétique	↑ adiposité viscérale
↓ taille, fractures	↓ BMD (ostéoporose)
↓ pilosité pubienne et axillaire	Fracture vertébrale ou de hanche
↓ fonction physique	↓ pilosité pubienne et axillaire
↓ intérêt sexuel et désir	↓ taille des testicules
↓ force des érections	Gynécomastie
Fatigue, lassitude, manque d'énergie	Humeur dépressive
Irritabilité, humeur dépressive	Anémie normocytaire et normochrome
↓ bien être, joie de vivre	
Troubles du sommeil	
Sueurs, bouffées de chaleur	
Difficultés de concentration	




D'après COPMED


Questions a poser

1. Avez-vous constaté une diminution de votre libido (désir d'avoir des rapports sexuels) ?
2. Sentez-vous un manque d'énergie ?
3. Sentez vous une diminution de force musculaire et d'endurance à l'effort ?
4. Avez-vous remarqué que vous avez rapetissé ?
5. Avez-vous remarqué une diminution de votre joie de vivre ?
6. Vous sentez vous triste et/ou grincheux ?
7. Vos érections sont-elles moins fortes ?
8. Avez remarqué une diminution de votre capacité a faire du sport ?
9. Tombez-vous endormi après le repas ?
10. Avez remarqué ne diminution récente de votre capacité de travail ?

Conduite à tenir devant une suspicion d'hypogonadisme



Causes possibles



Exemple de questionnaire

Signes et symptômes d'un déficit en testostérone				
J'ai moins de libido, de puissance sexuelle et de potentiel sexuel	0	1	2	3
Je ressens de la fatigue, de la lassitude	0	1	2	3
J'ai moins de force musculaire, d'endurance	0	1	2	3
Ma pilosité diminue	0	1	2	3
Mon visage est plus pâle, moins musclé, plus ridé qu'avant	0	1	2	3
J'accumule de la graisse au niveau des seins	0	1	2	3
J'ai tendance à engraisser au niveau du ventre	0	1	2	3
Je vois moins bien de près	0	1	2	3
J'ai la peau sèche	0	1	2	3
Je suis sujet aux infections	0	1	2	3
Uniquement pour les hommes				
J'ai des troubles urinaires : besoins impérieux, je me lève la nuit, diminution du jet	0	1	2	3

Score < 10 : pas d'insuffisance en testostérone cliniquement décelable.

10 < score < 20 : insuffisance débutante en testostérone probable

Score > 20 : insuffisance en testostérone très probable, à explorer avec le médecin traitant.

Médicaments qui augmentent la SHBG via l'augmentation de la prolactine:


- Antipsychotiques (à la fois typiques et atypiques)
- Antidépresseurs (ISRS, tricycliques, MAO-Is)
- Xanax et Buspar
- Antagonistes H2 (cimétidine, ranitidine)
- Morphine
- Certains antihypertenseurs

Médicaments qui augmentent la SHBG:

- Raloxifène (Evista)
- Tamoxifène
- Spironolactone
- Anticonvulsivants (phénytoïne)
- Estradiol oral (mais pas transdermique)
- Ethinylestradiol (contraceptifs oraux)
- Metformine
- Insuline exogène dans le diabète de type 2
- Café!


Médicaments qui suppriment la SHBG:

- Progestatifs
- Glucocorticoïdes
- Insuline exogène dans le diabète de type I




D'après COPMED

Testostérone, cortisol, cholestérol




<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880087/>



<https://ordoscopie.fr/a-quelle-heure-prendre-les-statines/>

Testostérone et surpoids



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Avez-vous fait un bilan hormonal (cholestérol, testostérone, SHBG, DHEA...) ? »
- « Etes-vous sous statines ? »
- « Avez-vous un traitement androgénique ? »
- Le consultant présente-t-il une surcharge pondérale abdominale ?

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- **Testostérone salivaire ou testostérone dans le sang + SHBG + DHEA**
- **Cortisol**
- **Cholesterol**
- **Homa Test**
- **Vitamine D, K, Zinc, B6**

Ce que l'on peut proposer :



En allopathie

Remonter le taux de testostérone à partir de testostérone synthétique

Nom	Mode d'administration	Dosage	Prix	Remarques
Pantestone®	Per Os	40 mg x 3/j	16.37 euros (60 capsules). Remb Séc soc à 65 %	Assez contraignant (traitement quotidien) avec dosage difficile
Androtardyl®	Intra-musculaire	250mg toutes les 3 semaines	9.23 euros (1 ampoule). Remb Séc soc à 65 %	Effet « montagnes russes » du taux sérique de testostérone mais en rapprochant les injections et en diminuant la dose on a un meilleur résultat
Nebido®	IM	1000mg tous les 3 mois	120 euros (1 ampoule) non remboursé sécu	Moins d'effets secondaires
AndroGel®	Transcutané (gel)	25 mg ou 50 mg 1 x/j	75€/mois non remboursé sécu	5 à 10% d'irritation cutanée
Testopatch	Patch transcutané			Arrêt de commercialisation depuis avril 2015

Ce que l'on peut proposer en naturopathie :


OBJECTIF

Optimiser la production de testostérone en :

- ✓ **Corrigeant l'hygiène de vie et l'insulino-résistance**

Alimentation + Exercice physique + Sommeil

- ✓ **Inhibant la 5-alpha-reductase et l'aromatase**
- ✓ **Stimulant l'axe hypothalamo-hypophysaire**



Ce que l'on peut proposer en naturopathie :

	Stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire	Inhiber l'aromatase et la 5-alpha réductase	Combattre l'insulino-résistance
Alimentation	-	-	IG bas
Phytothérapie	Maca Tribulus terrestris Fenugrec	Palmier nain (Serenoa Repens) Prunier d'Afrique Racine d'ortie Epilobe Huile de pépin de courge Maca	Berberine Zinc Chrome Fenugrec



Palmier nain (320 mg/jour)	Prunier d'Afrique	Racine d'ortie (200 mg/jour)	Epilobe	Huile de pépins de courge (500 mg/jour)
Inhibe la 5-alpha reductase Activateur des récepteurs andronégiques Anti-inflammatoire	Même efficacité que le palmier nain mais arbre en voie de disparition	Inhibe la 5-alpha reductase et l'aromatase Augmente la testostérone libre Riche en fer, silice, zinc	Inhibe la 5-alpha reductase et l'aromatase grâce aux tanins Anti-inflammatoire et antioedémateuse	Inhibe la 5-alpha reductase Riche en zinc

Maca	Fénugrec	Tribulus terrestris
Antioxydant Régule la glycémie Stimulant de la spermatogénèse Pas d'études démontrant les effets du maca	Régule la glycémie Mime l'action des oestrogènes et de la testostérone	Anabolisant pro-érectile Stimulant de la spermatogénèse Augmente le taux de testostérone Diurétique, anti-lithiasique urinaire Hypotenseur




Le **fénugrec** contient plus de **100 constituants phytochimiques**, y compris les saponines de furostanol et les saponines stéroïdiennes.

Lorsqu'elles sont ingérées, **les saponines sont hydrolysées dans l'intestin et se décomposent en sapogénines**. La structure moléculaire des sapogénines, et celle des furostanols, est construite autour d'un complexe de type cholestérol.

Cela ressemble non seulement au cholestérol, mais aussi aux **hormones stéroïdes** qui sont formées à partir du cholestérol, y compris l'aldostérone, le cortisol, les œstrogènes et la testostérone.

Les micronutriments essentiels à la production de testostérone :


VITAMINE D
surtout chez les
hommes obèses



ZINC + Mg + B6



VITAMINE K



La vitamine D améliore le taux de testostérone chez les hommes obèses

L'appareil génital masculin comporte des récepteurs de la vitamine D, indiquant qu'elle y exerce une influence. Leur présence au sein des spermatozoïdes est d'ailleurs un gage de la qualité de la semence masculine.


Ces récepteurs sont en effet plus nombreux chez les hommes fertiles que chez ceux présentant des troubles de la reproduction.

La supplémentation en vitamine D pourrait améliorer la production de testostérone, comme le suggèrent les résultats d'un essai clinique mené auprès de 54 hommes en surpoids engagés dans un programme d'amaigrissement. Une partie du groupe a reçu 3300 UI de vitamine D3 par jour pendant un an, l'autre partie un placebo. Au début de l'étude, ces hommes présentaient un déficit en vitamine D, avec un taux sanguin inférieur à 50nmol/L. La concentration en testostérone était également basse, située à la limite inférieure des valeurs de référence. Dans le groupe supplémentation, **le taux de testostérone s'est amélioré**, passant de 10,7 à 13,4nmol/L. Aucun changement n'a été visible avec le placebo.

Le zinc assiste la production de testostérone au sein des testicule

Un déficit en zinc entrave la production de testostérone. Cet oligo-élément est en mesure de contrer les phénomènes oxydatifs et inflammatoires qui perturbent le fonctionnement des cellules productrices de l'hormone. Le zinc participe également à de nombreuses réactions enzymatiques au sein de l'organisme, en tant que cofacteur. L'une de ces enzymes est **directement impliquée dans la formation de la testostérone**. Il s'agit de la P450c17, qui permet la transformation de la DHEA en testostérone.


Chez des footballeurs soumis à une période d'activité physique intense, coupler la supplémentation en zinc à du magnésium et de la vitamine B6 apparaît en mesure d'accroître les niveaux de testostérone et la force musculaire. La supplémentation en magnésium seule est toutefois également en mesure d'augmenter le taux de testostérone chez de jeunes hommes, avec une amélioration plus marquée chez les sportifs que chez les sédentaires.



Le zinc participe à la production de testostérone au sein des cellules de Leydig

La vitamine K active une enzyme déterminante dans la synthèse de la testostérone

Il est enfin utile d'avoir de bons apports en vitamine K pour limiter les risques d'hypogonadisme. Cette dernière est en effet nécessaire à l'activation d'une enzyme impliquée dans la production de la testostérone, appelée cholestérol monooxygénase ou cholestérol desmolase et liée au gène Cyp11a. Cette enzyme assure **la production de prégnénolone à partir de cholestérol**, qui donne ensuite naissance à l'ensemble des hormones sexuelles :



Une étude chez l'animal a montré qu'une alimentation déficiente en vitamine K provoque une diminution de la quantité de testostérone dans le sang et au niveau des testicules.

HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Définitions

	HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE (HBP)	PROSTATITE
Définition	Tumeur bénigne touchant de nombreux hommes à partir de 50 ans. Adenomyofibrome caractérisé par une hyperplasie et une hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) qui se développe à partir des constituants glandulaires et musculaires de la partie centrale de la prostate.	Infection aigüe ou chronique de la prostate affectant les hommes de tous âges, avec une fréquence particulière chez les jeunes adultes. Provoqué par des bactéries provenant de la vessie ou du sang (Escherichia coli - Staphylocoque - Streptocoque - Entérocoque - Klebsellia) ou des mécanismes d'inflammation.
Symptômes	Difficultés mictionnelles (dysurie), envies fréquentes d'uriner, diminution du jet urinaire.	Fièvre, troubles mictionnels : brûlures à la miction, pollakiurie
Diagnostic	Basé sur la clinique, l'IPSS (International Score Symptom) et le toucher rectal. Total IPSS : 0 à 7 = léger ; 8 à 19 = modéré ; 20 à 35 = sévère	Toucher rectal, ECBU, échographie

HPB

• Diagnostic


⇒ Dosage de référence = PSA = marqueur sanguin de cancer de la prostate

Valeur seuil = 4 ng/mL

Plusieurs facteurs peuvent influencer le résultat : TR, activité sexuelle, prostatite, pratique du vélo, prise de certains médicaments (alpha-bloquants).

⇒ **Après 60 ans, le PSA augmente de 3,20 % par an.**

Causes possibles



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Avez-vous vos dernières analyses (PSA, testostérone...) ? »
- « Etes-vous sous alpha-bloquant ou Dutastéride ou Finastéride ? »
- « Avez-vous fait un Homa Test ? »
- « Avez-vous eu une prostatite infectieuse avant le diagnostic de HBP ? »
- Evaluer l'IMC du consultant pour savoir s'il est en surpoids.

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- Le Homa Test pour évaluer l'insulino-résistance
- Le zinc pour évaluer la fonctionnalité mitochondriale au niveau prostatique
- Testostérone salivaire ou testostérone dans le sang + SHBG + DHEA

Ce que l'on peut proposer :

OBJECTIF



En allopathie


Eliminer le tissu prostatique en excès dans le but de retrouver un fonctionnement vesical normal

- Si l'adénome n'empêche pas la vidange complète de la vessie :

Traitements modifiant la contraction du muscle vésical ou permettant une diminution progressive du volume tumoral (Alphabloquant = Omexel, inhibiteurs de la 5-alpha-réductase = Dutastéride, Finasteride).

- Si l'adénome gêne la vidange de la vessie :

Ablation de l'adénome par endoscopie ou chirurgie.



<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sexo-gyneco/2536680-adenome-prostate-symptomes-operer/> 7

Ce que l'on peut proposer en naturopathie :

OBJECTIF

Freiner le développement de tissu prostatique en inhibant la 5-alpha reductase et l'aromatase et en agissant sur les facteurs favorisants

- Si **surpoids et/ou insulino-résistance** :

Accompagnement à la perte de poids avec conseils hygiénodietétiques

- Si **DALA** : voir partie du cours sur le DALA
- **ALIMENTATION riche en Zinc + PHYTOTHERAPIE**



Ce que l'on peut proposer en naturopathie

LE CONSULTANT EST SOUS INHIBITEUR DE 5-ALPHA REDUCTASE ET SOUHAITE UNE SOLUTION PLUS NATURELLE

- Proposez un accompagnement en phytothérapie / micronutrition avec un suivi médical rapproché (contrôle PSA réguliers pour évaluer l'efficacité de votre accompagnement)


Mêmes plantes que pour le DALA avec en plus :

Marronnier d'inde

Pour décongestionner la prostate.
Conseillé à partir de 50 ans.



- Si carence en Zn avérée :** Alimentation riche en Zn : Huître, Basilic, Cardamome, Graines de sésame, Pollen, graines de courge



PROSTATITE

Ce que l'on peut proposer :

En allopathie

OBJECTIF

Éliminer les germes pathogènes
au niveau de la vessie

Antibiotiques (fluoroquinolones) pendant
4 à 6 semaines

*Efficace mais peut destabiliser la
flore intestinale*

En naturopathie

OBJECTIF

Éliminer les germes pathogènes au niveau de la vessie
de façon à **éviter les récives** en rééquilibrant la flore
intestinale et en renforçant la barrière intestinale

Même accompagnement que pour la cystite

*Moins efficace que les antibiotiques mais préserve la
flore intestinale*



Bibliographie / webographie

Le Larousse Médical

Biologie humaine, principes d'anatomie et de physiologie, Elaine N. Marieb

Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, Vincent RENAUD et

Véronique LIESSE, Ed. LEDUC

Ma bible des huiles essentielles, Danièle Festy

Les erreurs qui vous empêchent de maigrir, Pierre Vlodorp, Véronique

Liesse, Magali Castro

Cours «Pathologies uro-génitales», Isupnat

Femme essentielle, le guide des huiles essentielles, Dr Aude Maillard www.ciqual.anses.fr

Webinaires des laboratoires LPEV et COPMED