

Aliments riches en tryptophane

Teneur pour 100 g & équivalent par portion courante — Sources : Ciqal (ANSES), USDA FoodData Central

Aliment	Tryptophane / 100 g	Portion courante & équivalent
Graines de courge (séchées) Graines / oléagineux	~576 mg	30 g (1 poignée) → ~173 mg Apéritif, salade, porridge
Graines de sésame / tahini Graines / oléagineux	~370 mg	20 g (1 c. à s.) → ~74 mg Sauce, houmous, pain
Parmesan / gruyère râpé Fromages à pâte dure	~350 mg	30 g (2–3 c. à s.) → ~105 mg Gratinage, salade, pâtes
Noix du Brésil Graines / oléagineux	~340 mg	30 g (5–6 noix) → ~102 mg Collation, muesli
Dinde (poitrine, cuite) Viandes / volailles	~330 mg	120 g (1 escalope) → ~396 mg Rôti, sauté, burger
Poulet (blanc, cuit) Viandes / volailles	~310 mg	120 g (1 blanc) → ~372 mg Grillé, vapeur, wok
Thon (en boîte, au naturel) Poissons	~300 mg	100 g (1/2 boîte) → ~300 mg Salade, sandwich
Saumon (cuit) Poissons	~270 mg	130 g (1 pavé) → ~351 mg Grillé, vapeur, en papillote
Soja (graines, cuites) Légumineuses	~250 mg	150 g (1 assiette) → ~375 mg Edamame, tofu, tempeh
Fromage blanc 0% / yaourt grec Produits laitiers	~80–100 mg	150 g (1 pot) → ~135 mg Petit-déjeuner, collation
Pois chiches (cuits) Légumineuses	~80 mg	150 g (assiette) → ~120 mg Houmous, curry, salade
Lentilles (cuites) Légumineuses	~77 mg	200 g (1 assiette) → ~154 mg Soupe, salade, dal
Flocons d'avoine Céréales	~130 mg	60 g (1 bol sec) → ~78 mg Porridge, granola, muesli
Pain complet Céréales	~90 mg	60 g (2 tranches) → ~54 mg Tartines, sandwich
Riz complet (cuit) Céréales	~55 mg	150 g (1 assiette) → ~83 mg Accompagnement, bowl

AJR indicatif : ~5 mg/kg/jour (soit ~350 mg pour 70 kg). La cuisson réduit légèrement les teneurs. La biodisponibilité dépend de la compétition avec les autres acides aminés neutres (LNAA). Cofacteurs essentiels : B6, magnésium, zinc, fer, vitamine C.

Niveaux : **Teneur élevée (>250 mg)** **Teneur modérée (75–250 mg)** **Teneur plus faible (<150 mg)**