Apuntes

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Curvas y Superficies

Profesor: Sebastián Montiel

Fecha: 9 de marzo de 2026

Índice General

1 Introducción y motivación **2**
1.1 Contraste de las distintas geometrías 2

2 Curvas en el plano y en el espacio **2**
2.1 Curvas parametrizadas. Curvas regulares. Longitud de arco 2
2.2 Curvas a partir de curvas 15
2.2.1 Reparametrizaciones 15
2.2.2 Deformaciones 16
2.2.3 Curvas parametrizadas por arcos 17
2.3 Teoría local de curvas regulares planas: curvatura y diedro de Frenet . 19
2.4 Teoría local de curvas regulares en el espacio: curvatura, torsión y triedro de Frenet 19
2.5 Teorema fundamental de curvas en el espacio 19

3 Superficies en el espacio **19**
3.1 Definición de superficie y ejemplos 19
3.2 El cambio de parámetros. Funciones y aplicaciones diferenciables sobre superficies 19

1 Introducción y motivación

A lo largo de la carrera se han estudiado una serie de geometrías, en este documento, se estudiará la última de ellas, séase **Curvas y Superficies**.

Antes de nada, aún no sabemos, ni siquiera de forma vulgar y cotidiana lo que es una geometría aunque la hayamos trabajado varios años. Ésta es, el estudio **cuantitativo** de las formas y su evolucion para ciertas figuras en el espacio; es decir, vamos a estudiar qué aspecto y qué deformaciones podemos realizar a figuras del plano euclídeo o del espacio euclídeo tridimensional.

Aún así, no hemos definido lo que es una forma o una figura, pese a que su uso cotidiano nos permite tener una intuición de la materia que estudiamos.

Por último, antes de realizar un contraste de las distintas asignaturas que hemos visto, cabe destacar que el estudio que vamos a realizar es de carácter cuantitativo, es decir, no se va a asemejar al estudio de las formas y figuras de otras áreas como pueden ser el arte, la arquitectura, la moda...

1.1 Contraste de las distintas geometrías

Como ya recalcamos en la motivación, para saber dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos, vamos a realizar un contraste entre las asignaturas relacionadas con alguna de las áreas de la geometría, véase la figura 1; estas son: *Geometría I*, *Geometría II*, *Geometría III*, *Topología I*, *Topología II* y *Curvas y Superficies*.

Una vez visto esto, podríamos ya determinar que este documento pretende realizar una breve introducción al área que se conoce como **Geometría diferencial**[1].

2 Curvas en el plano y en el espacio

2.1 Curvas parametrizadas. Curvas regulares. Longitud de arco

Definicion 1 (Curvas en el espacio)**.** Definimos como **curva en el espacio** a cualquier aplicación diferenciable $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

Notación 2.1. En ocasiones, será de nuestro interés resaltar cuáles son las componentes de la curva, séase α; en ese caso, escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \tag{1}$$

donde $t \in I$ y $x, y, z : I \to \mathbb{R}$.

No obstante, aunque tratemos funciones, ya vimos que nuestro objetivo será estudiar formas de manera **cuantitativa**; por lo que nos interesará estudiar lo que llamamos *traza de la curva*, que no se debe confundir con la gráfica de la misma; será:

$$tr\ \alpha = im\alpha = \alpha(I) \tag{2}$$

[1] Actualmente, por motivos económicos, el nombre de esta disciplina suele ser **Análisis geométrico**

Cuadro 1: Contraste de las geometrías

Asignatura	**Espacio ambiente**	**Figuras**	**Soporte matemático**	**Área de estudio**
Geometría I	Espacio vectorial	Subespacios vectoriales: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial: $\cup$,$+$	Polinomios homogéneos de primer grado
Geometría II	Espacio métrico	Subespacios vectoriales: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial con métrica: $\cup$,$+$ $\perp$, $\sphericalangle$	Polinomios homogéneos de primer grado
Geometría III	Espacio afín métrico	Subespacios afines: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial con métrica: $\cup$,$+$ $\perp$, $\sphericalangle$, distancias, cónicas, cuádricas, etc.	Geometría algebraica
Topología I	ninguno / espacio topológico	Subespacios topológicos	Topología del espacio topológico: homeomorfismo de conjuntos	Topología intoductoria
Topología II	ninguno / espacio topológico	Subespacios topológicos	Topología del espacio topológico: homeomorfismo de conjuntos y teoría de grupos	Topología algebraica
Curvas y Superficies	curvas: $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ superficies: $\mathbb{R}^3$	Curvas y superficies	Todas las herramientas anteriores junto al análisis	Geometría diferencial

Ejemplo 2.1. Sean $a \in \mathbb{R}^3, v \in \mathbb{R}^3$ y definimos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por $\alpha(t) = a + tv$. Si nos fijamos, estamos tratando con una recta afín cuyo vector director es v. Su traza es la siguiente:

$$tr\ \alpha = \begin{cases} \{a\} & \text{si } v = 0 \\ R_{a,v} & \text{si } v \neq 0 \end{cases} \tag{3}$$

donde denotamos por $R_{a,v}$ a la **única** recta que pasa por a y tiene vector director v, que también notaremos por $a + \langle v \rangle$.

Si nos damos cuenta, podemos llegar a visualizar un caso peculiar, aquellas curvas cuya traza se queda contenida en un plano, dando lugar a la siguiente definición.

Definicion 2 (Curvas planas)**.** Diremos que una curva en el espacio $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ es una curva **plana** si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $tr\ \alpha \subset P$.

Por tanto, esta definición nos incita a pensar que debemos poder tratar las curvas planas como curvas en el espacio cuyo codominio es $\mathbb{R}^2$ y esto es así. Puesto que podemos pasar de P a $P(z = 0)$ con un movimiento rígido [2] de $\mathbb{R}^3$ esta concepción es posible.

De esta forma, podemos abstraernos y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$.

En la bibliografía de este área es habitual citar estas curvas como *parametrizadas* y *diferenciables*. En nuestro caso, ya hemos impuesto la segunda noción en la propia definición; además, cabe destacar que el adjetivo *parametrizada* destaca la dependencia sobre la variable independiente.

Ejemplo 2.2 (Algunos ejemplos básicos)**.** Veamos algunos ejemplos básicos de curvas en el espacio:

1. **Movimiento Rectilíneo Uniforme**: Volviendo al ejemplo anterior, consideramos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\alpha(t) = a + tv, \forall t \in \mathbb{R}$$

   con $a \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^3$ y $\alpha'(t) = v, \forall t \in \mathbb{R}$.

   Si usamos la interpretación física, tenemos que $\alpha(t)$ no es más que la posición del móvil en el instante $t \in \mathbb{R}$, así como que $\alpha'(t)$ es el vector velocidad del móvil en el instante de tiempo $t \in \mathbb{R}$, que será tangente a $tr\ \alpha$ en el punto $\alpha(t)$.

2. **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado**: Continuando con el ejemplo anterior, definimos $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\beta(t) = a + t^2 v, \forall t \in \mathbb{R}$$

   Aunque puede parecer poco intuitivo, lo que estamos haciendo no es trazar una parábola sino que estamos recorriendo la traza de α de forma mucho más

[2] Mantiene distancias y ángulos

rápida así como obviando la parte negativa de la misma, siempre lo hacemos en la dirección positiva de v.

De esta manera, podemos ya deducir que $tr\ \beta \subset tr\ \alpha$ siendo $tr\ \beta = R_0^+(a, v)$.

Desde el punto de vista físico, el movimiento es como botar una pelota sin rozamiento, cuando lanzamos la pelota ($t = -\infty$), si consideramos el suelo como a, tenemos que nos encontramos alejados. En el instante $t = 0$ tenemos que la pelota está en a con velocidad cero habiendo decrecido previamente y que conforme avanza el tiempo su velocidad aumenta.

Fijémonos que estamos hablando de que la velocidad aumenta o disminuye, es decir, que $\beta''(t) \neq 0$ cuando $t \neq 0$; de hecho, la aceleración es constantemente $2v$.

Si nos damos cuenta, el punto $a = \beta(0)$ es un punto complejo de entender, puesto que en ese intante la pelota no tiene velocidad, lo que da lugar a planos de tangencia o rectas tangentes degenerados [3]; esto será un punto crítico.

3. **Autointersecciones**: Consideremos $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4), \forall t \in \mathbb{R}$$

Si realizamos un estudio exhaustivo del comportamiento de la curva tenemos que ambos límites ($-\infty$ e ∞) se encuentran en el segundo y primer cuadrante; así como que

$$t^2 - 4 = 0 \iff t = \pm 2 \tag{4}$$

lo que nos da las abscisas donde la curva corta al eje de abscisas. En dichos puntos, es fácil ver, que $\delta(-2) = 0 = \delta(2)$. Entonces, tenemos un caso de **autointersección**, es decir, de dos instantes de tiempo cuyas imágenes por la curva son la misma.

De este ejemplo podemos deducir que una curva no tiene por qué ser inyectiva [4].

4. **Imagenes no derivables**: En este ejemplo, pretendemos mostra que, aunque una curva sea diferenciable, inyectiva, plana, étc. Ésta no tiene que dar la gráfica de una función; de hecho, en el ejemplo anterior vimos que, ni siquiera tenía que ser una función.

Consideramos $\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)\ \forall t \in \mathbb{R}$. Vemos que su velocidad es $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$ que se anula en el origen. Orbservamos, también, que su traza dispone de un *pico* en $t = 0$.

Como tiene *picos* y $tr\ \varepsilon = Gr(f(x) = x^{\frac{2}{3}})$[5] vemos que no es derivable aunque la curva ε sí lo sea.

[3] Más adelante se verá

[4] Si realizamos la simetría sobre el eje $y = x$ obtenemos lo que se conoce como *foluim de Descartes*

[5] Se obtiene tomando $x = t^2$, $y = t^3$, despejando t de la primera e igualando en la segunda

5. **La circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en $P \subset \mathbb{R}^2$ o movimiento circular acelerado**: Consideramos $\zeta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$\zeta(t) = a + r(\cos\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \sin\left(\frac{t}{r}\right) e_2)$$

donde $a \in \mathbb{R}^3$, e_1, e_2 con $|e_1| = 1 = |e_2|$ y $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$.

Notemos que $\zeta(t) \in P = a + \langle e_1, e_2 \rangle \, \forall t \in \mathbb{R}$, lo que nos asegura que ζ es una curva plana. Además, podemos notar que la distancia de $\zeta(t)$ a a es siempre r puesto que

$$|\zeta(t) - a|^2 = r^2(\cos^2\left(\frac{r}{t}\right) + \sin^2\left(\frac{r}{t}\right)) = r^2 \iff |\zeta(t) - a| = r \forall t \in \mathbb{R}$$

Por tanto, podemos ya llamar a dicha parametrización como **la** circunferencia de centro a y radio r dentro de P. Además, cabe destacar que el motivo de la distinción es que, aunque habrá varias curvas cuya traza sea la misma, ninguna de ellas recorrera la circunferencia destrita por la traza de forma uniforme y organizada como lo hace ζ [6].

Además, para ver que el un movimiento circular uniforme, basta ver que

$$\zeta'(t) = -\left(\sin\left(\frac{t}{r}\right)\right) e_1 + \cos\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

lo que nos asegura que la velocidad es independiente de r como escalar. Por último, cabe destacar que la aceleración no es constante por lo que este movimiento no es uniforme.

6. **La imagen de una curva inyectiva en un intervalo no tiene por qué ser homeomorfa al intervalo**: Consideremos la curva $\eta : I \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3}\right) \forall t \in I =]-1, \infty[$$

Claramente, tenemos que $\eta'(0) = (,0)$ y $\lim_{t\to\infty} \eta(t) = (0,0)$ de donde tenemos que la curva nunca se cierra; sin embargo, la pintamos cerrada debido a que ya pasó por ese punto en $t = 0$.

Veamos ahora que $tr\ \eta$ y I no son homeomorfos, basta tomar un entorno de $(0,0)$ para ver que no lo son pues, supuesto que lo fueran, quitando el punto $(0,0)$ a ambos entornos perderíamos la condición de homeomorformidad.

Por último,

$$\eta'(t) = \left(\frac{3-6t^2}{(1+t^3)^2}, \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2}\right) \forall t \in I$$

de donde tomando $t = 1$ vemos que $\eta'(1) \neq 0$ y, por tanto, $\eta' \neq 0$.

[6] Basta sustituir t por t^3 para obtener otra que recorre la misma circunferencia de forma un poco más caótica.

Ejercicio 1. Probar que η es inyectiva.

Demostración. Para ello, supongamos que no lo fuera, es decir, que existen $x \neq y \in I$ tales que $\eta(x) = \eta(y)$ y buscamos llegar a que $x = y$. Para ello, podemos ver que se cumple que:

$$\gamma(t) = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t \quad \forall t \in I \setminus \{0\} \tag{5}$$

de donde, como $\eta(x) = \eta(y)$ se tiene que:

- Si $\eta_1(x) = \frac{3x}{1+x^3} = \frac{3y}{1+y^3} = \eta_1(y) \neq 0$ tenemos que $x = \gamma(x) = \gamma(y) = y$.
- Si $\eta_1(x) = \frac{3x}{1+x^3} = \frac{3y}{1+y^3} = \eta_1(y) = 0$, en ese caso, $0 = \eta_1(x)$, de donde necesariamente se tiene que $x = 0$ de donde $y = 0$.

Por tanto hemos probado ya la inyectividad de η.

□

Definicion 3 (Recta tangente)**.** Dada una curva en el espacio $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, se define la **recta tangente** a α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$ y la notaremos por $R_{\alpha(t),\alpha'(t)} \equiv R_t$, donde en este último caso estamos abusando bruscamente de la notación pues se confunde $\alpha(t)$ con t, ya que las autointersecciones producen varios instantes que pasan por el mismo punto con distinta velocidad.

Sin embargo, cualquiera puede llegar a la conclusión de que la definición no es correcta completamente. El motivo radica en que puede haber degeneraciones como ya se comentó al inicio de la sección ya que, si $\alpha'(t) = 0$ tendríamos que R_t sería un único punto, perdiendo así la noción de recta.

Definicion 4 (Puntos singulares y regulares)**.** En la situación de la definición 3 diremos que los puntos $\alpha(t) \in tr\ \alpha$ tales que $\alpha'(t) = 0$ son puntos **singulares**. Sus análogos serán los puntos **regulares**.

Por tanto, diremos que una curva es **regular** si todos sus puntos son regulares.

Ejemplo 2.3. Estudiamos cada uno de los ejemplos anteriores:

- Como $\alpha'(t) = v$, tendremos que es regular si, y sólo si, $v \neq 0$.
- Como $\beta'(t) = tv$, tenemos que no es regular, pues en $t = 0$ tenemos un punto singular.
- Como $\delta'(t) = (3t^2 - 4, 2t)$ tenemos que no se anula para ningún valor de t, lo que nos dice que es regular.
- Como $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$, no es regular pues para $t = 0$ tenemos un punto singular.
- Ya tenemos calculada su derivada, y es fácil ver que ésta nunca se anula, de donde deducimos que no tiene puntos singulares.

- Aquí también tenemos calculada la derivada de donde al igualar a 0 obtenemos el sistema
$$\begin{cases} 3-6t^2=0 \\ 6t-3t^4=0 \end{cases}$$
que no tiene solución. Por tanto, es una curva regular.

Veamos ahora un resultado que nos dará una concepción distinta de las curvas, pues la familia de todas las curvas es **más** grande que la familia de las funciones reales de variable real.

A partir de ahora, salvo que se diga lo contrario, consideraremos que todas las curvas que aparecen son diferenciables; y, en un principio, entenderemos por diferenciable que es infinitamente derivable.[7]

Proposición 2.1. *La gráfica de una función real de variable real es la traza de una curva.*

Demostración. Supongamos que $f : I \to \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto. POr su parte, por definición, sabemos que la gráfica de la función f es el conjunto:

$$Gr(f) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R} \wedge y = f(x)\right\} \tag{6}$$

Por tanto, basta definir la siguiente aplicación para obtener el resultado:

$$\begin{aligned} \phi_f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \phi_f(t) = (t, f(t)) \end{aligned}$$

Claramente es una aplicación de un interavalo abierto en R^d con $d \in \mathbb{N}$ y es diferenciable por serlo componente a componente, es decir, es una curva plana. □

Observación. Cabe destacar que el recíproco de este resultado es falso, basta tomar como contraejemplo $\delta(t)$; pues dada cualquier recta del plano, la proyección de $\delta(t)$ sobre ella no es inyectiva, lo que nos indica que no puede ser la gráfica de una función real de variable real.

Hasta ahora, todas las curvas que hemos estudiado han sido planas [8], lo que puede llevarnos a pensar que la mayoría de ellas lo son. Sin embargo, esta concepción no es cierta, es completamente al revés. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 2.4 (Curvas no planas)**.** Tomamos $a, b \in \mathbb{R}$ verificando $a^2 + b^2 \neq 0$ y $\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$\theta(t) = \left(a\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), a\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), \frac{bt}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

Debemos distinguir casos:

[7] Esto realmente no es así, cuando lo veamos más adelante tomaremos la concepción correcta

[8] Una condición necesaria es que tenga medida cero

- Si $a = 0$: En ese caso, necesariamente $b \neq 0$ y $\theta(t) = (0, 0, t)$ obteniendo que $tr\ \theta = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3\}$ que es plana.
- Si $b = 0$: En ese caso, al igual que en el caso anterior, se deduce que $a \neq 0$ y que $tr\ \theta \subset P(z = 0)$ por lo que vuelve a ser plana y es la circunferencia de centro $(0, 0, 0)$ y radio $|a|$ dento de $P(z = 0)$.
- Si $ab \neq 0$: Si tomamos $t \in \mathbb{R}$ tenemos que

  $$x(t)^2 + y(t)^2 = a^2 \implies \forall t \in \mathbb{R} \theta(t) \in \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = a^2\right\}$$

  Por tanto, podemos deducir ya que nuestra curva está contenida en un cilindro circular recto de radio $|a|$ y cuyas generatrices son paralelas al eje z. Entonces, podemos ya deducir que es una **hélice circular recta de eje z y de radio $|a|$**.

  Simplemente como curiosidad, vemos que si $ab = 0$, a medida que el tiempo avanza, el móvil que se desplaza por la curva, aumenta su coordenada z produciendo un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, la hélice es *levógira*. En caso contrario, sería *dextrógira*.

Ejercicio 2. Prueba que cualquier hélice circular no es plana

Demostración. Procederemos por reducción al absurdo, supongamos que existen $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tales que

$$tr\ \theta \subset \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : Ax + By + Cz + D = 0\right\}$$

donde A, B, C no se anulan de forma simultánea.

En definitiva, hemos supuesto que la curva en cuestión es plana, y buscamos llegar a una contradicción. Ahora bien, sabemos que

$$\theta(t) = \left(a \cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), a \sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

y que está dentro del plano previamente definido por lo que se cumple que

$$A \cdot a \cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + B \cdot a \sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + C \cdot \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} + D = 0$$

De donde, al derivar [9], obtenemos una condición que debe cumplirse en todos los puntos de la curva. Nuestro objetivo será probar que $A = B = C = 0$, lo que nos dará la contradicción. Las ecuaciones obtenidas son [10]:

$$-Aa \frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2 + b^2}} + Ba \frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2 + b^2}} + C \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0 \tag{7}$$

[9] Lo que estamos diciendo es que el vector velocidad de la curva se queda en el plano, es decir, que la recta tangente de la curva en ese punto está dentro del plano.

[10] Usaremos que, por definición de curva, la ecuación obtenida es diferenciable

Y derivando otra vez:

$$-Aa\frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{a^2+b^2}+Ba\frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{a^2+b^2}=0 \tag{8}$$

Ahora bien, sabemos que las ecuaciones (7) y (8) se cumplen para cualquier punto de definición de la curva de donde :

- Si tomamos $t=0$ obtenemos que $-\frac{Aa}{a^2+b^2}=0$ al sistituir en (8), de donde se deduce que $A=0$, pues $a\neq 0$.
- Si tomamos ahora $t=\frac{\pi}{2}(a^2+b^2)$ obtenemos que $B=0$ de la misma forma.

Por tanto, ya tenemos que $A=0=B$; sin embargo, sustituyendo esto en (7) deducimos que $Cb=0$, de donde C también se anula. Es decir, la curva no puede ser plana. □

Observación. Otras formas de probar esta cuestión son:

- Realizar un cambio de parámetro, es decir, considerar otra curva distinta cuya traza sea identica a la nuestra de forma que se simplifiquen las cuentas. Como ejemplo, si tomamos el cambio de parámetro $t=\lambda(a^2+b^2)$ obtenemos la curva

  $$\alpha(\lambda)=(a\cos(\lambda),a\sin(\lambda),b\lambda)$$

  que nos simplifica las cuentas.
- A la hora de resolver el sistema de ecuaciones obtenido al derivar la condición del plano sobre la curva θ podemos hacer un argumento de determinantes al tener un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas homogéneo con infinitas soluciones. Por tanto, tendríamos que el determinante de la matriz de coeficientes no se anularía dando lugar a una condición que prueba $A^2+B^2=0$.
- Tomando cuatro puntos afínmente independientes.

Veamos otro ejercicio sobre la *helice circular recta.*

Ejercicio 3. Prueba que la hélice circular recta es una curva regular, calcula cuánto vale $|\theta'(t)|$ e interpreta geométricamente el parámetro b.

Demostración. Trataremos de ver cada uno de los aspectos por separado:

1. **Curva regular**. Para probar esto bastará deducir que no existen puntos sin plano tangente definido, es decir, cuya derivada componente a componente no se anula. Para ello, debemos calcular la derivada que es:

   $$\theta'(t)=\left(-a\frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}},a\frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

Ahora bien, teniendo en cuenta que ningún denominador se anula, si existiera $t \in \mathbb{R}$ que cumpliera que $\theta'(t) = 0$, se tendría el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \sin\left(\dfrac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = 0 \\ \cos\left(\dfrac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

De donde deducimo que $a \neq 0$ y que no existe ese t, pues el seno y el coseno no se anulan simultáneamente en nungún punto.

2. **Módulo de $\theta'(t)$.** Haciendo unas pocas de cuentas sale que $|\theta'(t)| = 1 \forall t \in \mathbb{R}$.[11]

3. **Interpretación del parámetro b.** Veamos que b es lo que se conoce como el paso del tornillo, es decir, la distancia entre dos puntos de la misma generatriz del cilindro en el que se encuentra la curva. Para ello, bastará tomar los puntos $t = 0$ y $t = 2\pi$, de donde tenemos que:

$$\theta(0) = (a, 0, 0) \ \wedge \ \theta(2\pi) = \left(a, 0, \frac{2b\pi}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

De donde, al calcular la distancia entre ambos puntos obtenemos que $|\theta(2\pi) - \theta(0)| = \left|\frac{2b\pi}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$ y despejando b obtenemos la interpretación geométrica buscada,

$\square$

Vamos, ahora, a trabajar la última parte de esta sección; dada una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, en ocasiones pretenderemos medir la distancia que recorre el móvil a lo largo de la curva entre dos puntos dados. Es decir, tomados $a, b \in I$ buscamos calcular la distancia que recorre el móvil entre a y b. La idea clave será considerar el intervalo compacto $[a, b] \subset I$ y considerar, sobre él, una serie de particiones del mismo que nos darán una poligonal de la curva y nos aproximará su longitud.

Observación (Problema con las autointersecciones). Si nos fijamos, puesto que no estamos pidiendo que nuestra curva sea regular, esta podrá contener puntos con velocidad nula dando lugar a situaciones como recorrer el camino hacia atrás.

Por tanto, cuando calculamos la longitud de la curva entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ no estamos contemplando esta situación, de ahí que calculemos la longitud de la curva entre a y b.

Definicion 5 (Longitud de la curva en una partición)**.** Se define la **longitud de la curva α entre a y b correspondiente a la partición** $P = \{t_0 = a < t_1 < \cdots < t_n = b\}$ como la cantidad:

$$L_a^b(\alpha, P) = \sum_{i=1}^{n} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$$

[11] Basta usar la definición de norma euclídea y una razón trigonométrica clásica.

Proposición 2.2 (Acotación de longitudes)**.** *Dados una curva* $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$*,* $a, b \in I$ *y* $P = \{t_0 = a < t_1 < \cdots < t_n\}$ *, se tiene que*

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha, P) \leq \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

Demostración. Para ver la primera desigualdad basta aplicar la desigualdad triangular de forma consecuente. Para el segundo caso, usando la regla de Barrow para cada uno de los subintervalos $[t_{i-1}, t_i]$ obtenemos que

$$L_a^b(\alpha, P) = \left| \int_{t_0}^{t_1} \alpha'(t) \, dt \right| + \left| \int_{t_1}^{t_2} \alpha'(t) \, dt \right| + \cdots + \left| \int_{t_{n-1}}^{t_n} \alpha'(t) \, dt \right| \leq$$

$$\int_{t_0}^{t_1} |\alpha'(t)| \, dt + \int_{t_1}^{t_2} |\alpha'(t)| \, dt + \cdots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} |\alpha'(t)| \, dt = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

□

Una vez hemos obtenido una cota inferior y otra superior, nos preguntamos si dichas cotas con "buenas". Si nos fijamos, la cota inferior nos da una connotación muy clara de cual es el camino más corto entre dos puntos cualesquiera, pues nos dice que la longitud de la curva entre dos puntos cualesquiera correspondiente a una partición cualquiera siempre es mayor a la longitud de la línea recta entre ellos. Por su parte, la cota superior veremos que es el resultado óptimo a la hora de medir la longitud de una curva entre dos puntos.

Proposición 2.3 (Longitud de una curva entre a y b)**.** *Sea* $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ *una curva y* $I \subset \mathbb{R}$ *un intervalo. Si tomamos* $a, b \in I$ *conformando* $[a, b]$*, se tiene que*

$$\exists \lim_{|P| \to 0} L_a^b(\alpha, P) = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

Demostración. Para probar esto, definimos $f : [a, b]^3 \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(\delta, \beta, \gamma) = \sqrt{x'(\delta)^2 + y'(\beta)^2 + z'(\gamma)} \quad \forall (\delta, \beta, \gamma) \in [a, b]^3$$

Claramente, f es continua puesto que es la raíz cuadrada de un factor diferenciable. Además, como f está definida en un conjunto compacto, obtenemos inmediatamente que es uniformemente continua.

Por tanto, tenemos que, dado $\varepsilon > 0$

$$\text{si } t_1, t_2, t_3, t_1^*, t_2^*, t_3^* \in [a, b] \ \exists \delta > 0 \ : \ \text{si } \ |t_i - t_i^*| < \delta \ \forall i \in \{1, 2, 3\} \implies$$

$$|f(t_1, t_2, t_3) - f(t_1^*, t_2^*, t_3^*)| < \varepsilon$$

Entonces, sea P una partición del intervalo $[a, b]$ con $|P| < \delta$, deducimos que

$$\left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt \right| = \left| \sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| \, dt \right|$$

$$= \left| \sum_{i=1}^{n} \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| \, dt \right) \right| \leq \sum_{i=1}^{n} \left| |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| \, dt \right|$$

Ahora bien, usando el teorema del valor intermedio para cada una de las coordenadas en el primer sumando y el teorema del valor intermedio para integrales en el segundo de ellos obtenemos:

$$\left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt \right| = \sum_{i=1}^{n} (t_i - t_{i-1}) \left| f(\delta_i, \beta_i \gamma_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i) \right|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon$$

Donde en la última desigualdad hemos usado que $|P| < \delta$ y que f es uniformemente continua. $\square$

Con este resultado justificamos que la siguiente definición es correcta.

Definicion 6 (Longitud de una curva entre a y b)**.** Se define la **longitud de** $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ **entre** a **y** b, con $[a, b] \subset I$, como la siguiente cantidad

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

Es conveniente realizar algunos ejemplos para su mejor comprensión.

Ejemplo 2.5. Para familiarizarnos con este nuevo concepto, trataremos dos ejemplos que ya conocemos su resultado.

1. **Movimiento rectilíneo uniforme**. Supongamos que nos encontramos en la situación de un movimiento rectilíneo uniforme determinado por la curva $\alpha(t) = p + tv$ con $p, v \in \mathbb{R}^3$. Sean $a, b \in I$ con $[a, b] \subset I$, se tiene que

   $$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |v| \, dt = |v| \, (b - a)$$

   lo que nos da dos posibilidades:

   - Si $v = 0$, en ese caso, el móvil no está en movimiento y la longitud de un punto es nula de forma lógica.
   - Si $v \neq 0$ obtenemos la ecuación $e = |v| \, t$ dando sentido al concepto estudiado.

2. **Movimiento circular uniforme**. Sea $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\beta(t) = (a_1, a_2) + r \left(\cos \frac{t}{r}, \sin \frac{t}{r} \right)$$

   Como cabíamos esperar, si tomamos los puntos $0, 2\pi r \in \mathbb{R}$ obtenemos que

   $$L_0^{2\pi r}(\beta) = 2\pi r$$

   respetando la fórmula de la longitud de la circunferencia.

3. **Curvas cuya longitud en un fragmento infinito es finita**. Consideramos $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$ y tomamos $a, b \in \mathbb{R}$ definiendo un intervalo compacto en $\mathbb{R}$. Entonces:

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| \, dt$$

Pero, por su parte, $\gamma'(t) = -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t)$ de donde, si calculamos su módulo al cuadrado obtenemos que

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b \sqrt{2e^{-2t}} \, dt = \sqrt{2} \int_a^b e^{-t} \, dt = \sqrt{2}(e^{-a} - e^{-b}) > 0$$

De hecho, podemos deducir, de los cálculos, que nuestra curva es regular puesto que la exponencial no se anula y las funciones $\cos t, \sin t$ son linealmente independientes.

Para ver el caso que buscamos estudiar, basta ver que

$$\lim_{b \to \infty} L_a^b(\gamma) = L_a^\infty(\gamma) = \sqrt(2)e^{-a}$$

Ejercicio 4. Probar que $L_a^b(\alpha) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$, siendo α una curva en el espacio cualquiera.

Demostración. Para probarlo procederemos demostrando ambas desigualdades:

- Probemos que $L_a^b(\alpha) \leq \sup_P L_a^b(\alpha, P)$. Para ello, si tomamos una partición cualquiera del intervalo $[a, b]$, séase $P = \{t_0 = a < \cdots < t_n = b\}$, la definición de supremos nos garantiza que

$$L_a^b(\alpha, P) \leq \sup_P L_a^b(\alpha, P)$$

Ahora bien, como ya hemos deducido la existencia del límite cuando $|P| \to 0$ podemos tomar límite y obtener

$$L_a^b(\alpha) \leq \lim_{|P| \to 0} \left(\sup_P L_a^b(\alpha, P) \right) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$$

- Probemos que $\sup_P L_a^b(\alpha, P) \leq L_a^b(\alpha)$. Para ello, tomamos $\{P_n\}$ una sucesión de particiones del intervalo $[a, b]$ cumpliento $|P_n| \to 0$. Por la proposición 2.3 podemos deducir que

$$\left\{ L_a^b(\alpha, P_n) \right\} \to L_a^b(\alpha)$$

de donde hemos obtenido una cota superior que es límite de una sucesión cualquiera de elementos, es decir, es el supremo.

□

2.2 Curvas a partir de curvas

Nuestro objetivo en esta sección, será estudiar nuevas formas de obtener curvas en el espacio dada una curva cualquiera. Un método viable será tomar una curva y cambiar completamente la curva en sí para obtener otra nueva totalmente distinta; sin embargo, este método no es interesante para nosotros por obvias razones.

Concretamente, estudiaremos dos métodos de creación de nuevas curvas a partir de otras.La idea que trasciende para dichos dos métodos es tratar las curvas como aplicaciones, es decir, vamos a estudiar las dos formas posibles de componer dos aplicaciones; por tanto, habrá un método de composición por la izquierda (*deformaciones*) y de composición por la derecha (*reparametrizaciones*).

2.2.1 Reparametrizaciones

Comenzamos por el más intuitivo de todos, dada una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$, consideraremos la composición $\beta = \alpha \circ h$ donde h cumplirá una serie de carácteristicas para que β sea un buen objeto de estudio.

Definicion 7 (Reparametrización)**.** En la situación descrita anteriormente, diremos que $h : J \to I$, $J \subset \mathbb{R}$ intervalo, es una parametrización si cumple que $\beta = \alpha \circ h$ es una curva en el espacio y h es un difeomorfismo.

Veamos una justificación de por qué esta definición es correcta. Aunque es una definición muy restrictiva, está definida para forzar a que se preserve la regularidad de la curva. Por supuesto que hay reparametrizaciones que pierdan la regularidad de la curva, pero no será objeto de estudio.

Supongamos que α es una curva regular y queremos que β también lo sea; en ese caso, deberemos imponer que $h'(t) \neq 0 \, \forall t \in J$. Entonces, como J es conexo y h la suponemos diferenciable disponemos de dos opciones excluyentes:

- Si $h'(t) > 0 \, \forall t \in J$. En ese caso, h es estrictamente creciente y, en particular, inyectiva y con inversa diferenciable, gracias al teorema de la aplicación inversa global.
- Análogamente, si $h'(t) < 0 \, \forall t \in J$, tendremos que h será estrictamente decreciente, inyectiva y con inversa diferenciable, gracias al teorema de la aplicación inversa global.

Además, nuestro objetivo en las reparametrizaciones no es cambiar la traza de la curva α sino recorrerla a otra velocidad, es decir, buscamos que $tr\ \alpha = tr\ \beta$ y, por tanto, impondremos que h sea sobreyectiva pues en ese caso:

$$tr\ \beta = im(\beta) = \beta(J) = \alpha(h(J)) = \alpha(I) = tr\ \alpha$$

De donde, se deduce que, si queremos preservar la regularidad, deberemos imponer que h sea un difeomorfismo. En particular, hemos probado que las reparametrizaciones mantienen la traza de la curva de inicio.

Lo que realmente queremos decir es que h es una nueva forma de percibir el paso del tiempo. Como ejemplo, podemos suponer que siempre tenemos la reparametrización

dada por la función identidad que representa el trascurso lineal del tiempo; sin embargo, en ocasiones querremos representar el trascurso del tiempo dándole más velocidad en el pasado y menos en el futuro o situaciones similares, ahí es donde entra en juego h.

Proposición 2.4 (Invarianza de longitud en reparametrizaciones)**.** *Dada $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva en el espacio y $h : J \to I$ con $J, I \subset \mathbb{R}$ intervalos. Si h es una reparametrización y $a, b \in J$, entonces*

$$L_a^b(\beta) = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

Demostración. Bastará hacer la cuenta

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| \, dt = \int_a^b |h'(t)| \, |\alpha'(h(t))| \, dt = \int_{h(a)}^{h(b)} |\alpha'(u)| \, du = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

Donde, en la última igualdad de integrales, hemos usado el teorema de cambio de variable con $u = h(t)$. □

Observación. Si nos fijamos, en ningún momento de la demostración hemos usado que β deba ser regular; por tanto, no es estrictamente necesario que h sea un difeomorfismo. Es decir, si h es una aplicación cualquiera que mantenga invariante la traza de α, el resultado será cierto.

2.2.2 Deformaciones

Pasamos ahora a estudiar el otro caso de obtención de otras curvas a partir de una dada. Consideremos que disponemos de $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva en el espacio con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo. Nuestro objetivo será encontrar $\Phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ de manera que $\beta = \Phi \circ \alpha$ sea una curva en el espacio.

Definicion 8 (Deformación)**.** En la situación anteriormente descrita, diremos que Φ es una deformación de α si ésta es un difeomorfismo local.

Observación. Tal y como ocurrió con las reparametrizaciones, esta definición es mucho más estricta de lo habitual por motivos académicos. Realmente, no es necesario imponer que Φ sea un difeomorfismo local, sino que basta con pedir que Φ sea diferenciable para obtener otra curva.

Al igual que antes, nosotros nos centraremos en curvas regulares, por lo que nuestro objetivo será conseguir que β sea regular. Veamos que necesitamos imponer que Φ sea un difeomorfismo para ello.

Evidentemente, para que β sea una curva, necesitamos que Φ sea diferenciable. Ahora bien, como buscamos conseguir que, si α es regular entonces β sea regular, necesitamos que $\beta'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. Pero, gracias a la regla de la cadena y a la diferenciabilidad de Φ obtenemos

$$\beta'(t) = (\Phi \circ \alpha)'(t) = d\Phi_{(\alpha(t))}(\alpha'(t))$$

De donde se deduce que Φ debe ser inyectiva al necesitar que $Ker(\Phi) = \{0\}$. En particular, como $rg(\Phi) = 3$, será sobreyectiva.

Por tanto, para mantener la regularidad necesitamos que Φ sea un difeomorfismo local. En nuestro caso, siempre trabajaremos con difeomorfismos globales.

POr último, hablaremos un poco de aquellas deformaciones que **sí** preservan la geometría; serán los **movimientos rígidos**, que trataremos como

$$\begin{aligned} M : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ x &\longmapsto Ax + b \end{aligned}$$

con $A \in \mathbb{O}(3)$ [12] y $b \in \mathbb{R}^{\nvDash}$.

Entonces, lo que buscamos estudiar son las propiedades de estos **difeomorfismos**, es decir, consideraremos $\Phi = M$ y vamos a estudiar ciertas propiedades. Una de las propiedades que es de fácil deducción es que $tr\ \beta = M(tr\ \alpha)$ [13].

Además, como los movimientos rígidos no pierden la geometría del objeto sobre el que se aplica, aunque $\beta = \Phi \circ \alpha$ no sea idénticamente la curva α sí que se cumple que

$$tr\ \beta \equiv tr\ \alpha$$

donde $\equiv$ refleja que son geométricamente equivalentes.

Por último, basta hacer lacuenta y usar que los movimientos rígidos no modifican el módulo de un vector para obtener que

$$L_a^b(\beta) = L_a^b(\alpha) \qquad a, b \in I \subset \mathbb{R}$$

Observación. Cabe destacar que esta última propiedad sí nos dice, a diferencia de lo que ocurría con las reparametrizaciones, que la longitud se preserva con los mismo extremos.

2.2.3 Curvas parametrizadas por arcos

Nuestro objetivo en esta sección será obtener un método de reparametrización de curvas que nos parmita trabajar de forma intuitiva identificando espacio y tiempo.

Definicion 9 (longitud orientada de α respecto del instante a)**.** Sea $\alpha : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ una curva y $a \in I$, definimos

$$\begin{aligned} S_a : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \int_a^t |\alpha'(s)|\ ds = \begin{cases} L_a^t(\alpha) & \text{si } a \leq t \\ -L_t^a(\alpha) & \text{si } a \geq t \end{cases} \end{aligned}$$

Observación. En la definición anterior, el instante $a \in I$ no toma un papel relevante, puesto que si tomamos $b \in I$, la longitud orientada de α respecto de b será la longitud orientada de α respecto del instante a añadiendo una constante.

[12] Matrices ortogonales de dimensión 3, es decir, $A^T = A^{-1}$

[13] Basta hacer la cuenta.

De la misma manera, la orientación de la definición puede invertirse para obtener la longitud orientada con otra orientación distinta.

De esta definición ya podemos obtener ciertas propiedades:

- S_a es derivable para todo $a \in I$, porque $\alpha'(t)$ es derivable.
- Si suponemos que α es regular entonces tenemos que $S'_a(t) = |\alpha'(t)| > 0$ para todo $t \in I$, $a \in I$. Por tanto, tenemos que S_a es estrictamente creciente y, por tanto, inyectiva con un intervalo abierto como imagen.

  Además, el **Teorema de la función inversa** nos asegura que su inversa es diferenciable, es decir, S_a es un difeomorfismo entre intervalos abiertos para todo $a \in I$.
- En virtud del **Teorema de la función inversa**, si tomamos
$$h_a = S_a^{-1} : S_a(I) = J_a \to I$$
  , tenemos que
$$\beta = \alpha \circ h_a : J_a \to \mathbb{R}^3$$
  es una curva regular, pues h_a es un difeomorfismo y, en definitiva, una reparametrización.

Proposición 2.5 (Idetificación espacio-tiempo)**.** *Sea $\alpha : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ una curva regular con I un intervalo abierto y $a, b \in I$. Existe una reparametrización*
$$h : J \to I$$
con $J = S_a(I)$ de manera que se cumple que
$$L_a^b(\alpha \circ h) = (b - a)$$

Demostración. Para probarlo, basta considerar $h = S_a^{-1}$ que vimos que era un difeomorfismo y, en virtud del **Teorema de la función inversa**, cumple que $h'(s) = \frac{1}{\alpha'(h(s))}$.

De ahí deducimos que
$$(\alpha \circ h)'(s) = h'(s)\alpha'(h(s)) = \frac{1}{|\alpha'(h(s))|}\alpha'(h(s))$$

Entonces, tenemos que $|(\alpha \circ h)'(s))| = 1$ para todo s en J. De hecho, ya vimos que $J = S_a(I)$ y pasamos a deducir que
$$L_a^b(\alpha \circ h) = \int_a^b |(\alpha \circ h)'(s)| \, ds = \int_a^b 1 \, ds = (b - a)$$

□

Por tanto, hemos obtenido un método de conseguir curvas con celeridad constantemente unitaria, lo que motiva la siguiente definición.

Definicion 10 (Curvas parametrizadas por el arco)**.** Diremos que una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada por el arco cuando
$$|\alpha'(s)| = 1 \, \forall s \in I$$

2.3 Teoría local de curvas regulares planas: curvatura y diedro de Frenet

2.4 Teoría local de curvas regulares en el espacio: curvatura, torsión y triedro de Frenet

2.5 Teorema fundamental de curvas en el espacio

3 Superficies en el espacio

3.1 Definición de superficie y ejemplos

3.2 El cambio de parámetros. Funciones y aplicaciones diferenciables sobre superficies