Apuntes

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Curvas y Superficies

Profesor:

Fecha: 2 de marzo de 2026

Índice General

1 Introducción y motivación **2**
1.1 Contraste de las distintas geometrías 2

2 Curvas en el plano y en el espacio **2**
2.1 Curvas parametrizadas. Curvas regulares. Longitud de arco 2
2.2 Teoría local de curvas regulares planas: curvatura y diedro de Frenet . 12
2.3 Teoría local de curvas regulares en el espacio: curvatura, torsión y triedro de Frenet 12
2.4 Teorema fundamental de curvas en el espacio 12

3 Superficies en el espacio **12**
3.1 Definición de superficie y ejemplos 12
3.2 El cambio de parámetros. Funciones y aplicaciones diferenciables sobre superficies 12

1 Introducción y motivación

A lo largo de la carrera se han estudiado una serie de geometrías, en este documento, se estudiará la última de ellas, séase **Curvas y Superficies**.

Antes de nada, aún no sabemos, ni siquiera de forma vulgar y cotidiana lo que es una geometría aunque la hayamos trabajado varios años. Ésta es, el estudio **cuantitativo** de las formas y su evolucion para ciertas figuras en el espacio; es decir, vamos a estudiar qué aspecto y qué deformaciones podemos realizar a figuras del plano euclídeo o del espacio euclídeo tridimensional.

Aún así, no hemos definido lo que es una forma o una figura, pese a que su uso cotidiano nos permite tener una intuición de la materia que estudiamos.

Por último, antes de realizar un contraste de las distintas asignaturas que hemos visto, cabe destacar que el estudio que vamos a realizar es de carácter cuantitativo, es decir, no se va a asemejar al estudio de las formas y figuras de otras áreas como pueden ser el arte, la arquitectura, la moda...

1.1 Contraste de las distintas geometrías

Como ya recalcamos en la motivación, para saber dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos, vamos a realizar un contraste entre las asignaturas relacionadas con alguna de las áreas de la geometría, véase la figura 1; estas son: *Geometría I*, *Geometría II*, *Geometría III*, *Topología I*, *Topología II* y *Curvas y Superficies*.

Una vez visto esto, podríamos ya determinar que este documento pretende realizar una breve introducción al área que se conoce como **Geometría diferencial**[1].

2 Curvas en el plano y en el espacio

2.1 Curvas parametrizadas. Curvas regulares. Longitud de arco

Definicion 1 (Curvas en el espacio)**.** Definimos como **curva en el espacio** a cualquier aplicación diferenciable $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

Notación 2.1. En ocasiones, será de nuestro interés resaltar cuáles son las componentes de la curva, séase α; en ese caso, escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \tag{1}$$

donde $t \in I$ y $x, y, z : I \to \mathbb{R}$.

No obstante, aunque tratemos funciones, ya vimos que nuestro objetivo será estudiar formas de manera **cuantitativa**; por lo que nos interesará estudiar lo que llamamos *traza de la curva*, que no se debe confundir con la gráfica de la misma; será:

$$tr\ \alpha = im\alpha = \alpha(I) \tag{2}$$

[1] Actualmente, por motivos económicos, el nombre de esta disciplina suele ser **Análisis geométrico**

Cuadro 1: Contraste de las geometrías

Asignatura	**Espacio ambiente**	**Figuras**	**Soporte matemático**	**Área de estudio**
Geometría I	Espacio vectorial	Subespacios vectoriales: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial: $\cup$,$+$	Polinomios homogéneos de primer grado
Geometría II	Espacio métrico	Subespacios vectoriales: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial con métrica: $\cup$,$+$ $\perp$, $\sphericalangle$	Polinomios homogéneos de primer grado
Geometría III	Espacio afín métrico	Subespacios afines: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial con métrica: $\cup$,$+$ $\perp$, $\sphericalangle$, distancias, cónicas, cuádricas, etc.	Geometría algebraica
Topología I	ninguno / espacio topológico	Subespacios topológicos	Topología del espacio topológico: homeomorfismo de conjuntos	Topología intoductoria
Topología II	ninguno / espacio topológico	Subespacios topológicos	Topología del espacio topológico: homeomorfismo de conjuntos y teoría de grupos	Topología algebraica
Curvas y Superficies	curvas: $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ superficies: $\mathbb{R}^3$	Curvas y superficies	Todas las herramientas anteriores junto al análisis	Geometría diferencial

Ejemplo 2.1. Sean $a \in \mathbb{R}^3, v \in \mathbb{R}^3$ y definimos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por $\alpha(t) = a + tv$. Si nos fijamos, estamos tratando con una recta afín cuyo vector director es v. Su traza es la siguiente:

$$tr\ \alpha = \begin{cases} \{a\} & \text{si } v = 0 \\ R_{a,v} & \text{si } v \neq 0 \end{cases} \tag{3}$$

donde denotamos por $R_{a,v}$ a la **única** recta que pasa por a y tiene vector director v, que también notaremos por $a + \langle v \rangle$.

Si nos damos cuenta, podemos llegar a visualizar un caso peculiar, aquellas curvas cuya traza se queda contenida en un plano, dando lugar a la siguiente definición.

Definicion 2 (Curvas planas)**.** Diremos que una curva en el espacio $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ es una curva **plana** si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $tr\ \alpha \subset P$.

Por tanto, esta definición nos incita a pensar que debemos poder tratar las curvas planas como curvas en el espacio cuyo codominio es $\mathbb{R}^2$ y esto es así. Puesto que podemos pasar de P a $P(z = 0)$ con un movimiento rígido [2] de $\mathbb{R}^3$ esta concepción es posible.

De esta forma, podemos abstraernos y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$.

En la bibliografía de este área es habitual citar estas curvas como *parametrizadas* y *diferenciables*. En nuestro caso, ya hemos impuesto la segunda noción en la propia definición; además, cabe destacar que el adjetivo *parametrizada* destaca la dependencia sobre la variable independiente.

Ejemplo 2.2 (Algunos ejemplos básicos)**.** Veamos algunos ejemplos básicos de curvas en el espacio:

1. **Movimiento Rectilíneo Uniforme**: Volviendo al ejemplo anterior, consideramos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\alpha(t) = a + tv, \forall t \in \mathbb{R}$$

   con $a \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^3$ y $\alpha'(t) = v, \forall t \in \mathbb{R}$.

   Si usamos la interpretación física, tenemos que $\alpha(t)$ no es más que la posición del móvil en el instante $t \in \mathbb{R}$, así como que $\alpha'(t)$ es el vector velocidad del móvil en el instante de tiempo $t \in \mathbb{R}$, que será tangente a $tr\ \alpha$ en el punto $\alpha(t)$.

2. **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado**: Continuando con el ejemplo anterior, definimos $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\beta(t) = a + t^2 v, \forall t \in \mathbb{R}$$

   Aunque puede parecer poco intuitivo, lo que estamos haciendo no es trazar una parábola sino que estamos recorriendo la traza de α de forma mucho más

[2] Mantiene distancias y ángulos

rápida así como obviando la parte negativa de la misma, siempre lo hacemos en la dirección positiva de v.

De esta manera, podemos ya deducir que $tr\ \beta \subset tr\ \alpha$ siendo $tr\ \beta = R_0^+(a, v)$.

Desde el punto de vista físico, el movimiento es como botar una pelota sin rozamiento, cuando lanzamos la pelota ($t = -\infty$), si consideramos el suelo como a, tenemos que nos encontramos alejados. En el instante $t = 0$ tenemos que la pelota está en a con velocidad cero habiendo decrecido previamente y que conforme avanza el tiempo su velocidad aumenta.

Fijémonos que estamos hablando de que la velocidad aumenta o disminuye, es decir, que $\beta''(t) \neq 0$ cuando $t \neq 0$; de hecho, la aceleración es constantemente $2v$.

Si nos damos cuenta, el punto $a = \beta(0)$ es un punto complejo de entender, puesto que en ese intante la pelota no tiene velocidad, lo que da lugar a planos de tangencia o rectas tangentes degenerados [3]; esto será un punto crítico.

3. **Autointersecciones**: Consideremos $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4), \forall t \in \mathbb{R}$$

Si realizamos un estudio exhaustivo del comportamiento de la curva tenemos que ambos límites ($-\infty$ e ∞) se encuentran en el segundo y primer cuadrante; así como que

$$t^2 - 4 = 0 \iff t = \pm 2 \tag{4}$$

lo que nos da las abscisas donde la curva corta al eje de abscisas. En dichos puntos, es fácil ver, que $\delta(-2) = 0 = \delta(2)$. Entonces, tenemos un caso de **autointersección**, es decir, de dos instantes de tiempo cuyas imágenes por la curva son la misma.

De este ejemplo podemos deducir que una curva no tiene por qué ser inyectiva [4].

4. **Imagenes no derivables**: En este ejemplo, pretendemos mostra que, aunque una curva sea diferenciable, inyectiva, plana, étc. Ésta no tiene que dar la gráfica de una función; de hecho, en el ejemplo anterior vimos que, ni siquiera tenía que ser una función.

Consideramos $\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)\ \forall t \in \mathbb{R}$. Vemos que su velocidad es $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$ que se anula en el origen. Orbservamos, también, que su traza dispone de un *pico* en $t = 0$.

Como tiene *picos* y $tr\ \varepsilon = Gr(f(x) = x^{\frac{2}{3}})$[5] vemos que no es derivable aunque la curva ε sí lo sea.

[3] Más adelante se verá

[4] Si realizamos la simetría sobre el eje $y = x$ obtenemos lo que se conoce como *foluim de Descartes*

[5] Se obtiene tomando $x = t^2$, $y = t^3$, despejando t de la primera e igualando en la segunda

5. **La circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en $P \subset \mathbb{R}^2$ o movimiento circular acelerado**: Consideramos $\zeta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$\zeta(t) = a + r(\cos\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \sin\left(\frac{t}{r}\right) e_2)$$

donde $a \in \mathbb{R}^3$, e_1, e_2 con $|e_1| = 1 = |e_2|$ y $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$.

Notemos que $\zeta(t) \in P = a + \langle e_1, e_2 \rangle \, \forall t \in \mathbb{R}$, lo que nos asegura que ζ es una curva plana. Además, podemos notar que la distancia de $\zeta(t)$ a a es siempre r puesto que

$$|\zeta(t) - a|^2 = r^2(\cos^2\left(\frac{r}{t}\right) + \sin^2\left(\frac{r}{t}\right)) = r^2 \iff |\zeta(t) - a| = r \forall t \in \mathbb{R}$$

Por tanto, podemos ya llamar a dicha parametrización como **la** circunferencia de centro a y radio r dentro de P. Además, cabe destacar que el motivo de la distinción es que, aunque habrá varias curvas cuya traza sea la misma, ninguna de ellas recorrera la circunferencia destrita por la traza de forma uniforme y organizada como lo hace ζ [6].

Además, para ver que el un movimiento circular uniforme, basta ver que

$$\zeta'(t) = -\left(\sin\left(\frac{t}{r}\right)\right) e_1 + \cos\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

lo que nos asegura que la velocidad es independiente de r como escalar. Por último, cabe destacar que la aceleración no es constante por lo que este movimiento no es uniforme.

6. **La imagen de una curva inyectiva en un intervalo no tiene por qué ser homeomorfa al intervalo**: Consideremos la curva $\eta : I \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3}\right) \forall t \in I =]-1, \infty[$$

Claramente, tenemos que $\eta'(0) = (,0)$ y $\lim_{t\to\infty} \eta(t) = (0,0)$ de donde tenemos que la curva nunca se cierra; sin embargo, la pintamos cerrada debido a que ya pasó por ese punto en $t = 0$.

Veamos ahora que $tr\ \eta$ y I no son homeomorfos, basta tomar un entorno de $(0,0)$ para ver que no lo son pues, supuesto que lo fueran, quitando el punto $(0,0)$ a ambos entornos perderíamos la condición de homeomorformidad.

Por último,

$$\eta'(t) = \left(\frac{3-6t^2}{(1+t^3)^2}, \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2}\right) \forall t \in I$$

de donde tomando $t = 1$ vemos que $\eta'(1) \neq 0$ y, por tanto, $\eta' \neq 0$.

[6] Basta sustituir t por t^3 para obtener otra que recorre la misma circunferencia de forma un poco más caótica.

Ejercicio 1. Probar que η es inyectiva.

Demostración. Para ello, supongamos que no lo fuera, es decir, que existen $x \neq y \in I$ tales que $\eta(x) = \eta(y)$ y buscamos llegar a que $x = y$. Para ello, podemos ver que se cumple que:

$$\gamma(t) = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t \quad \forall t \in I \setminus \{0\} \tag{5}$$

de donde, como $\eta(x) = \eta(y)$ se tiene que:

- Si $\eta_1(x) = \frac{3x}{1+x^3} = \frac{3y}{1+y^3} = \eta_1(y) \neq 0$ tenemos que $x = \gamma(x) = \gamma(y) = y$.
- Si $\eta_1(x) = \frac{3x}{1+x^3} = \frac{3y}{1+y^3} = \eta_1(y) = 0$, en ese caso, $0 = \eta_1(x)$, de donde necesariamente se tiene que $x = 0$ de donde $y = 0$.

Por tanto hemos probado ya la inyectividad de η.

□

Definicion 3 (Recta tangente)**.** Dada una curva en el espacio $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, se define la **recta tangente** a α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$ y la notaremos por $R_{\alpha(t),\alpha'(t)} \equiv R_t$, donde en este último caso estamos abusando bruscamente de la notación pues se confunde $\alpha(t)$ con t, ya que las autointersecciones producen varios instantes que pasan por el mismo punto con distinta velocidad.

Sin embargo, cualquiera puede llegar a la conclusión de que la definición no es correcta completamente. El motivo radica en que puede haber degeneraciones como ya se comentó al inicio de la sección ya que, si $\alpha'(t) = 0$ tendríamos que R_t sería un único punto, perdiendo así la noción de recta.

Definicion 4 (Puntos singulares y regulares)**.** En la situación de la definición 3 diremos que los puntos $\alpha(t) \in tr\ \alpha$ tales que $\alpha'(t) = 0$ son puntos **singulares**. Sus análogos serán los puntos **regulares**.

Por tanto, diremos que una curva es **regular** si todos sus puntos son regulares.

Ejemplo 2.3. Estudiamos cada uno de los ejemplos anteriores:

- Como $\alpha'(t) = v$, tendremos que es regular si, y sólo si, $v \neq 0$.
- Como $\beta'(t) = tv$, tenemos que no es regular, pues en $t = 0$ tenemos un punto singular.
- Como $\delta'(t) = (3t^2 - 4, 2t)$ tenemos que no se anula para ningún valor de t, lo que nos dice que es regular.
- Como $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$, no es regular pues para $t = 0$ tenemos un punto singular.
- Ya tenemos calculada su derivada, y es fácil ver que ésta nunca se anula, de donde deducimos que no tiene puntos singulares.

- Aquí también tenemos calculada la derivada de donde al igualar a 0 obtenemos el sistema
$$\begin{cases} 3-6t^2=0 \\ 6t-3t^4=0 \end{cases}$$
que no tiene solución. Por tanto, es una curva regular.

Veamos ahora un resultado que nos dará una concepción distinta de las curvas, pues la familia de todas las curvas es **más** grande que la familia de las funciones reales de variable real.

A partir de ahora, salvo que se diga lo contrario, consideraremos que todas las curvas que aparecen son diferenciables; y, en un principio, entenderemos por diferenciable que es infinitamente derivable.[7]

Proposición 2.1. *La gráfica de una función real de variable real es la traza de una curva.*

Demostración. Supongamos que $f : I \to \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto. POr su parte, por definición, sabemos que la gráfica de la función f es el conjunto:

$$Gr(f) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R} \wedge y = f(x)\right\} \tag{6}$$

Por tanto, basta definir la siguiente aplicación para obtener el resultado:

$$\begin{aligned} \phi_f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \phi_f(t) = (t, f(t)) \end{aligned}$$

Claramente es una aplicación de un interavalo abierto en R^d con $d \in \mathbb{N}$ y es diferenciable por serlo componente a componente, es decir, es una curva plana. □

Observación. Cabe destacar que el recíproco de este resultado es falso, basta tomar como contraejemplo $\delta(t)$; pues dada cualquier recta del plano, la proyección de $\delta(t)$ sobre ella no es inyectiva, lo que nos indica que no puede ser la gráfica de una función real de variable real.

Hasta ahora, todas las curvas que hemos estudiado han sido planas [8], lo que puede llevarnos a pensar que la mayoría de ellas lo son. Sin embargo, esta concepción no es cierta, es completamente al revés. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 2.4 (Curvas no planas)**.** Tomamos $a, b \in \mathbb{R}$ verificando $a^2 + b^2 \neq 0$ y $\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$\theta(t) = \left(a\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), a\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), \frac{bt}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

Debemos distinguir casos:

[7] Esto realmente no es así, cuando lo veamos más adelante tomaremos la concepción correcta

[8] Una condición necesaria es que tenga medida cero

- Si $a = 0$: En ese caso, necesariamente $b \neq 0$ y $\theta(t) = (0, 0, t)$ obteniendo que $tr\ \theta = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3\}$ que es plana.
- Si $b = 0$: En ese caso, al igual que en el caso anterior, se deduce que $a \neq 0$ y que $tr\ \theta \subset P(z = 0)$ por lo que vuelve a ser plana y es la circunferencia de centro $(0, 0, 0)$ y radio $|a|$ dento de $P(z = 0)$.
- Si $ab \neq 0$: Si tomamos $t \in \mathbb{R}$ tenemos que

  $$x(t)^2 + y(t)^2 = a^2 \implies \forall t \in \mathbb{R} \theta(t) \in \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = a^2\right\}$$

  Por tanto, podemos deducir ya que nuestra curva está contenida en un cilindro circular recto de radio $|a|$ y cuyas generatrices son paralelas al eje z. Entonces, podemos ya deducir que es una **hélice circular recta de eje z y de radio $|a|$**.

  Simplemente como curiosidad, vemos que si $ab = 0$, a medida que el tiempo avanza, el móvil que se desplaza por la curva, aumenta su coordenada z produciendo un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, la hélice es *levógira*. En caso contrario, sería *dextrógira*.

Ejercicio 2. Prueba que cualquier hélice circular no es plana

Demostración. Procederemos por reducción al absurdo, supongamos que existen $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tales que

$$tr\ \theta \subset \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : Ax + By + Cz + D = 0\right\}$$

donde A, B, C no se anulan de forma simultánea.

En definitiva, hemos supuesto que la curva en cuestión es plana, y buscamos llegar a una contradicción. Ahora bien, sabemos que

$$\theta(t) = \left(a \cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), a \sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

y que está dentro del plano previamente definido por lo que se cumple que

$$A \cdot a \cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + B \cdot a \sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + C \cdot \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} + D = 0$$

De donde, al derivar [9], obtenemos una condición que debe cumplirse en todos los puntos de la curva. Nuestro objetivo será probar que $A = B = C = 0$, lo que nos dará la contradicción. Las ecuaciones obtenidas son [10]:

$$-Aa \frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2 + b^2}} + Ba \frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2 + b^2}} + C \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0 \tag{7}$$

[9] Lo que estamos diciendo es que el vector velocidad de la curva se queda en el plano, es decir, que la recta tangente de la curva en ese punto está dentro del plano.

[10] Usaremos que, por definición de curva, la ecuación obtenida es diferenciable

Y derivando otra vez:

$$-Aa\frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{a^2+b^2}+Ba\frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{a^2+b^2}=0 \tag{8}$$

Ahora bien, sabemos que las ecuaciones (7) y (8) se cumplen para cualquier punto de definición de la curva de donde :

- Si tomamos $t=0$ obtenemos que $-\frac{Aa}{a^2+b^2}=0$ al sistituir en (8), de donde se deduce que $A=0$, pues $a\neq 0$.
- Si tomamos ahora $t=\frac{\pi}{2}(a^2+b^2)$ obtenemos que $B=0$ de la misma forma.

Por tanto, ya tenemos que $A=0=B$; sin embargo, sustituyendo esto en (7) deducimos que $Cb=0$, de donde C también se anula. Es decir, la curva no puede ser plana. □

Observación. Otras formas de probar esta cuestión son:

- Realizar un cambio de parámetro, es decir, considerar otra curva distinta cuya traza sea identica a la nuestra de forma que se simplifiquen las cuentas. Como ejemplo, si tomamos el cambio de parámetro $t=\lambda(a^2+b^2)$ obtenemos la curva

  $$\alpha(\lambda)=(a\cos(\lambda),a\sin(\lambda),b\lambda)$$

  que nos simplifica las cuentas.
- A la hora de resolver el sistema de ecuaciones obtenido al derivar la condición del plano sobre la curva θ podemos hacer un argumento de determinantes al tener un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas homogéneo con infinitas soluciones. Por tanto, tendríamos que el determinante de la matriz de coeficientes no se anularía dando lugar a una condición que prueba $A^2+B^2=0$.
- Tomando cuatro puntos afínmente independientes.

Veamos otro ejercicio sobre la *helice circular recta.*

Ejercicio 3. Prueba que la hélice circular recta es una curva regular, calcula cuánto vale $|\theta'(t)|$ e interpreta geométricamente el parámetro b.

Demostración. Trataremos de ver cada uno de los aspectos por separado:

1. **Curva regular**. Para probar esto bastará deducir que no existen puntos sin plano tangente definido, es decir, cuya derivada componente a componente no se anula. Para ello, debemos calcular la derivada que es:

   $$\theta'(t)=\left(-a\frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}},a\frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

Ahora bien, teniendo en cuenta que ningún denominador se anula, si existiera $t \in \mathbb{R}$ que cumpliera que $\theta'(t) = 0$, se tendría el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \sin\left(\dfrac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = 0 \\ \cos\left(\dfrac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

De donde deducimo que $a \neq 0$ y que no existe ese t, pues el seno y el coseno no se anulan simultáneamente en nungún punto.

2. **Módulo de $\theta'(t)$.** Haciendo unas pocas de cuentas sale que $|\theta'(t)| = 1 \forall t \in \mathbb{R}$.[11]

3. **Interpretación del parámetro b.** Veamos que b es lo que se conoce como el paso del tornillo, es decir, la distancia entre dos puntos de la misma generatriz del cilindro en el que se encuentra la curva. Para ello, bastará tomar los puntos $t = 0$ y $t = 2\pi$, de donde tenemos que:

$$\theta(0) = (a, 0, 0) \ \wedge \ \theta(2\pi) = \left(a, 0, \frac{2b\pi}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

De donde, al calcular la distancia entre ambos puntos obtenemos que $|\theta(2\pi) - \theta(0)| = \left|\frac{2b\pi}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$ y despejando b obtenemos la interpretación geométrica buscada,

$\square$

Vamos, ahora, a trabajar la última parte de esta sección; dada una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, en ocasiones pretenderemos medir la distancia que recorre el móvil a lo largo de la curva entre dos puntos dados. Es decir, tomados $a, b \in I$ buscamos calcular la distancia que recorre el móvil entre a y b. La idea clave será considerar el intervalo compacto $[a, b] \subset I$ y considerar, sobre él, una serie de particiones del mismo que nos darán una poligonal de la curva y nos aproximará su longitud.

Observación (Problema con las autointersecciones). Si nos fijamos, puesto que no estamos pidiendo que nuestra curva sea regular, esta podrá contener puntos con velocidad nula dando lugar a situaciones como recorrer el camino hacia atrás.

Por tanto, cuando calculamos la longitud de la curva entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ no estamos contemplando esta situación, de ahí que calculemos la longitud de la curva entre a y b.

Definicion 5 (Longitud de la curva en una partición)**.** Se define la **longitud de la curva α entre a y b correspondiente a la partición** $P = \{t_0 = a < t_1 < \cdots < t_n = b\}$ como la cantidad:

$$L_a^b(\alpha, P) = \sum_{i=1}^{n} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$$

[11] Basta usar la definición de norma euclídea y una razón trigonométrica clásica.

Proposición 2.2 (Acotación de longitudes)**.** *Dados una curva* $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$*,* $a, b \in I$ *y* $P = \{t_0 = a < t_1 < \cdots < t_n\}$ *, se tiene que*

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha, P) \leq \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

Demostración. Para ver la primera desigualdad basta aplicar la desigualdad triangular de forma consecuente. Para el segundo caso, usando la regla de Barrow para cada uno de los subintervalos $[t_{i-1}, t_i]$ obtenemos que

$$L_a^b(\alpha, P) = \left| \int_{t_0}^{t_1} \alpha'(t) \, dt \right| + \left| \int_{t_1}^{t_2} \alpha'(t) \, dt \right| + \cdots + \left| \int_{t_{n-1}}^{t_n} \alpha'(t) \, dt \right| \leq$$

$$\int_{t_0}^{t_1} |\alpha'(t)| \, dt + \int_{t_1}^{t_2} |\alpha'(t)| \, dt + \cdots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} |\alpha'(t)| \, dt = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

□

2.2 Teoría local de curvas regulares planas: curvatura y diedro de Frenet

2.3 Teoría local de curvas regulares en el espacio: curvatura, torsión y triedro de Frenet

2.4 Teorema fundamental de curvas en el espacio

3 Superficies en el espacio

3.1 Definición de superficie y ejemplos

3.2 El cambio de parámetros. Funciones y aplicaciones diferenciables sobre superficies