

FEUILLE D'EXERCICES N°7

Dualité de FENCHEL

Éclatement primal-dual

Exercice 1 – Propriétés de la conjuguée convexe

Module A7, Propositions 1 et 2 et Corollaire 1

Soit $J : \mathcal{X} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une fonction de domaine non vide.

- (a) Montrer que J^* est une fonction convexe.
- (b) Montrer que J^* est une fonction s.c.i.
- (c) On suppose que J admet une minorante affine. Montrer que J^* est propre.
- (d) En déduire que si J est convexe et propre, alors J^* est convexe, propre et s.c.i.

Exercice 2 – Théorème de FENCHEL–MOREAU

Module A7, Lemme 1, Proposition 5 et Théorème 1

Soit $J : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ une fonction convexe, s.c.i et propre.

- (a) Montrer que $\forall (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, \quad J(x) + J^*(y) \geq \langle x, y \rangle$
- (b) En déduire que J admet une minorante affine et que

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad J(x) \geq \sup_{y \in \mathcal{X}} \{ \langle x, y \rangle - J^*(y) \}$$
- (c) Montrer que J^{**} est l'ensemble supérieure des minorantes affines de J .
- (d) En déduire que

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad J(x) = \sup_{y \in \mathcal{X}} \{ \langle x, y \rangle - J^*(y) \}$$

Exercice 3 – Quelques exemples

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer J^* .

- (a) $J : \begin{cases} \mathcal{X} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{1}{2} \|x\|^2 \end{cases}$
- (b) $J : \begin{cases} \mathcal{X} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \|x\| \end{cases}$
- (c) $J : \begin{cases} \mathcal{X} & \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \\ x & \mapsto \chi_{\mathcal{B}(0,1)} \end{cases}$

Exercice 4 – Règle de bascule

Module A7, Lemme 3, Propositions 6 et 7

Soit $J : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ une fonction convexe. Soit $x \in \text{dom } J$ et $p \in \mathcal{X}$.

- (a) Montrer que $p \in \partial J(x) \iff J(x) + J^*(p) = \langle p, x \rangle$
- (b) Soit $y \in \mathcal{X}$ et $p \in \partial J(x)$. Montrer que

$$\langle p - y, x \rangle + J^*(y) \geq \langle p, x \rangle - \sup_{y \in \mathcal{X}} \{ \langle y, x \rangle + J^*(y) \}$$

En déduire que $\langle p - y, x \rangle + J^*(y) \geq \langle p, x \rangle - \langle p, x \rangle + J^*(p)$

- (c) Montrer que $x \in \partial J^*(p)$.
- (d) On suppose que J est s.c.i. et propre. Montrer que

$$p \in \partial J(x) \iff x \in \partial J^*(p)$$

Exercice 5 – Règles de calcul

Module A7, Propositions 8 et 9

Soit $f : \mathcal{X} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une fonction. Soit $x^0 \in \mathcal{X}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour chacune des fonctions suivantes, calculer J^* en fonction de f^* .

$$(a) \quad J : \begin{cases} \mathcal{X} & \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x & \mapsto \alpha f(x) \end{cases} \quad (b) \quad J : \begin{cases} \mathcal{X} & \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x & \mapsto f(\alpha x) \end{cases} \quad (c) \quad J : \begin{cases} \mathcal{X} & \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x & \mapsto f(x - x^0) \end{cases}$$

Exercice 6 – Identité de MOREAU

Module A7, Proposition 11

Soit $J : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ une fonction convexe, s.c.i. et propre. Soit $x^0 \in \mathcal{X}$ et $x^+ = \text{prox}_J(x^0)$. On pose

$$p = x^0 - x^+$$

- (a) Justifier que $p \in \partial J(x^+)$. En déduire que $x^+ \in \partial J^*(p)$.
- (b) Montrer que $p = \text{prox}_{J^*}(x^0)$.
- (c) En déduire que $\forall x \in \mathcal{X}, \quad x = \text{prox}_J(x) + \text{prox}_{J^*}(x)$

Exercice 7 – Éclatement de DYKSTRA

Soit $f, h : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ deux fonctions convexes, s.c.i. et propres. Soit $r \in \mathcal{X}$. On s'intéresse au problème d'optimisation suivant

$$\min_{x \in \mathcal{X}} \left\{ J(x) := f(x) + h(x) + \frac{1}{2} \|x - r\|^2 \right\}$$

- (a) Justifier que le problème considéré possède une unique solution.
- (b) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, \quad f(x) + h(x) = \sup_{(y_1, y_2) \in \mathcal{X}^2} \left\{ \langle y_1 + y_2, x \rangle - f^*(y_1) - h^*(y_2) \right\}$
- (c) Écrire le problème considéré comme un problème de recherche point-selle.
- (d) Montrer que le problème dual considéré est le problème de minimisation

$$\min_{(y_1, y_2) \in \mathcal{Y}^2} \left\{ f^*(y_1) + h^*(y_2) + \frac{1}{2} \|y_1 + y_2 - r\|^2 \right\}$$

- (e) Caractériser au premier ordre les solutions duales (y_1^*, y_2^*) . En déduire que

$$0 \in \partial J(r - y_1^* - y_2^*)$$

Que peut-on en conclure quant à la solution primale ?

Exercice 8 – Problèmes composites

Module B7, Proposition 1

Soit $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ deux fonctions convexes, s.c.i. et propres. Soit $A : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ un opérateur linéaire borné. On considère le problème d'optimisation suivant :

$$\min_{x \in \mathcal{X}} f(Ax) + g(x) \quad (\mathcal{P}_{C-P})$$

- (a) On suppose qu'il existe une solution primale x^* . Les caractériser au premier ordre.
- (b) Justifier que $\partial f(Ax^*)$ est non vide. Soit $p \in \partial f(Ax^*)$. Montrer que $-A^*p \in \partial g(x^*)$
- (c) En utilisant la conjuguée convexe de f , proposer une formulation primale-duale n'impliquant aucune composition de fonctions.
- (d) Écrire le problème dual associé. Exprimer la fonction duale à l'aide de f^* , g^* et A^* .
- (e) Caractériser les solutions duales. En déduire que p est une solution duale.
- (f) Montrer que le problème primal-dual considéré vérifie la propriété de dualité forte.
- (g) En déduire que (x^*, p) est un point-selle d'une fonction que l'on précisera.