
Calibration bayésienne par divergence KL discrète et distance de Wasserstein

for Sorbonne Université

Eyal Cohen¹, Eline Pot¹, Saïd Raïssi¹

¹LPSM

Supervisor(s):

Nicolas Bousquet¹

Table of Contents

- ▶ Rappels sur le cadre bayésien classique
- ▶ Formalisation du problème de calibration
- ▶ Distance de Wasserstein
- ▶ Familles Exponentielles et Prior Conjugués
- ▶ Priors de Gumbel



Rappels sur le cadre bayésien classique

1 Rappels sur le cadre bayésien classique

Un modèle bayésien est la donnée, pour une variable aléatoire X d'une loi conditionnelle et d'une loi *a priori*

$$X \sim f(X|\theta) \quad \theta \sim \pi$$

On cherche à représenter le comportement d'une variable aléatoire X définie sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$, de densité supposée :

$$f(x) = \int_{\Theta} f(x|\theta)\pi(\theta)d\theta \tag{1}$$

avec :

- $x \mapsto f(x|\theta)$ est une mesure de probabilité paramétrique connue
- Θ est un espace probabilisé

→ Quel choix de la loi *a priori* π et de sa calibration ?

Table of Contents

- ▶ Rappels sur le cadre bayésien classique
- ▶ Formalisation du problème de calibration
- ▶ Distance de Wasserstein
- ▶ Familles Exponentielles et Prior Conjugués
- ▶ Priors de Gumbel



Formalisation du problème de calibration

2 Formalisation du problème de calibration

- Paramétrer π avec des hyperparamètres ξ .
- Contraintes quantiles : $\mathbb{P}(X \leq x_i) = \alpha_i$

$\pi(\theta) = \pi(\theta|\xi)$ avec $\xi \in \Xi$ un ensemble d'hyperparamètres dans Ξ supposé de dimension fini

Loi a priori prédictive : $f(x) = f(x|\xi)$, de fonction de répartition $\mathbb{P}(X \leq x_i) = \mathbb{P}(X \leq x_i|\xi)$.

→ Comment définir une règle de calibration de ξ en fonction de nos contraintes ?

En introduisant les $\alpha_i(\xi) = \mathbb{P}(X \leq x_i|\xi)$, on cherche alors à résoudre le problème suivant :

$$\min_{\xi \in \Xi} \mathcal{D}(\alpha_i - \alpha_i(\xi)) \quad \text{avec } \mathcal{D} \text{ une distance à définir}$$

On étudiera 3 types de perte :

- La perte $L2$
- La distance KL
- La distance de Wasserstein

Cas de la perte L_2

2 Formalisation du problème de calibration

L'idée la plus intuitive est d'utiliser une perte quadratique, pondérée par des poids $(w_i)_{i=1}^n$:

$$\min_{\xi \in \Xi} \sum_{i=1}^p w_i (\alpha_i(\xi) - \alpha_i)^2$$

Cas de la distance KL

2 Formalisation du problème de calibration

Definition

Pour deux probabilités discrètes P et Q définies sur un ensemble \mathcal{X} , la divergence de Kullback-Leibler est définie par :

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) \log \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right)$$

- Dans notre cas, la perte KL s'écrit :

$$\min_{\xi \in \Xi} \sum_{i=0}^p (\alpha_{i+1} - \alpha_i) \log \left(\frac{\alpha_{i+1} - \alpha_i}{\alpha_{i+1}(\xi) - \alpha_i(\xi)} \right)$$

où $\alpha_0(\xi) = \alpha_0 = 0$ et $\alpha_{p+1}(\xi) = \alpha_{p+1} = 1$

- Avec $p = 2$, le problème se réécrit :

$$\min_{\xi \in \Xi} \alpha_1 \log \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_1(\xi)} \right) + (\alpha_2 - \alpha_1) \log \left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{\alpha_2(\xi) - \alpha_1(\xi)} \right) + (1 - \alpha_2) \log \left(\frac{1 - \alpha_2}{1 - \alpha_2(\xi)} \right)$$

- Approche de résolution numérique

Table of Contents

- ▶ Rappels sur le cadre bayésien classique
- ▶ Formalisation du problème de calibration
- ▶ Distance de Wasserstein
Definitions
- ▶ Familles Exponentielles et Prior Conjugués
- ▶ Priors de Gumbel



Definition (Transport Optimal)

La relaxation de Kantorovitch du problème de Monge, donne une formulation du problème de transport optimal comme suit:

$$L_C(a, b) = \min_{\mathbf{P} \in \mathbf{U}(a, b)} \langle \mathbf{C}, \mathbf{P} \rangle = \sum_{i, j} \mathbf{C}_{i, j} \mathbf{P}_{i, j}$$

$$\mathcal{L}_C(\alpha, \beta) = \inf_{\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)} \int_{X \times Y} c(x, y) d\pi(x, y)$$

Where $\mathbf{U}(a, b) = \{\mathbf{P} \in \mathbb{R}_+^{n \times m} : \mathbf{P} \mathbf{1}_m = a \text{ and } \mathbf{P}^T \mathbf{1}_n = b\}$ and $\mathcal{U}(\alpha, \beta) = \{\pi \in \mathcal{M}_+^1(X \times Y) : P_{X\#}\pi = \alpha \text{ and } P_{Y\#}\pi = \beta\}$.

Definitions

3 Distance de Wasserstein

Definition (Transport Optimal)

La relaxation de Kantorovitch du problème de Monge, donne une formulation du problème de transport optimal comme suit:

$$L_C(a, b) = \min_{\mathbf{P} \in \mathbf{U}(a, b)} \langle \mathbf{C}, \mathbf{P} \rangle = \sum_{i, j} \mathbf{C}_{i, j} \mathbf{P}_{i, j}$$

$$\mathcal{L}_C(\alpha, \beta) = \inf_{\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)} \int_{X \times Y} c(x, y) d\pi(x, y)$$

Where $\mathbf{U}(a, b) = \{\mathbf{P} \in \mathbb{R}_+^{n \times m} : \mathbf{P} \mathbf{1}_m = a \text{ and } \mathbf{P}^T \mathbf{1}_n = b\}$ and $\mathcal{U}(\alpha, \beta) = \{\pi \in \mathcal{M}_+^1(X \times Y) : P_{X\#} \pi = \alpha \text{ and } P_{Y\#} \pi = \beta\}$.

Definition

La distance de Wasserstein découle assez naturellement de ce problème:

$$W_p(a, b) = (L_{D^p}(a, b))^{\frac{1}{p}}$$

$$\mathcal{W}_p(\alpha, \beta) = (d^p(\alpha, \beta))^{\frac{1}{p}}$$

Algorithmes d'optimisation de Sinkhorn

3 Distance de Wasserstein

Nous considérons un transport optimal avec pénalisation entropique.

On peut écrire: $P = \text{diag}(u)K\text{diag}(v)$ avec K le noyau de Gibbs $\exp(-C/\epsilon)$.

This leads to an alternating optimization algorithm:

Algorithm Sinkhorn Algorithm

Require: α, β distributions, C une matrice de coup, ϵ le facteur de régularisation entropique, T le nombre d'itérations maximal.

- 1: **return** P un plan de transport optimal entre α et β
 - 2: $u_0 \leftarrow \text{ones}(\text{len}(\alpha))$
 - 3: $v_0 \leftarrow \text{ones}(\text{len}(\beta))$
 - 4: $K \leftarrow \exp(-\frac{C}{\epsilon})$
 - 5: **for** $i \in \{1 : T\}$ **do**
 - 6: $u_{i+1} \leftarrow \frac{\alpha}{Kv}$
 - 7: $v_{i+1} \leftarrow \frac{\beta}{K^T u}$
 - 8: **end for**
 - 9: $P = \text{diag}(u_T)K\text{diag}(v_T)$
-

Algorithme d'optimisation de Sinkhorn

3 Distance de Wasserstein

On peut le réécrire comme:

$$P_{i+1} = \text{prox}_{\frac{1}{\epsilon}}^{\text{KL}}(P_i) = \underset{P \in \mathbb{R}_+^{n \times m}}{\text{argmin}} \text{KL}(P || P_i) + \frac{1}{\epsilon} \langle P, \pi \rangle + \iota_{U(a,b)}(P)$$

En voyant cette formulation, nous avons pensé (et pensons toujours un peu) que chercher un algorithme de calibration basé sur cet algorithme serait prometteur. Malheureusement par manque de temps nous avons opté pour la résolution numérique que nous présentons plus tard.

Table of Contents

- ▶ Rappels sur le cadre bayésien classique
- ▶ Formalisation du problème de calibration
- ▶ Distance de Wasserstein
- ▶ Familles Exponentielles et Prior Conjugués
Familles Exponentielles
- ▶ Priors de Gumbel



Famille Exponentielles

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

Pipeline :

- On se place dans le cas où $X|\theta$ appartient à la famille exponentielle

$$f(x|\theta) = \exp(t(\theta)x - \phi(\theta))h(x)$$

Famille Exponentielles

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

Pipeline :

- On se place dans le cas où $X|\theta$ appartient à la famille exponentielle

$$f(x|\theta) = \exp(t(\theta)x - \phi(\theta))h(x)$$

- On calcule

$$|I(\theta)|^{1/2}$$

Famille Exponentielles

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

Pipeline :

- On se place dans le cas où $X|\theta$ appartient à la famille exponentielle

$$f(x|\theta) = \exp(t(\theta)x - \phi(\theta))h(x)$$

- On calcule

$$|I(\theta)|^{1/2}$$

- On formule les prior à une constante près en fonction des ξ

$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \propto \exp(\alpha \cdot \theta - \beta \phi(\theta)) |I(\theta)|^{1/2}$$

Avec :

$$\alpha = \sum_{i=1}^m t(\tilde{x}_i)$$

et $m = \beta$

Famille Exponentielles

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

Pipeline :

- On se place dans le cas où $X|\theta$ appartient à la famille exponentielle

$$f(x|\theta) = \exp(t(\theta)x - \phi(\theta))h(x)$$

- On calcule

$$|I(\theta)|^{1/2}$$

- On formule les prior à une constante près en fonction des ξ

$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \propto \exp(\alpha \cdot \theta - \beta \phi(\theta)) |I(\theta)|^{1/2}$$

Avec :

$$\alpha = \sum_{i=1}^m t(\tilde{x}_i)$$

et $m = \beta$

- Identification d'une loi adéquate en fonction de la forme du proportionnel

Famille Exponentielles

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

Pipeline :

- On se place dans le cas où $X|\theta$ appartient à la famille exponentielle

$$f(x|\theta) = \exp(t(\theta)x - \phi(\theta))h(x)$$

- On calcule

$$|I(\theta)|^{1/2}$$

- On formule les prior à une constante près en fonction des ξ

$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \propto \exp(\alpha \cdot \theta - \beta \phi(\theta)) |I(\theta)|^{1/2}$$

Avec :

$$\alpha = \sum_{i=1}^m t(\tilde{x}_i)$$

et $m = \beta$

- Identification d'une loi adéquate en fonction de la forme du proportionnel
- Formulation de la fonction de répartition à priori prédictive $P(X \leq x_i) = \int_{\Theta} \left(\int_{-\infty}^{x_i} f(u|\theta) du \right) \pi_{\xi}(\theta) d\theta$

Famille Exponentielles

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

Pipeline :

- On se place dans le cas où $X|\theta$ appartient à la famille exponentielle

$$f(x|\theta) = \exp(t(\theta)x - \phi(\theta))h(x)$$

- On calcule

$$|I(\theta)|^{1/2}$$

- On formule les prior à une constante près en fonction des ξ

$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \propto \exp(\alpha \cdot \theta - \beta \phi(\theta)) |I(\theta)|^{1/2}$$

Avec :

$$\alpha = \sum_{i=1}^m t(\tilde{x}_i)$$

et $m = \beta$


- Identification d'une loi adéquate en fonction de la forme du proportionnel
- Formulation de la fonction de répartition à priori prédictive $P(X \leq x_i) = \int_{\Theta} \left(\int_{-\infty}^{x_i} f(u|\theta) du \right) \pi_{\xi}(\theta) d\theta$
- Optimisation sur ξ sur les différentes distances $L2, KL, W2$

Loi exponentielle :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

- On a

$$t(x) = x, \quad \Phi(\theta) = -\log(-\theta), \quad h(x) = 1$$



Loi exponentielle :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

- On a

$$t(x) = x, \quad \Phi(\theta) = -\log(-\theta), \quad h(x) = 1$$

- Puis :

$$\alpha = \sum_{i=1}^m \tilde{x}_i \quad \beta = m$$

Loi exponentielle :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

- On a

$$t(x) = x, \quad \Phi(\theta) = -\log(-\theta), \quad h(x) = 1$$

- Puis :

$$\alpha = \sum_{i=1}^m \tilde{x}_i \quad \beta = m$$

- On a identifié :

$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \sim \mathcal{G}(\beta, \alpha)$$

Loi exponentielle :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

- On a

$$t(x) = x, \quad \Phi(\theta) = -\log(-\theta), \quad h(x) = 1$$

- Puis :

$$\alpha = \sum_{i=1}^m \tilde{x}_i \quad \beta = m$$

- On a identifié :


$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \sim \mathcal{G}(\beta, \alpha)$$

- La fonction de répartition du prédictif à priori :


$$\begin{aligned} P(X \leq x_i) &= \int_{\Theta} \left(\int_{-\infty}^{x_i} f(u|\theta) du \right) \pi_{\xi}(\theta) d\theta \\ &= 1 - \frac{\beta^{\alpha}}{(\beta - x_i)^{\alpha}} \end{aligned} \tag{2}$$

Résultats pour la loi Exponentielle


4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués



(a) L2



(b) KL




(c) W2


Figure: 2 Quantiles - Loss w.r.t. m

Résultats pour la loi Exponentielle


4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués



(a) L2




(b) KL




(c) W2


Figure: 2 Quantiles - Loss w.r.t. m



(a) L2



(b) KL




(c) W2


Figure: 2 Quantiles - Loss w.r.t. the $(\tilde{x}_i)_{i=1}^m$

Résultats pour la loi Exponentielle


4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués



(a) L2



(b) KL




(c) W2

Figure: 5 Quantiles - Loss w.r.t. m

Loi normale :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués


- On a $t(x) = \frac{x}{\sigma^2}$, $\Phi(\theta) = \frac{\theta^2}{2\sigma^2}$, $h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(x^2/(2\sigma^2))$



Loi normale :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

- On a $t(x) = \frac{x}{\sigma^2}$, $\Phi(\theta) = \frac{\theta^2}{2\sigma^2}$, $h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(x^2/(2\sigma^2))$
- On cherche à identifier μ avec $x|\theta \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$



Loi normale :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

- On a $t(x) = \frac{x}{\sigma^2}$, $\Phi(\theta) = \frac{\theta^2}{2\sigma^2}$, $h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(x^2/(2\sigma^2))$
- On cherche à identifier μ avec $x|\theta \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- On a identifié :

$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \sim \mathcal{N}\left(\frac{\alpha}{\beta}, \frac{4}{\beta}\right)$$

Loi normale :

4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués

- On a $t(x) = \frac{x}{\sigma^2}$, $\Phi(\theta) = \frac{\theta^2}{2\sigma^2}$, $h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(x^2/(2\sigma^2))$
- On cherche à identifier μ avec $x|\theta \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- On a identifié :


$$\pi(\theta|\alpha, \beta) \sim \mathcal{N}\left(\frac{\alpha}{\beta}, \frac{4}{\beta}\right)$$

- La fonction de répartition du prédictif à priori :


$$\begin{aligned} P(X \leq x_i) &= \int_{\Theta} \left(\int_{-\infty}^{x_i} f(u|\theta) du \right) \pi_{\xi}(\theta) d\theta \\ &= 0.5 \times \frac{1 + \operatorname{erf}(x - \frac{\alpha}{\beta})}{\frac{4}{\beta} \times \sqrt{0.5}} \end{aligned} \tag{3}$$

Résultats pour la loi Normale


4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués



(a) L2



(b) KL




(c) W2


Figure: 2 Quantiles - Loss w.r.t. m

Résultats pour la loi Normale


4 Familles Exponentielles et Prior Conjugués



(a) L2




(b) KL




(c) W2


Figure: 2 Quantiles - Loss w.r.t. m



(a) L2



(b) KL



(c) W2

Figure: 2 Quantiles - Loss w.r.t. the $(\tilde{x}_i)_{i=1}^m$

Table of Contents

- ▶ Rappels sur le cadre bayésien classique
- ▶ Formalisation du problème de calibration
- ▶ Distance de Wasserstein
- ▶ Familles Exponentielles et Prior Conjugués
- ▶ Priors de Gumbel



Prior de Gumbel

5 Priors de Gumbel

On se place dans un cadre où notre loi prédictive est une loi de Gumbel.



Prior de Gumbel

5 Priors de Gumbel

On se place dans un cadre où notre loi prédictive est une loi de Gumbel.
Sa fonction de répartition s'écrit :

$$\mathbb{P}(X < x|\theta) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right) \quad \text{avec } \theta = (\sigma, \mu) \quad \sigma > 0, \mu \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$$

Prior de Gumbel

5 Priors de Gumbel

On se place dans un cadre où notre loi prédictive est une loi de Gumbel.

Sa fonction de répartition s'écrit :

$$\mathbb{P}(X < x|\theta) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right) \quad \text{avec } \theta = (\sigma, \mu) \quad \sigma > 0, \mu \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$$

On considère la mesure *a priori* :

$$\pi(\theta) = \pi(\mu, \sigma) \propto \sigma^{-m} \exp\left(m\frac{\mu - \bar{\tilde{x}}_m}{\sigma} - \sum_{i=1}^n \exp\left(-\frac{\tilde{x}_i - \mu}{\sigma}\right)\right)$$

Prior de Gumbel

5 Priors de Gumbel

On se place dans un cadre où notre loi prédictive est une loi de Gumbel.
Sa fonction de répartition s'écrit :

$$\mathbb{P}(X < x|\theta) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right) \quad \text{avec } \theta = (\sigma, \mu) \quad \sigma > 0, \mu \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$$

On considère la mesure *a priori* :

$$\pi(\theta) = \pi(\mu, \sigma) \propto \sigma^{-m} \exp\left(m\frac{\mu - \tilde{x}_m}{\sigma} - \sum_{i=1}^n \exp\left(-\frac{\tilde{x}_i - \mu}{\sigma}\right)\right)$$

Ici, nos hyperparamètres sont : $\xi = (\lambda, m, \tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_m)$. Le m et les $(\tilde{x}_i)_{i=1}^m$ correspondent à la taille et aux données d'un échantillon virtuel.

Prior de Gumbel

5 Priors de Gumbel

On se place dans un cadre où notre loi prédictive est une loi de Gumbel.

Sa fonction de répartition s'écrit :

$$\mathbb{P}(X < x|\theta) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right) \quad \text{avec } \theta = (\sigma, \mu) \quad \sigma > 0, \mu \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$$

On considère la mesure *a priori* :

$$\pi(\theta) = \pi(\mu, \sigma) \propto \sigma^{-m} \exp\left(m\frac{\mu - \tilde{x}_m}{\sigma} - \sum_{i=1}^n \exp\left(-\frac{\tilde{x}_i - \mu}{\sigma}\right)\right)$$

Ici, nos hyperparamètres sont : $\xi = (\lambda, m, \tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_m)$. Le m et les $(\tilde{x}_i)_{i=1}^m$ correspondent à la taille et aux données d'un échantillon virtuel.

→ Comment simuler la loi prédictive prédictive de X en fonction des hyperparamètres ξ , afin de générer des quantiles?

Démarche et Résultats

5 Priors de Gumbel

La démarche ici est de simuler des μ, σ par Importance Sampling, puis de simuler X avec une loi Gumbel de paramètres (μ, σ) .



Démarche et Résultats

5 Priors de Gumbel

La démarche ici est de simuler des μ, σ par Importance Sampling, puis de simuler X avec une loi Gumbel de paramètres (μ, σ) . Pour l'Importance Sampling, on utilise comme lois instrumentales :

$$IG \left(m - 1, \sum_{i=1}^m \tilde{x}_i \right) \text{ pour } \sigma$$

et

$$\mathcal{E}_{\mu}(\lambda) \text{ pour } \mu$$

avec des poids d'importance de la forme:

$$w \propto \exp \left(\mu \left(\frac{m}{\sigma} + \lambda \right) - \sum_{i=1}^m \exp \left(-\frac{\tilde{x}_i - \mu}{\sigma} \right) \right)$$

Démarche et Résultats

5 Priors de Gumbel

La démarche ici est de simuler des μ, σ par Importance Sampling, puis de simuler X avec une loi Gumbel de paramètres (μ, σ) . Pour l'Importance Sampling, on utilise comme lois instrumentales :

$$IG \left(m - 1, \sum_{i=1}^m \tilde{x}_i \right) \text{ pour } \sigma$$

et

$$\mathcal{E}_\mu(\lambda) \text{ pour } \mu$$

avec des poids d'importance de la forme:

$$w \propto \exp \left(\mu \left(\frac{m}{\sigma} + \lambda \right) - \sum_{i=1}^m \exp \left(-\frac{\tilde{x}_i - \mu}{\sigma} \right) \right)$$

Pour trouver les meilleurs hyperparamètres, on procède par grid-search sur m, \tilde{x} et λ .

	Loss L2	Loss KL	Loss W2
m	3	1	1
\tilde{x}	[1, 2, 0.5]	1.5	2
λ	1	1	0.5
Loss	0.0226	0.0465	0.1701

Table: Meilleures loss trouvée pour divers essais de λ , m et de \tilde{x}



Calibration bayésienne par divergence KL discrète et distance de Wasserstein

Thank you for listening !
Any Questions ?