

Tesis

Una tesis

Elio Campitelli

Índice general

1	Introducción	5
2	Métodos y Materiales	7
2.1	Conceptos básicos	7
2.2	Fuentes de datos	7
2.3	Descripción de SPEEDY	7
3	Climatología observada	9
3.1	Altura geopotencial	9
3.2	Temperatura	10
3.3	Viento zonal	10
3.4	Viento meridional	11
3.5	Gradiente meridional de vorticidad absoluta	11
3.6	Número de onda estacionaria	12
3.7	Función corriente	12
3.8	Ondas Quasiestacionarias	12
4	Onda 3	15
4.1	Características típicas	15
4.1.1	Wavelets	16
4.2	Antecedentes	17
4.3	Amplitud	18
4.3.1	Máximo o media.	18
4.4	Fase	19
4.5	Estaciones	20
4.6	Persistencia (ver dónde va)	21
4.7	R2	21
4.8	Regresiones	22
4.8.1	Geopotencial	22
4.8.2	Función Corriente	22
4.9	Composición de campos.	22
4.10	Fuentes de variabilidad interna	22
4.11	Fuentes externas	23
4.11.1	SST	23
5	Experimentos	25
5.1	Validación SPEEDY	25

5.1.1	Altura Geopotencial	26
5.1.2	Temperatura	26
5.1.3	Viento zonal	26
5.1.4	Gradiente meridional de vorticidad absoluta	26
5.1.5	Número de onda estacionaria	27
5.1.6	Función corriente	27
5.1.7	Onda 3	27
5.2	Comparación	27
5.2.1	Temperatura	27
5.2.2	Viento zonal	27
5.2.3	Función corriente	27
5.2.4	Onda 3	27
5.3	Regresión	27
5.4	Cosas inesperadas...	27
6	Conclusiones	29
7	Agradecimientos	31
Referencias		33

Resumen.

Listado de abreviaturas

Revisar TODOS los epígrafes

Capítulo 1

Introducción

- Antecedentes

Además de lo que hay en lo de las becas + lo que fui encontrando, agregar sobre las climatologías disponibles y sus limitaciones.

- Objetivo General
- Objetivo particular

Esto es para probar una referencia bibliográfica: Vera et al. (2004) y (Vera et al. 2004)

Capítulo 2

Métodos y Materiales

Agregar en algún lugar algo sobre las estadísticas circulares

2.1 Conceptos básicos

- Ondas cuasiestacionarias
- Fourier
- wavelets

chequear este paper:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-012-0635-9>

Ejemplo:

Cosas para ver de Figura 7.1:

Descripción del “rol” de cada número de onda en generar el campo final. La QS1 es la principal, marcando altas presiones al sur del pacífico y bajas al sur de África. La onda 3 modifica ese patrón simple haciendo que los máximos y mínimos no sean continuos.

- Wavelets

Cosas para ver:

Cambio en el máximo. Localización en vez de un número para cada latitud.

2.2 Fuentes de datos

2.3 Descripción de SPEEDY

Capítulo 3

Climatología observada

3.1 Altura geopotencial

Campo medio:

El campo de altura geopotencial media (Z , Figura 7.3) muestra una estructura más zonal en el HS que en el HN. Es evidente la generación del vórtice polar en la estratosfera de invierno y primavera y el aumento del gradiente meridional de Z con la altura.

Las anomalías zonales (Figura 7.5) muestran una preponderancia de una onda 1 (QS1) con una amplitud máxima en la estratosfera de primavera y una estructura coherente en la vertical en 60°S (Figura 7.6). Pueden diferenciarse dos QS1 distintas; una centrada en $\sim 60^{\circ}\text{S}$ y con el centro anticiclónico al rededor de la línea de fecha, y la otra sobre la costa del continente y el centro anticíclónico entre 120°E y 60°O . Quintanar y Mechoso (1995) concluyó que el primero está asociado principalmente con forzantes de latitudes bajas mientras que el segundo responde a la orografía del continente antártico.

Salvo en verano, la inclinación hacia el oeste en la horizontal y en la vertical indica que las perturbaciones estacionarias están asociadas con transporte hacia el polo tanto de cantidad de movimiento zonal como de temperatura.

¿Debería agregar una justificación de esto? ¿Un resumen del desarrollo matemático que está en el James?

En verano, las anomalías zonales tienen una estructura barotrópica equivalente y carecen de inclinación en la horizontal. Consecuentemente, los transportes meridionales asociados se reducen considerablemente.

¿Por qué?

El ciclo anual de la amplitud de las ondas estacionarias se observa en Figura 7.8, donde se muestra el desvío estándar de Z por círculo de latitud para cada mes. La mayor amplitud se encuentra centrada al rededor de los 60°S , como ya se vio en la Figura 7.5 y alcanza su máximo entre

¿Explicar la relación de esto con la amplitud de la onda?

agosto y octubre, y el mínimo entre febrero y abril, según el nivel.

3.2 Temperatura

En la tropósfera, la temperatura (Figura 7.9) presenta una estructura zonal con mayor baroclinicidad en invierno. En 200 hPa los gradientes meridionales son mínimos y por encima de ese nivel éstos se revierten, dando lugar a temperaturas ecuatoriales menores que las polares (Figura 7.10). Por encima de 100 hPa de invierno y primavera, hay un máximo relativo en $\sim 45^\circ$ y una región de anomalías zonales positivas que se ve claramente incluso en el campo total, particularmente en primavera.

Como se puede apreciar en el campo de T^* (Figura 7.11), en invierno y primavera, los niveles altos están dominados por una QS1 con máximo en el sur de Australia y mínimo en el Atlántico sur. En niveles más bajos, la onda se defasa hacia el este y queda casi en cuadratura (Figura 7.12) con el máximo en 850hPa en Antártida occidental.

¿Por qué?

En los trópicos, las anomalías de temperatura presentan un patrón de onda 3 con máximos en los continentes y mínimos en los océanos que se revierten de signo en 100hPa. Estas características tienen su correlato en la altura geopotencial y corresponden a circulaciones tipo Walker.

¿Es así?

3.3 Viento zonal

La estructura meridional del viento zonal (Figura 7.13) muestra la localización e intensidad de los jets subtropical y subpolar. El primero está presente durante todo el año aunque con mayor intensidad y corrido hacia latitudes más ecuatoriales en invierno y primavera. El segundo está presente principalmente en invierno y primavera, e incipiente en otoño. En la estratosfera se observan vientos del este en latitudes bajas que son más intensos en verano y otoño.

En la Figura 7.14 se observa que el jet subpolar es más intenso al sur de África, donde además se encuentra en una latitud más ecuatorial que en la región del Pacífico. El jet subtropical también tiene un máximo al sur de África y otro al norte de Nueva Zelanda –especialmente en invierno–, donde además se produce una bifurcación del jet. Se trata de una región de persistentes y frecuentes bloqueos (Trenberth y Mo 1985) que se evidencia como anomalías zonales negativas durante todo el año (Figura 7.15).

Las anomalías zonales en la Figura 7.15 también evidencian la circulación tropical forzada por la temperatura superficial del pacífico. Consiste con los campos de temperatura, en verano del pacífico central existen divergencias en niveles altos y convergencias en niveles bajos (no

se muestra) que se traducen anomalías zonales positivas y negativas al este y al oeste de 180° respectivamente.

3.4 Viento meridional

En los campos medios zonales de viento meridional (Figura 7.16) se muestra claramente la circulación de Hadley. En verano, la rama ascendente de encuentra en el hemisferio sur y se tiene convergencias en niveles bajos y divergencias en niveles altos. En invierno, en cambio, sólo se ve la rama descendente, mucho más intensa que en verano, que genera convergencias en niveles altos y divergencias en niveles bajos al rededor de los 30°S .

Presentes durante todo el año, los vientos de drenaje antárticos también son evidentes en la Figura 7.16. Estos vientos catabáticos son máximos en la costa del continente y alcanzan su máxima intensidad en invierno.

Los campos horizontales de \mathbf{V} se muestran en la Figura 7.17. En invierno, existe evidencia de un tren de ondas de Rossby que se propaga desde el Índico occidental sudeste llegando a su máxima latitud en 150°O donde comienza a propagarse hacia el norte hasta llegar al sur de Sudamérica. Este tren de ondas puede identificarse con mayor dificultad en el campo de geopotencial (Figura 7.5) debido a la interferencia de la QS1.

También en invierno, en los trópicos se puede observar el viento meridional hacia el norte en 850hPa en la costa oeste de África asociado al monzón de la India. El monzón sudamericano, por su parte, se evidencia por un aumento de la intensidad de los vientos del norte en verano sobre el continente americano. En altura, el monzón de la India se muestra como viento hacia el sur producto de la divergencia de niveles altos generada por la convección anómala. El sudamérica, la alta de Bolivia genera viento hacia el nort y hacia el sur al este y al oeste de Bolivia respectivamente.

La anomalía zonal de \mathbf{V} es prácticamente idéntica al campo total ya que la media zonal es casi nula en gran parte del dominio (Figura 7.16); por lo tanto, no se muestra.

3.5 Gradiente meridional de vorticidad absoluta

En la teoría de propagación meridional de ondas de Rossby, el gradiente meridional de vorticidad absoluta (ψ_y)

es importante porque blavalbla ¿Resumen de la deducción en James?

La Figura 7.19 muestra que el campo de ψ_y impide la propagación meridional de ondas de Rossby en una *región prohibida* acotada centrada

sobre Nueva Zelanda principalmente en invierno entre 300 y 200 hPa. Ésta coincide con la región de bloqueos que, en invierno está franqueada por el jet intenso, dando lugar a gradientes meridionales de U negativos más intensos que β . Estas figuras extienden el restulado de Berbery, Nogués-Paegle, y Horel (1992) (su Figura 3) utilizando 5 años de análisis objetivo del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF).

3.6 Número de onda estacionaria

Aún con ψ_y positivo, las ondas de Rossby sólo se pueden propagar si su número de onda zonal es menor que el número de onda estacionario (James 1994). En la Figura 7.20 se muestra el número de onda estacionario para el nivel de 200hPa y en la Figura 7.21 se muestra un corte en 180° . Además de la *región prohibida*, las ondas cortas no pueden propagarse meridionalmente en latitudes altas. Las ondas largas con $k < 3$ pueden propagarse meridionalmente libremente en verano al norte de los 60°S aproximadamente, pero quedan atrapadas al sur de 45°S en toda una franja de longitudes entre 60°E y 120°O durante el resto del año.

El corte de ψ_y en 180° evidencia que la onda 3 sólo puede propagarse meridionalmente dentro de una franja angosta de latitudes, entre 60°S y 50°S . Una región donde este modo muestra un máximo de amplitud (Figura 7.25).

3.7 Función corriente

No sé bien qué decir de la Figura 7.23 :(.

3.8 Ondas Quasiestacionarias

Como se describió en Capítulo 2, el análisis estacional de la amplitud y r^2 de Fourier puede hacerse a partir de la media de los campos mensuales o aplicando Fourier a los campos estacionales. En el caso de los datos de NCEP existe poca diferencia, por lo que sólo se muestran los resultados conseguidos mediante esta última metodología.

El campo de Z^* está caracterizado principalmente por un patrón de QS1 en altas latitudes (Figura 7.5). No es sorprendente, entonces, que la QS1 explique la mayor parte de la variabilidad del geopotencial en virtualmente todo el dominio al sur de los 45°S (Figura 7.24). La QS2 es preponderante en la estratosfera ecuatorial, en la costa antártica y al rededor de 35°S , donde es el modo dominante en toda la columna de aire en verano. La QS3, a diferencia de las ondas anteriores es importante en una región reducida. Explica una parte substancial de la varianza en niveles bajos al rededor de los 45°S y mayormente en invierno. La QS4

explica muy poca varianza a excepción de cerca de superficie entre 15°S y 30°S. Ondas más cortas son aún menos importantes (no se muestra).

El r^2 permite analizar la importancia relativa de cada modo con respecto a la variabilidad total, pero lo que importa desde el punto de vista físico es la amplitud de la onda. Las diferencias entre los campos de r^2 y los de amplitud son evidentes comparando las figuras 7.24 y 7.25 (notar la escala logarítmica en los colores). La amplitud de la QS1 muestra un máximo bien definido centrado en 60°S que en verano se encuentra en niveles más bajos que en las otras estaciones. También existe un máximo relativo entre 15°S y 30°S en verano que migra a latitudes más altas en invierno y primavera. El mismo está presente también en las otras ondas estacionarias.

Esto está muy mal escrito, hay que mejorar

En el caso de la QS2, se evidencia que a pesar de tener máximos de r^2 en la estratosfera al norte de 45°S, alcanza su máxima amplitud al sur de esa latitud y en 200hPa en verano y en 30hPa en invierno. Su actividad en la costa antártica se extiende en toda la tropósfera en invierno (a pesar de que en r^2 pierde importancia por encima de los 200hPa)

La región de amplitud máxima de la QS3, coincide aproximadamente con la región de máximo r^2 entre otoño y primavera, aunque con menos actividad en superficie y extensión en toda la columna. En verano, en cambio aparece un máximo de amplitud importante que no se observa en el campo de r^2 .

Finalmente, fuera de la superficie, la QS4 presenta un máximo de amplitud bien definido sólo en verano. El máximo entre 15°S y 30°S sigue presente.

Acá podría poner alguna reflexión general de lo que se ve. Por ejemplo, cómo en verano la variabilidad está más acotada a la tropósfera mientras que en invierno y primavera hay más contacto con la estratosfera.

Capítulo 4

Onda 3

introducción a QS3; decir que esto es una onda reconstruida a partir de Fourier

4.1 Características típicas

En la Figura 7.26 se muestra el campo de geopotencial reconstruido sólo a partir de la QS3 en 300 hPa, que ilustra lo que sucede en todos los niveles dado que su estructura es barotrópica equivalente (Figura 7.27). Se reproducen las características de la amplitud ya vistas en la Figura 7.25 (máximo entre 60°S y 45°S con menor intensidad en primavera, mayor amplitud en 300hPa con mayor desarrollo vertical en otoño y verano) pero además permite observar el efecto de la variación de la fase. Se observa que existe un corrimiento de la fase entre verano e invierno de poco más de 15° (algo ya observado por ??) anticipando que el efecto de la QS3 sobre cada lugar pueda tener una componente estacional.

La inclinación meridinal de las perturbaciones de geopotencial asociadas a la QS3 sugieren que ésta está asociada a transportes de cantidad de movimiento hacia el polo en las estaciones de transición, pero en menor medida en verano.

buscar referencia. Raphael referencia este movimiento, pero no lo encuentro en los papers que cita.

mal escrito

Cuadro 4.1: Transporte meridiano de cantidad de viento zonal NO SE PUBLICA

Estación	[uv]
Verano	-0.100
Otoño	-0.431
Invierno	-0.016
Primavera	-0.163

No tengo idea de cómo interpretar la Figura 7.28. Quizás hablar de que la variabilidad asociada a la onda 3 se da principalmente en los nodos y que entonces ahí es donde hay que ver la variación del efecto? no sé...

4.1.1 Wavelets

agregar referencia a sección

Para la QS3, la amplitud media obtenida mediante Wavelets es virtualmente idéntica a la amplitud obtenida con Fourier (Figura 7.29). Sin embargo, también permite obtener información de la variación meridional de la amplitud de la QS3. Al igual que con Fourier, esto puede hacerse promediando estacionalmente la amplitud de los campos mensuales o calculando la amplitud de los campos estacionales. Pero a diferencia de Fourier, los resultados de cada metodología son opuestos. Esto es evidente en la Figura 7.30 donde se muestra el campo de amplitud de la QS3 según wavelets en líneas y su anomalía zonal en sombreado. Los valores positivos representan regiones donde la amplitud de la QS3 es mayor que la media zonal y viceversa.

No existe mucha diferencia en la amplitud media zonal entre ambas metodologías a excepción de que la primera siempre es mayor que la segunda. Las principales diferencias se dan en las anomalías zonales.

Las anomalías zonales presentan, en todas las estaciones, un máximo al sur del Índico centrado en 45°S que se desplaza hacia el este en latitudes más altas. Existe un segundo máximo en altas latitudes que en otoño y primavera se encuentran en 120°E y en invierno se encuentra en 180°. En verano éste no aparece, pero sí existe un máximo centrado en 15°S y 120°O.

La principal diferencia con la media de la amplitud es que las mayores anomalías zonales se dan en latitudes altas (al rededor de 60°S) con un mínimo al sur del Índico en vez de un máximo. Al norte de 30°S, las diferencias son menores.

Esta es una propiedad general que SIEMPRE se cumple. En realidad podría ir en metodología

Estoy pensando en no poner la Figura 7.31 porque no encuentro mucho para decir y no veo que se gane demasiado. Queda para el doctorado? :P

Cosas para ver:

* Si bien el máximo medio de la amplitud se da en ~300hPa (Figura 7.29) igual que en Fourier, el análisis por longitud muestra algo un poco más complejo. En verano y otoño, la máxima amplitud sigue en 300hPa, pero ésta asciende a entre 100 y 50hPa en invierno y primavera al rededor de 120°O. Además, durante estas estaciones hay indicación de que el máximo cambia de latitud con la altura.

Las diferencias vistas en la Figura 7.30 están relacionadas con la estacionariedad de las ondas, se puede utilizar la relación entre ambas para generar un índice de estacionariedad. Cuanto más similar sea el resultado, más estacionarias son las ondas. Así, la estacionariedad sería máxima

¿Es una palabra?

de nuevo, esto es general para la metodología, la explicación va en métodos

¿Estoy seguro de que esto es así?

en latitudes bajas y al rededor de 50°S –principalmente en verano– y mínima en dos franjas angostas cerca de 30°S y 75°S.

¿Mostrar el gráfico
7.32?

Esta discusión también aplica a fourier (Figura 7.33), en realidad, pero ahí no estoy mostrando ambos resultados porque da parecido. Quizás este párrafo se puede mover.. o borrar todo si resulta puro sinsentido.

Estas observaciones destacan la utilidad de wavelets en el análisis de ondas cuasiestacionarias. Mientras que el tratamiento con fourier asume a las ondas como una propiedad media de cada círculo de latitud, wavelets permite reconocer su heterogeneidad meridional. Evaluando esta heterogeneidad, sería posible distinguir entre campos donde una onda con un determinado número de onda está presente en todo un círculo de latitud de campos donde ésta está localizada en una región acotada.

Por otro lado, la no ortogonalidad de los wavelets complejizan la interpretación de los resultados ya que no es posible la separación de un campo en modos oscilatorios con distinto número de onda. El análisis de una QS específica, por lo tanto está contaminado por la actividad de otras QS con longitud de onda cercana.

Wavelets, en resumen, puede entenderse como una *corrección* a fourier que agrega información de asimetrías zonales. Dado que la variabilidad zonal es del orden de un 10% de la amplitud media, en lo que sigue de la tesis se utilizará sólo fourier, dejando el análisis e interpretación de wavelets para futuros trabajos.

4.2 Antecedentes

Breve comentario sobre los índices usados en otros lados. Discutir ventajas y debilidades.

- Amplitud
- Fase (impacto en SA)

De todo eso, motiva decisión del índice.

- Niveles elegidos
- Promedio vs. máximo
- Composiciones de campos y flujos.
- Decisión del índice.

Quiero hacer el índice a partir de la actividad de la onda 3 tomando la región del máximo (latitud entre -65 y -40, y entre 700 y 100 hPa). Variables posibles: amplitud media, amplitud máxima, r², correlación entre campo teórico y observado.

4.3 Amplitud

4.3.1 Máximo o media.

Existen varios estadísticos que podrían utilizarse para representar la amplitud de la QS3 en una región extendida. La media, la máxima, la moda, la mediana, etc... En este caso, se estudió la posibilidad de representarla con la media o la máxima.

esto fue escrito a las
23:30 luego de un largo
día de mirar campos y
números... es un delirio.

Se seleccionaron manualmente 9 casos que representan distintas características de la amplitud media la máxima. Sus valores se muestran en la Figura 7.35, los cortes meridionales de amplitud, en la ?? y los campos de Z* (con las QS1 y QS2 restadas) en la Figura 7.37.

Comparando mayo de 1997 con abril de 2012, ambos tienen una media muy similar, pero la máxima del primero es menor que la del segundo. Observando el campo de geopotencial, la QS3 se aprecia mucho más claramente en 2012 que en 1997.

repite "caso"

Enero de 1985 y julio de 1988 son un caso similar en cuanto a la relación de las métricas de amplitud, pero en este caso ambos campos de Z* son muy similares en cuanto a intensidad y claridad de la QS3. Los dos meses presentan un tren de ondas que ocupan aproximadamente 1/3 de círculo de latitud. A pesar de que la amplitud máxima de 1985 es menor que la de 1988, el tren de ondas de 1988 se ve algo más claro que el de 1985.

El par septiembre de 2000 y diciembre de 1990 es más claro. Ambas medidas de amplitud son mayores en 1990 y, en efecto, el campo de Z* tiene una estructura de QS3 zonal más clara que el de 2000. Sin embargo, las anomalías sí están presentes en 1990 –un tren de ondas similar al de enero de 1985, aunque con distinta fase– son más intensas, por lo que su efecto local puede ser mayor que las de 2000.

Más extrema aún es la diferencia entre septiembre de 2000 y octubre de 2003. Ambos meses tienen una métrica de amplitud similares, pero la QS3 es apenas distinguible en el segundo mes.

Aclarar qué compara-
ción ilustra qué proble-
ma

Estos casos ilustran algunas limitaciones del análisis que continua. Algunos problemas son inherentes al intentar representar una estructura con variabilidad espacial a partir de un sólo número y otros están atados a la limitación de la descomposición de Fourier que trata toda onda como una onda planetaria.

expresar mejor esto

Es importante tener en cuenta que estos 9 casos fueron seleccionados específicamente para ilustrar estas limitaciones y que no son necesariamente representativos de la totalidad de casos posibles. Como se muestra en la Figura 7.38, la amplitud media máxima tienen una excelente correlación ($r^2 > 0.9$) y una relación lineal. Debido a esto, a fines estadísticos la elección de una métrica o la otra no tiene una influencia importante. Desde este momento se usará la amplitud media.

El ciclo anual de la amplitud media se muestra en la Figura 7.39a donde los puntos son datos puntuales. La amplitud máxima en invierno es evidente, así como la mayor variabilidad. Esto es de esperarse en una variable definida positiva que toma valores cercanos a cero. Notar que la amplitud media no es mínima en primavera, en contraste con lo observado en el análisis climatológico (Figura 7.25) y los campos reconstruidos (Figura 7.26). La resolución a este problema radica en el análisis de la fase (Sección 4.4).

La serie temporal de la amplitud media se muestra en la Figura 7.39b donde en líneas horizontales se marca la amplitud media anual para cada año. No hay evidencia clara de periodicidades aunque se puede observar indicios de un ciclo de dos años en la anticorrelación de los promedios anuales. Dicha periodicidad no es estadísticamente significativa (no se muestra)

¿no se muestra?

4.4 Fase

Cuadro 4.2: Desvío estándar de la fase para cada estación - NO SE PUBLICA

Estación	SD
Verano	21.20765
Otoño	22.25817
Invierno	25.08954
Primavera	29.41456

Además de la amplitud, las sondas planterias se caracterizan por su fase. La Figura 7.41 muestra la fase media y el rango delimitado por ± 1 desvío estándar para cada mes (notar que la variación en latitud es únicamente a modo de separar los meses). En la Figura 7.26 ya se observada el ciclo anual de la fase, pero en la Figura 7.41 también brinda una idea de la variabilidad existente año a año.

La gran variabilidad presente durante los meses de primavera, en comparación con el resto del año, explica por qué en los campos medios la QS3 aparece débil a pesar de que su amplitud mensual no es menor. Al hacer el promedio, los campos que están defasados en entre $1/4$ y $3/4$ de longitud de onda (entre 30° y 90° en el caso de la QS3) interfieren destructivamente entre ellos, eliminando la señal en los campos medios. En primavera, más del 30% de los meses tienen algún nivel de interferencia destructiva con el campo medio, comparado con el 13% en verano.

Hasta acá.

Cuadro 4.3: Porcentaje de meses con interferencia destructiva - NO SE PUBLICA

season	V1
Verano	12.903
Otoño	18.280
Invierno	26.882
Primavera	31.183

Ciclo anual de la fase. Cosas para ver:

Se ve el ciclo anual que ya se veía en una figura anterior. Pero hay mucha variabilidad.

Recordar que este es aproximadamente el centro del máximo de geopotencial y que, por construcción, hay un centro de mínima a 60° . Eso implica que en los casos donde hay puntos cerca de -120° o 0° , hay el centro de mínima está en $\sim 60^\circ$.

También notar que, como se trata en realidad de una variable cíclica, los puntos extremos representan una situación similar.

¿Hay mucha diferencia entre el boxplot con todos los datos y el de sólo los 20 más intensos? Yo no veo mucha y me parece que excluir a los 10 más débiles invita más preguntas que las que responde.

Cosas para ver:

La mayoría del tiempo estamos afectados por centro de máxima, pero hay casos intensos donde hay mínima. Especialmente en junio y julio.

4.5 Estaciones

¿Cómo establecer una “estacionalidad”? Algún criterio para agrupar meses. Claramente las estaciones climatológicas de siempre no sirven.

Una forma es, a partir del índice, agrupar los meses según su amplitud y fase media:

Otro ejemplo podría usar SVD:

Cosas para ver:

Los campos son descriptos bien por sólo 2 componentes principales de igual magnitud que esencialmente describen el corrimiento de fase de la onda. La “magnitud” del vector de componentes mapea bien a la amplitud de fourier y la diferencia mapea bien a la fases. No hay nada nuevo por acá.

Grupos: * Enero + Febrero + Marzo es un grupo bastante seguro. Se ven juntos en el diagrama amplitud-fase, tienen alta correlación entre ellos y en componentes principales tienen PC1 significativamente mayor que PC2. * Junio + Julio parecen ir por su cuenta. Tienen mucha correlación

entre ellos y ambos tienen PC2 mayor que PC1 aunque su fase difiere bastante.

Los otros meses quedan medio mezclados, pero pueden agruparse como meses de “transición”.

4.6 Persistencia (ver dónde va)

4.7 R2

Se puede estimar de dos maneras distintas: a partir del ajuste de fourier para cada nivel y latitud (figura blabla) y haciendo un promedio, o reconstruyendo el campo tridimensional de la onda 3 y haciendo la correlación (global) con el campo tridimensional observado. Esta segunda forma da casi siempre un valor menor.

Para ver:

La relación ya no es lineal y hay bastante más scatter. Ergo, hay diferencia en la información.

Dos regímenes: Cuando el R^2 es bajo, la relación es “menor” que 1:1 y hay algunos casos donde el R^2 reconstruido es mayor que el r^2 medio. Para R^2 más grandes, la pendiente es 1. Modelar la relación... ¿Cómo se interpreta?

Cosas para ver:

Comparando con las figuras anteriores, casos donde la amplitud es grande pero el R^2 no tanto.

Cosas para ver:

El ciclo anual no es para nada tan claro. Varios outliers. La correlación reconstruida (azul) no tiene casi ciclo anual.

Una ventaja de la correlación entre el campo real y el reconstruido es que puede hacerse para cada punto y analizar la variación espacial de la misma.

Cosas para ver:

Esto es, para cada punto de grilla, la correlación entre el campo observado y el reconstruido en todos los meses y años. Además de la dependencia latitudinal de la importancia de la onda 3 (que se puede ver en los cortes anteriores), se ve la dependencia zonal. La onda 3 es más importante en el Pacífico sur que en el Atlántico o el Índico. Además, se ve un patrón de altas correlaciones que asemejan a un tren de ondas.

¿Confirma? lo que se ve en en análisis de wavelets.

Conclusión: no voy a usar el r^2 a partir del campo reconstruido.

4.8 Regresiones

4.8.1 Geopotencial

Cosas para ver:

- * Además los patrones de onda 3, en julio y diciembre aparece un patrón de SAM positivo y negativo respectivamente.

4.8.2 Función Corriente

4.9 Composición de campos.

Descripción de la selección.

Cosas para ver:

Años con coincidencia, años sin coincidencia. Meses donde la fase coincide (julio) vs meses donde no coincide (septiembre). También, años donde hay seguidilla de meses seleccionados (1999). Aunque posiblemente sea casualidad (no hay mucha persistencia mes a mes.)

Pequeña digresión: Efecto de la fase.

La climatología de la fase se va a discutir más adelante, pero... discutir el efecto de promediar campos con similar amplitud pero fase distinta. Del gráfico, septiembre tiene 1997 y 2003 con fase a 180° , lo que significa que va a haber cancelación parcial. Enero, por el contrario, no tiene ningún año en contrafase, aunque sí algunos a 90° , que desdibujan el patrón.

Cosas para ver:

Ambos criterios coinciden en casi todos los años seleccionados, así que no hay mucha diferencia. En efecto, las composiciones son casi iguales (no se muestra). Voy a usar la amplitud.

Estos gráficos me parecen importantes para ver lo que hay “adentro” de la composición, pero no sé bien qué decir sobre ellos. Supongo que lo principal es que hay años donde la onda

4.10 Fuentes de variabilidad interna

(Discusión escrita más de papers), Pero nos concentraremos en la fuente externa.

4.11 Fuentes externas

4.11.1 SST

Campos de correlación con SST y OLR, principalmente ¿Discusión de otros forzantes?

Capítulo 5

Experimentos

5.1 Validación SPEEDY

Validación de la corrida control

- Comparación campos medios.

Acá un problemita es que en speedy no tengo el nivel de 50hPa, sólo tengo 925, 850, 700, 500, 300, 200, 100, 30. Podría usar 30, pero eso es la tapa del modelo...

- Altura geopotencial (gh) Para el caso del campo total, la correlación del campo es buena (>0.8) en casi todos los niveles y meses, excepto en 30hPa durante verano donde los campos están anticorrelacionados! La parte asimétrica zonal muestra valores menores, indicando que gran parte de la correlación del campo total se debe a la capacidad del modelo de reproducir el gradiente meridional. Sin embargo, se siguen obteniendo correlaciones >0.6 en casi todos los niveles y estaciones. Se observa un mínimo relativo en 500hPa donde se tienen correlaciones menores durante casi todo el año y uno en niveles altos centrado en invierno y primavera.
- Viento zonal (U) Las correlaciones con el campo total son $>=0.8$ en todo el año y todos los niveles, sin embargo, la parte asimétrica muestra correlaciones mucho más baja con un máximo de ~ 0.6 en 925hPa. Esto indica que el modelo resuelve correctamente la estructura media del Jet, pero no sus variaciones zonales.
- Viento meridional (V) Los campos de correlación son prácticamente idénticos entre parte total y parte asimétrica. Ésta muestra un patrón de bajas correlaciones en general.
- Temperatura (T) La correlación con el campo total muestra una estructura similar que la altura geopotencial, con una excelente correlación en todos los meses para niveles mayores a 200hPa, pero anticorrelacionado en niveles altos en todos los meses salvo en

invierno. La parte asimétrica muestra correlaciones bajas en todos los niveles salvo en 925hPa.

- Gradiente meridional de vorticidad absoluta. Tiene correlación moderada con un mínimo relativo en 200hPa en verano que en las otras estaciones se convierte en un máximo.

5.1.1 Altura Geopotencial

Anomalía

Veredicto:

* Agarra bien la anomalía zonal aunque con magnitud menor.

El corte zonal evidencia que además de tener menor amplitud, la estructura vertical de las anomalías es barotrópica equivalente en Speedy, a diferencia de la estructura baroclínica de NCEP.

5.1.2 Temperatura

En 850 tiene una fuerte onda 1 en latitudes polares producida por la topografía de la Antártida y representa bien las anomalías causadas por los continentes, aunque en menor amplitud.

En 200, falla miserablemente. La onda 1 polar que se ve bien claro en NCEP ni aparece en SPEEDY, mientras que en latitudes medias aparecen ligeras anomalías que no se observan en las observaciones.

5.1.3 Viento zonal

Cosas para ver:

* Speedy no logra desarrollar un jet polar por la falta de niveles verticales en la estratosfera. Tampoco reproduce los estes estratosféricos en latitudes bajas. Su jet subtropical es más intenso y su máximo se da ligeramente en niveles más altos en NCEP.

Campo medio (me parece que no lo voy a poner, no agrega información que no esté en el anterior y en el de geopotencial.)

Cosas para ver:

Jet polar en invierno y primavera en niveles altos (< 100 hPa). Jet subtropical en niveles “medios”.

5.1.4 Gradiente meridional de vorticidad absoluta

Comparando con la figura ??, los gradientes son menores y más zonales. Es significativo que la región “prohibida” en invierno de niveles altos es menor en 200hPa y casi desaparece en 300hPa.

5.1.5 Número de onda estacionaria

Comparando con ?? la mayor diferencia es la desaparición de una región de propagación impedida en $\sim 40^\circ$ en el Índico y el Pacífico en Otoño.

En promedio zonal, sin embargo, SPEEDY funciona bien.

5.1.6 Función corriente

5.1.7 Onda 3

La onda 3 no está muy bien representada en el modelo. Aunque la estructura vertical y la posición meridional está bien (salvo en otoño), la amplitud es mucho menor. La fase, además, está corrida ligeramente en verano, pero quedando en cuadratura en invierno y defasado 180 en primavera.

5.2 Comparación

Comparación entre corridas ### Altura geopotencial

5.2.1 Temperatura

ONo hay casi diferencia entre las corridas.

5.2.2 Viento zonal

5.2.3 Función corriente

5.2.4 Onda 3

5.3 Regresión

5.4 Cosas inesperadas...

- ??
- protif!

Capítulo 6

Conclusiones

Capítulo 7

Agradecimientos

Referencias

- Berbery, E H, J Nogués-Paegle, y J D Horel. 1992. «Wavelike southern hemisphere extratropical teleconnections». doi:DOI: 10.1175/1520-0469(1992)049<0155:WSHET>2.0.CO;2.
- James, I. N. 1994. *Introduction to circulating atmospheres*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511622977.
- Quintanar, Arturo I., y Carlos R. Mechoso. 1995. «Quasi-Stationary Waves in the Southern Hemisphere. Part II: Generation Mechanisms». *Journal of Climate* 8 (11): 2673-90. doi:10.1175/1520-0442(1995)008<2673:QSWITS>2.0.CO;2.
- Trenberth, Kevin E., y K. C. Mo. 1985. «Blocking in the Southern Hemisphere». doi:10.1175/1520-0493(1985)113<0003:BITSH>2.0.CO;2.
- Vera, Carolina, Gabriel Silvestri, Vicente Barros, y Andrea Carril. 2004. «Differences in El Niño response over the Southern Hemisphere». *Journal of Climate* 17 (9): 1741-53. doi:10.1175/1520-0442(2004)017<1741:DIENRO>2.0.CO;2.

Índice de figuras

7.1	Ejemplo fourier - fig:fourier-ejemplo	38
7.2	Wavelets - fig:wavelet-ejemplo	39
7.3	Campo de Z (NCEP) - fig:gh-ncep	40
7.4	Gradiente meridional de Z - fig:ghdy-ncep-corte	41
7.5	Anomalía zonal de altura geopotencial. - fig:ghz-ncep . . .	42
7.6	Corte zonal de anomalía de geopotencial en -60°.fig:ghz-ncep-corte60	43
7.7	Transportes - fig:uzvz-ncep-corte - SÓLO BORRADOR .	44
7.8	Desvío estándar por círculo de latitud. - fig:sd-gh-ncep .	45
7.9	Temperatura media. - fig:t-ncep	46
7.10	Corte meridional de temperatura media.fig:tz-ncep-corte .	47
7.11	Anomalía zonal de temperatura. - fig:tz-ncep	48
7.12	Corte zonal de anomalía de temperatura en -60°. - fig:tz-ncep-corte60	49
7.13	Viento zonal medio. - fig:u-ncep-corte	50
7.14	Viento zonal. - fig:u-ncep	51
7.15	Anomalía zonal de viento zonal. - fig:uz-ncep	52
7.16	Media zonal del viento meridional.fig:v-ncep-corte	53
7.17	Viento meridional medio. - fig:v-ncep	54
7.18	Z* menos QS1. - fig:ghminus1-ncep - SÓLO BORRADOR	55
7.19	Gradiente meridional de vorticidad absoluta * 1e11 - fig:etady-ncep	56
7.20	Número de onda estacionario en 200hPa. - fig:ks-ncep .	57
7.21	Número de onda estacionario medio por círculo de latitud. - fig:ks-ncep-corte	58
7.22	Número de onda estacionario en 180° - fig:ks-ncep-cortelev - SÓLO BORRADOR	59
7.23	Función corriente x 1099 - fig:psi-ncep	60
7.24	R^2 de Fourier. - fig:r2-ncep	61
7.25	Amplitud de Fourier. - fig:ampl-ncep	62
7.26	Media de reconstrucción de onda 3. - fig:qs3-ncep	63
7.27	Corte - fig:qs3-ncep-corte	64
7.28	Desvío estándar de la reconstrucción de QS3. - fig:qs3sd-ncep	65
7.29	Amplitud de wavelets (sombreados) y de fourier (contornos) - fig:wavelet-fourier-ncep	66
7.30	Campo medio de la amplitud de la onda 3 según wavelets (contornos) y su anomalía zonal (sombreado) en 300hPa. - fig:waveletz-ncep	67
7.31	Corte zonal en -60° de la amplitud media de la onda 3 según wavelets (contornos) y su anomalía zonal (sombreado). - fig:wavelet-ncep-corte	68
7.32	Ratio de amplitud de la media y media de la amplitud (¿medida de estacionalidad?) - fig:estacionaridad - SÓLO BORRADOR	69

7.33 Estacionaridad según fourier - fig:estacionaridad-fourier - SÓLO BORRADOR	70
7.34 Reconstrucción de QS3 usando wavelets - fig:wavelet-reconstr - SÓLO BORRADOR	71
7.35 Distribuci�n de amplitud para 12 fechas. En rojo la amplitud m�xima, en azul la amplitud media. - fig:ampl-max-mean	72
7.36 Corte vertical de amplitud - fig:ampl-max-mean-corte	73
7.37 Anomal�a zonal geopotencial en 300hPa para fechas seleccionadas. - fig:ghz-ncep-select	74
7.38 Correlaci�n entre amplitud m�xima y media.fig:cor-mean-max	75
7.39 Amplitud media - fig:ampl-ts	76
7.40 Funci�n de autocorrelaci�n para la amplitud media anual de la onda 3 - fig:acf-ampl - SÓLO BORRADOR	77
7.41 Ciclo anual de la fase (20 mayores amplitudes para cada mes) - fig:fase-boxplot	78
7.42 Centros de m�xima (puntos rojos) y m�nima (puntos azules) para los 10 a�os con mayor amplitud de la onda 3, para cada mes.fig:centros-10max	79
7.43 Amplitud y fase media para cada mes.fig:ampl-vs-fase	80
7.44 An�lisis SVD de QS3.probablemente basurafig:eof	81
7.45 'Magnitud' y 'Fase' de cada mes a partir de las componentes principalesfig:eof1-eof2	82
7.46 Correlaci�n lageada para cada mes con los 12 siguientes.fig:lag-cor	83
7.47 Relaci�n entre R2 medio y R2 reconstruido.fig:r2-cor2	84
7.48 R2 mediofig:r2-corte	85
7.49 R2 medio - fig:r2-ts	86
7.50 Correlaci�n cuadrada media para estaciones seg�n onda3.fig:cor-campo	87
7.51 Regresi�n sobre amplitud.fig:regr-gh-ncep	88
7.52 Igual que figura XX, pero en proyecci�n polar para julio y septiembre.fig:regr-gh-polar	89
7.53 Relaci�n entre amplitud media de la onda 3 y el SAMfig:sam-ampl	90
7.54 Regresi�n de Psi con la amplitud. - fig:regr-psi-ncep	91
7.55 Tabla de selecci�nfig:seleccion-tabla	92
7.56 Tabla de interacci�nfig:interaccion-tabla	93
7.57 Composici�n de camposfig:gh-comp	94
7.58 Campos para los 10 eneros seleccionados.fig:gh-qs3-select-ene	95
7.59 Campos para los 10 septiembrese seleccionados.fig:gh-qs3-select-sep	96
7.60 Regresi�n de SST con la amplitud de la onda 3fig:regr-sst-ncep	97
7.61 Correlaci�n lineal entre campos de SPEEDY y NCEP.fig:cor-sp-nc	98
7.62 Anomal�a zonal de altura geopotencial (speedy sombreado, ncep contornos)fig:ghz-sp-nc	99
7.63 Diferencia entre speedy y ncepfif:ghz-dif-sp-nc	100
7.64 Corte zonal de anomal�a de geopotencial en -60� (speedy sombreado, ncep contornos).fig:ghz-sp-nc-corte60	101
7.65 Temperaturafig:t-nc-sp	102
7.66 T*fig:tz-sp-nc	103
7.67 Viento zonal medio (speedy contornos, ncep sombreado). - fig:u-sp-nc-corte	104
7.68 Viento zonal (contornos ncep, sombreado speedy).fig:u-sp-nc	105

7.69 Diferencia entre ncep y speedy en viento zonal	fig:u-dif-sp-nc	106
7.70 Gradiente meridional de vorticidad absoluta (speedy)	.fig:etady-sp-nc	107
7.71 Número de onda estacionario en 300hPa (speedy)	.fig:ks-sp	108
7.72 Número de onda estacionario medio por círculo de latitud	.fig:ks-sp-nc-corte	109
7.73 Función corriente x 1099	.fig:psi-sp	110
7.74 Amplitud de Fourier (speedy en sombreado, ncep en contornos)	.fig:ampl-sp-nc	111
7.75 Media de reconstrucción de onda 3 (sombreado speedy, contornos ncep)	.fig:qs2-sp-nc	112
7.76 Anomalía zonal de altura geopotencial	.fig:ghz-sp-runs	113
7.77 Diferencia Control - corrida para Z*	- .fig:ghz-dif-sp-runs	114
7.78 Temperatura media en 850hPa	.fig:t-sp-runs	115
7.79 Temperatura media en 850hPa	.fig:tz-sp-runs	116
7.80 Diferencia Control - corrida para T*	- .fig:tz-dif-sp-runs	117
7.81 Viento zonal	.fig:uz-sp-runs	118
7.82 Diferencia control - corrida para U.	- .fig:u-dif-sp-runs	119
7.83 Anomalía zonal de función corriente y flujos de acción de onda	.fig:psi-sp-runs	120
7.84 Diferencia en psi.z y flujos de acción de onda	.fig:psiz-dif-sp-runs	121
7.85 Amplitud media de la onda 3 para cada corrida	.fig:ampl-sp-runs	122
7.86 Diferencia de amplitud entre la corrida control y cada corrida	.fig:ampl-dif-sp-runs	123
7.87 Ciclo anual de amplitud de onda 3	.fig:index-sp-boxplot	124
7.88 Regresión en función corriente. -	.fig:regr-psi-sp-runs	125




Figura 7.1: Ejemplo fourier - fig:fourier-ejemplo




Figura 7.2: Wavelets - fig:wavelet-ejemplo




Figura 7.3: Campo de Z (NCEP) - fig:gh-ncep




Figura 7.4: Gradiente meridional de Z - fig:ghdy-ncep-corte




Figura 7.5: Anomalía zonal de altura geopotencial. - fig:ghz-ncep




Figura 7.6: Corte zonal de anomalía de geopotencial en -60° . fig:ghz-ncep-corte60




Figura 7.7: Transportes - fig:uzvz-ncep-corte - SÓLO BORRADOR




Figura 7.8: Desvío estándar por círculo de latitud. - fig:sd-gh-ncep




Figura 7.9: Temperatura media. - fig:t-ncp




Figura 7.10: Corte meridional de temperatura media.fig:tz-ncep-corte




Figura 7.11: Anomalía zonal de temperatura. - fig:tz-ncep




Figura 7.12: Corte zonal de anomalía de temperatura en -60° . - fig:tz-ncep-corte60




Figura 7.13: Viento zonal medio. - fig:u-ncep-corte




Figura 7.14: Viento zonal. - fig:u-ncep




Figura 7.15: Anomalía zonal de viento zonal. - fig:uz-ncep




Figura 7.16: Media zonal del viento meridional.fig:v-ncep-corte




Figura 7.17: Viento meridional medio. - fig:v-ncep




Figura 7.18: Z^* menos QS1. - fig:ghminus1-ncep - SÓLO BORRADOR




Figura 7.19: Gradiente meridional de vorticidad absoluta * 1e11 -
fig:etady-ncep




Figura 7.20: Número de onda estacionario en 200hPa. - fig:ks-ncep




Figura 7.21: Número de onda estacionario medio por círculo de latitud.
- fig:ks-ncep-corte




Figura 7.22: Número de onda estacionario en 180° - fig:ks-ncep-cortelev
- SÓLO BORRADOR





Figura 7.23: Función corriente x 1099 - fig:psi-ncep

Figura 7.24: R^2 de Fourier. - fig:r2-ncep




Figura 7.25: Amplitud de Fourier. - fig:ampl-ncep




Figura 7.26: Media de reconstrucción de onda 3. - fig:qs3-ncep




Figura 7.27: Corte - fig:qs3-ncep-corte




Figura 7.28: Desvío estándar de la reconstrucción de QS3. - fig:qs3sd-ncp




Figura 7.29: Amplitud de wavelets (sombreados) y de fourier (contornos)
- fig:wavelet-fourier-ncp




Figura 7.30: Campo medio de la amplitud de la onda 3 según wavelets (contornos) y su anomalía zonal (sombreado) en 300hPa. - fig:waveletz-ncp




Figura 7.31: Corte zonal en -60° de la amplitud media de la onda 3 según wavelets (contornos) y su anomalía zonal (sombreado). - fig:wavelet-ncep-corte




Figura 7.32: Ratio de amplitud de la media y media de la amplitud
(medida de estacionaridad?) - fig:estacionaridad - SÓLO BORRADOR




Figura 7.33: Estacionaridad según fourier - fig:estacionaridad-fourier - SÓLO BORRADOR




Figura 7.34: Reconstrucción de QS3 usando wavelets - fig:wavelet-reconstr - SÓLO BORRADOR




Figura 7.35: Distribució de amplitud para 12 fechas. En rojo la amplitud máxima, en azul la amplitud media. - fig:ampl-max-mean




Figura 7.36: Corte vertical de amplitud - fig:ampl-max-mean-corte




Figura 7.37: Anomalía zonal geopotencial en 300hPa para fechas seleccionadas. - fig:ghz-ncep-select




Figura 7.38: Correlación entre amplitud máxima y media.fig:cor-mean-max




Figura 7.39: Amplitud media - fig:ampl-ts




Figura 7.40: Función de autocorrelación para la amplitud media anual de la onda 3 - fig:acf-ampl - SÓLO BORRADOR




Figura 7.41: Ciclo anual de la fase (20 mayores amplitudes para cada mes) - fig:fase-boxplot




Figura 7.42: Centros de máxima (puntos rojos) y mínima (puntos azules) para los 10 años con mayor amplitud de la onda 3, para cada mes. fig:centros-10max




Figura 7.43: Amplitud y fase media para cada mes.fig:ampl-vs-fase




Figura 7.44: Análisis SVD de QS3. probablemente basurafig.eof




Figura 7.45: 'Magnitud' y 'Fase' de cada mes a partir de las componentes principales fig:eof1-eof2




Figura 7.46: Correlación lageada para cada mes con los 12 siguientes.fig:lag-cor




Figura 7.47: Relación entre R^2 medio y R^2 reconstruido.fig:r2-cor2




Figura 7.48: R2 mediofig:r2-corte




Figura 7.49: R2 medio - fig:r2-ts




Figura 7.50: Correlación cuadrada media para estaciones según onda3.fig:cor-campo




Figura 7.51: Regresión sobre amplitud.fig:regr-gh-ncep




Figura 7.52: Igual que figura XX, pero en proyección polar para julio y septiembre.
fig:regr-gh-polar




Figura 7.53: Relación entre amplitud media de la onda 3 y el SAMfig:sam-ampl




Figura 7.54: Regresión de Psi con la amplitud. - fig:regr-psi-ncep




Figura 7.55: Tabla de selecciónfig:seleccion-tabla

	Ene		Feb		Mar		Abr	
Sí	2	8	2	8	3	7	2	8
No	19	2	19	2	18	3	19	2
R ²	May		Jun		Jul		Ago	
Sí	3	7	3	7	2	8	1	9
No	18	3	18	3	19	2	20	1
	Sep		Oct		Nov		Dic	
Sí	2	8	2	8	1	9	2	8
No	19	2	19	2	20	1	19	2
	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
	Amplitud							

Figura 7.56: Tabla de interacciónfig.interaccion-tabla




Figura 7.57: Composición de camposfig:gh-comp




Figura 7.58: Campos para los 10 eneros seleccionados.fig:gh-qs3-select-ene




Figura 7.59: Campos para los 10 septiembre seleccionados.fig:gh-qs3-select-sep




Figura 7.60: Regresión de SST con la amplitud de la onda 3fig:regr-sst-ncep




Figura 7.61: Correlación lineal entre campos de SPEEDY y NCEP.fig;cor-sp-nc




Figura 7.62: Anomalía zonal de altura geopotencial (speedy sombreado, ncep contornos)fig:ghz-sp-nc




Figura 7.63: Diferencia entre speedy y ncepfig:ghz-dif-sp-nc




Figura 7.64: Corte zonal de anomalía de geopotencial en -60° (speedy sombreado, ncep contornos).fig:ghz-sp-nc-corte60




Figura 7.65: Temperaturafig:t-nc-sp




Figura 7.66: T*fig:tz-sp-nc




Figura 7.67: Viento zonal medio (speedy contornos, ncep sombreado). - fig:u-sp-nc-corte




Figura 7.68: Viento zonal (contornos ncep, sombreado speedy).fig:u-sp-nc




Figura 7.69: Diferencia entre ncep y speedy en viento zonal fig:u-dif-sp-nc




Figura 7.70: Gradiante meridional de vorticidad absoluta (speedy).fig:etady-sp-nc




Figura 7.71: Número de onda estacionario en 300hPa (speedy).fig:ks-sp




Figura 7.72: Número de onda estacionario medio por círculo de latitud.fig:ks-sp-nc-corte




Figura 7.73: Función corriente x 1099fig:psi-sp




Figura 7.74: Amplitud de Fourier (speedy en sombreado, ncep en contornos).fig:ampl-sp-nc




Figura 7.75: Media de reconstrucción de onda 3 (sombreado speedy, contornos ncep) fig:qs2-sp-nc




Figura 7.76: Anomalía zonal de altura geopotencial.fig:ghz-sp-runs




Figura 7.77: Diferencia Control - corrida para Z^* - fig:ghz-dif-sp-runs




Figura 7.78: Temperatura media en 850hPa.fig:t-sp-runs




Figura 7.79: Temperatura media en 850hPa.fig:tz-sp-runs




Figura 7.80: Diferencia Control - corrida para T^* - fig:tz-dif-sp-runs




Figura 7.81: Viento zonal fig:uz-sp-runs




Figura 7.82: Diferencia control - corrida para U. - fig:u-dif-sp-runs




Figura 7.83: Anomalía zonal de función corriente y flujos de acción de onda.fig:psi-sp-runs




Figura 7.84: Diferencia en psi.z y flujo de acción de onda.fig:psiz-dif-sp-
runs




Figura 7.85: Amplitud media de la onda 3 para cada corrida.
fig:ampl-sp-runs




Figura 7.86: Diferencia de amplitud entre la corrida control y cada corrida.
fig:ampl-dif-sp-runs




Figura 7.87: Ciclo anual de amplitud de onda 3.fig:index-sp-boxplot




Figura 7.88: Regresión en función corriente. - fig:regr-psi-sp-runs