

Estudio de los mecanismos físicos asociados con el
patrón de onda 3 de la circulación atmosférica del
Hemisferio Sur

Elio Campitelli

Índice general

1	Introducción	5
2	Datos y Metodologías	7
2.1	Conceptos básicos	7
2.2	Fuentes de datos	7
2.3	Modelo SPEEDY	7
3	Climatología observada	9
3.1	Altura geopotencial	9
3.2	Temperatura	10
3.3	Viento zonal	11
3.4	Viento meridional	12
3.5	Propagación Meridional de Ondas de Rossby	13
3.6	Ondas Quasiestacionarias	13
4	Onda 3	15
4.1	Características típicas	15
4.1.1	Wavelets	16
4.2	Antecedentes	17
4.3	Amplitud	18
4.3.1	Máximo o media.	18
4.4	Fase	19
4.5	Estaciones	20
4.6	R ²	22
4.7	Regresiones	22
4.7.1	Geopotencial	23
4.7.2	Función Corriente	24
4.8	Composición de campos.	24
4.9	Fuentes de variabilidad interna	24
4.10	Fuentes externas	25
4.10.1	SST	25
5	Experimentos	27
5.1	Validación SPEEDY	27
5.1.1	Altura Geopotencial	27
5.1.2	Temperatura	28
5.1.3	Viento zonal	28

5.1.4	Gradiente meridional de vorticidad absoluta	28
5.1.5	Función corriente	29
5.1.6	Onda 3	29
5.2	Comparación entre corridas	29
5.2.1	Altura geopotencial	30
5.2.2	Temperatura	30
5.2.3	Viento zonal	30
5.2.4	Función corriente	31
5.2.5	Onda 3	31
5.2.6	Regresiones	32
5.3	Cosas inesperadas...	32
6	Conclusiones	33
7	Agradecimientos	35
Referencias		37
3.1	Función corriente	54
Resumen.		
Listado de abreviaturas		
Revisar TODOS los epígrafes		

Capítulo 1

Introducción

La variabilidad del clima en el sur de Sudamérica (SSA) desde escalas sinópticas e intraestacionales hasta escalas interanuales y más largas, es en buena parte remotamente influenciada tanto por las condiciones del clima en las regiones tropicales como en las regiones extratropicales (ej. Vera y otros (2006)). Si bien la influencia tropical ha sido y es extensamente estudiada, aquella asociada con las fuentes de variabilidad en regiones de latitudes medias y subpolares no lo ha sido tanto. Motiva el hecho que mientras que el clima en la zona tropical exhibe altos niveles de predictibilidad (en escalas estacionales asociados con el fenómeno del Niño-Oscilación del Sur (ENSO) y en escalas intraestacionales con la oscilación de Madden-Julian (MJO)), esos niveles en promedio decaen fuera de esa región. Sin embargo, estudios recientes de la variabilidad climática en las regiones subpolares y polares del Hemisferio Sur (HS) destacan la actividad del Modo Anular del Sur (conocido por su sigla en inglés SAM) como una fuente de variabilidad climática de significativa influencia sobre los continentes del HS y en particular del SSA (ej. Silvestri y Vera (2009) en escalas interanuales y Alvarez y otros (2014) en escalas intraestacionales). La distribución espacial del SAM se caracteriza por una anomalía de presión o altura geopotencial sobre el continente antártico y anomalías de signo opuesto en latitudes medias, generalmente asociadas con un patrón de onda planetaria de números de onda zonal entre 3 y 4 (patrón conocido generalmente como “la onda 3” o por su sigla en inglés ZW3). Si bien la alternancia del signo entre las anomalías polares y extratropicales del SAM se asocia con intensificaciones y debilitamiento de los vientos Oestes que caracterizan las latitudes medias del HS, las causas por las cuales estas variaciones se asocian con el desarrollo de la ZW3 no se conocen del todo todavía. Teniendo en cuenta el impacto que su desarrollo tiene en el establecimiento y persistencia de condiciones climáticas en el SSA amerita esta investigación.

- Antecedentes

Viejos estudios, como el realizado por Trenberth y Mo (1985), muestran una recurrencia importante en la ocurrencia de anticiclones de bloqueo simultáneos en diferentes regiones del HS (sur de Sudamérica, sur de Nueva Zelanda y porción central del Océano Indico), favorecida por el establecimiento de un patrón de ZW3. Desde ese momento hasta la actualidad diferentes estudios se concentraron en entender la influencia de los bloqueos sobre el clima de Sudamérica y su relación con la ZW3 (ej. Rao y otros, 2004), pero como se mencionó anteriormente muy poca atención ha recibido el estudio de las causas que dan lugar al establecimiento del patrón de ZW3. Quintanar y Mechoso (1995) realizaron experimentos de sensibilidad similares a los propuestos en este trabajo pero se centraron en la onda planetaria 1. Encontraron que las condiciones térmico-orográficas sobre la Antártida no eran suficientes para explicar la onda 1 planetaria de latitudes subpolares, por lo que concluyen que forzantes remotos

deberían jugar un papel.

Estudios sobre el flujo medio zonal del HS muestran que tiende a ser bastante simétrico zonalmente, sin embargo presenta importantes asimetrías asociadas principalmente por las ondas planetarias de número de onda 1 y 3 o ZW3. Estas ondas zonales tienden a ser quasi-estacionarias y exhiben importantes variabilidades temporales (ej. Van Loon y Jenne, 1972). En particular, se ha documentado que la ZW3 presenta una estructura barotrópica con variabilidad en escalas diarias-semanales (ej. Kidson, 1988), estacionales (ej. Mo y White, 1985) y más largas (ej. Karoly 1989). Mo and White (1985) en particular mostraron que existen ubicaciones preferenciales para los centros de acción de la ZW3. Cai y otros (1999) evaluaron la habilidad del modelo CSIRO en representar la ZW3 y encontraron que proporcionaba una representación adecuada de la misma.

El papel de las condiciones de superficie en el desarrollo de la ZW3 es también considerado. Raphael (1998) examinó la ZW3 en el modelo CCM del NCAR (versiones 1 y 3) y encontró que ambas versiones simulaban diferente a la ZW3, siendo los resultados sensibles al grado de representación del modelo tanto de la interacción mar-atmósfera como de las condiciones de hielo marino en las zonas polares. Raphael (2007) complementa estos resultados encontrando correlaciones significativas entre un índice de la actividad de la ZW3 (Raphael (2004)) y la extensión de hielo marítimo antártico. Este es un resultado importante ya que a pesar de que la ZW3 puede desarrollarse solamente por la dinámica interna de la atmósfera (ej. Simpson y otros. 2013), estos dos trabajos muestran que los modelos pueden reproducirla y que existen evidencias de que las condiciones superficiales pueden influenciar su actividad. Asimismo, Raphael (2003) encontró importantes variaciones interanuales experimentadas por la ZW3 entre 1958 y 1996, aparentemente relacionadas con variaciones en la frecuencia del ENSO, que también influyeron las asimetrías del SAM (Fogt y otros 2012).

Además de lo que hay en lo de las becas + lo que fui encontrando, agregar sobre las climatologías disponibles y sus limitaciones.

En consecuencia el objetivo principal de este plan es: entender los mecanismos que explican el desarrollo de la onda planetaria 3 (ZW3) en la circulación del Hemisferio Sur mediante simulaciones numéricas realizadas con el modelo SPEEDY.

Esto es para probar una referencia bibliográfica: Vera et al. (2004) y (Vera et al. 2004)

Capítulo 2

Datos y Metodologías

Agregar en algún lugar algo sobre las estadísticas circulares

2.1 Conceptos básicos

- Ondas cuasiestacionarias
- fourier
- wavelets
- Flujo de actividad de onda.

chequear este paper: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-012-0635-9>

Ejemplo:

Cosas para ver de Figura 2.1:

Descripción del “rol” de cada número de onda en generar el campo final. La QS1 es la principal, marcando altas presiones al sur del pacífico y bajas al sur de África. La onda 3 modifica ese patrón simple haciendo que los máximos y mínimos no sean continuos.

- Wavelets

Cosas para ver:

Cambio en el máximo. Localización en vez de un número para cada latitud.

2.2 Fuentes de datos

2.3 Modelo SPEEDY

Capítulo 3

Climatología observada

En este capítulo se presentan campos medios y anomalías zonales de altura geopotencial, temperatura, viento zonal, viento meridinal, gradiente meridional de vorticidad absoluta y el número de onda estacionario, y función corriente como introducción general al estado medio de la atmósfera sobre el cual se desarrollan las ondas estacionarias. Luego se analizan los campos de amplitud y varianza explicada por las ondas cuasiestacionarias (QS) en sí mismas.

3.1 Altura geopotencial

Campo medio:

El campo de altura geopotencial media (Z , Figura 3.1) muestra una estructura marcadamente zonal en todos los niveles y estaciones. En verano el gradiente meridional de Z es máximo en 200hPa, reduciéndose en 500hPa y por encima de 100hPa. En 50hPa el gradiente es prácticamente nulo y en niveles superiores, éste se invierte en comparación a los inferiores (no se muestra). En otoño el máximo de gradiente todavía se da en 200hPa, pero continua siendo intenso en niveles superiores. En invierno y primavera, el mayor gradiente se da en 50hPa y es mucho más intenso que los observados en los demás niveles o estaciones. En contraste con el resto de los niveles, 50hPa y 100hPa tienen mucha más variabilidad estacional.

El aumento del gradiente meridional de geopotencial en invierno y primavera en niveles altos está relacionado con la generación del vórtice polar [que aisla las latitudes polares de las latitudes medias](#). cita

En la ?? se muestra, para cada latitud y mes, el desvío estándar de la altura geopotencial con respecto a la media zonal (σ_z). En todos los niveles la variación meridional es muy similar con un máximo principal al rededor de 60°S durante todo el año y un máximo secundario en 30°S que aparece sólo entre junio y septiembre. El ciclo anual de σ_z también es similar entre niveles aunque con marcadas diferencias. En 100hPa el máximo absoluto se da en octubre, mientras que en los niveles más bajos, éste se da en agosto.

Las anomalías zonales de geopotencial (Z^* , Figura 3.3) muestran una preponderancia de la onda 1 (QS1) con una amplitud máxima en la estratosfera de primavera. Pueden diferenciarse dos QS1 distintas; una centrada en ~60°S y con el centro anticiclónico al rededor de la línea de fecha, y la

otra centrada en 75°S sobre la costa del continente antártico y el centro anticiclónico entre 120 y 60°O. Quintanar y Mechoso (1995b) concluyeron que la primera QS1 está asociada principalmente con forzantes de latitudes bajas mientras que la segunda responde a la orografía del continente antártico.

En latitudes tropicales, en verano hay una anomalía negativa sobre el Pacífico este con máxima amplitud en 200hPa que está presente en las otras estaciones con menor intensidad. Sobre Sudamérica, en verano y primavera en ese mismo nivel aparece un centro anticiclónico con un centro ciclónico al noroeste. Estas anomalías (la alta de Bolivia y la baja del noroeste) son características del Sistema Monzónico Sudamericano (Vera et al. 2006).

En la Figura 3.4 se muestra un corte zonal en 60°S de Z^* . Se aprecia la coherencia vertical de la QS1 y es evidente la inclinación hacia el oeste con la altura en todas las estaciones salvo en verano, en coincidencia con lo encontrado por Quintanar y Mechoso (1995a). Karoly (1985) describió una estructura equivalente barotrópica tanto en verano como en invierno en 55°S, pero esto se debe a la falta de niveles verticales por encima de los 100hPa que es donde la inclinación es más importante.

La inclinación hacia el oeste con la latitud (Figura 3.3) y con la altura (Figura 3.4) indican que las perturbaciones estacionarias están asociadas con transporte hacia el polo tanto de cantidad de movimiento zonal como de temperatura, por las perturbaciones (James 1994). En verano las anomalías zonales tienen una estructura barotrópica equivalente y carecen de inclinación en la horizontal, así como los transportes meridionales asociados se reducen considerablemente en la estratosfera.

3.2 Temperatura

La distribución horizontal de la temperatura media (Figura 3.5), al igual que la altura geopotencial media, tiene una estructura principalmente zonal en todos los niveles y estaciones. Por debajo de los 200hPa, donde el gradiente meridional de temperatura es mínimo, la temperatura disminuye con la latitud en todas las estaciones. Por encima de este nivel, en cambio, en verano la temperatura crece con la latitud, y en el resto de las estaciones muestra un máximo centrado en 60°S en otoño y en 45°S en invierno y primavera. El nivel de 850hPa se ven las asimetrías zonales más importantes asociadas con los contrastes de temperatura entre continente y océanos, como el máximo sobre Australia en verano.

En 300hPa, el gradiente meridional de temperatura en latitudes medias tiene un importante ciclo anual con máximo en invierno y mínimo en verano. En niveles inferiores, el ciclo anual es menos marcado y más dependiente de la latitud. En 500hPa, en 150°E en 30°S se da un máximo del gradiente meridional de temperatura en invierno con mínimo en verano mientras que en 45°S el ciclo es el inverso.

El promedio zonal de la temperatura se muestra en la Figura 3.6. Al norte de los 45° durante todo el año la temperatura decrece con la altura por debajo de los 100hPa aproximadamente, donde alcanza un mínimo que marca la tropopausa, y crece por encima. La altura del mínimo de temperatura varía mucho al sur de los 45°, siendo mínima en verano (300hPa) y máxima en invierno y otoño (30hPa). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la tropopausa no está bien definida en el invierno Antártico (Court 1942 Zängl (2001)) por lo que el uso de la tropopausa térmica no es conveniente. Zängl (2001), utilizando datos de ERA para el período 1979-93, encontraron que la tropopausa térmica varía entre los 320hPa en enero y los 170hPa en agosto aunque advierten que el uso del criterio térmico es “problemático” en el invierno antártico.

En la Figura 3.7 se muestran las anomalías zonales de temperatura media. En 850hPa se aprecia el

efecto del contraste de temperatura entre el suelo y el mar. Se observan anomalías positivas sobre los continentes y negativas sobre los océanos en todas las estaciones, aunque más intensas en verano y primavera. En niveles más altos éstas pierden su intensidad pero reaparecen en 100hPa con signo invertido. Estas características tienen su correlato en la altura geopotencial y corresponden a circulaciones tipo Walker.

¿Es así?

En invierno y primavera, los niveles altos están dominados por una QS1 con máximo en el sur de Australia y mínimo en el Atlántico sur. En niveles más bajos, la onda disminuye su amplitud y se defasa hacia el este y queda casi en cuadratura con la onda de niveles altos (Figura 3.8) presentando un máximo en 850hPa en Antártida occidental. En otoño esta onda está presente pero con amplitud muy reducida y máxima en niveles medios. Finalmente, en verano ésta desaparece por encima de 100hPa.

En la ?? se muestra un corte vertical-zonal en 60°S de la anomalía zonal de temperatura. En invierno y primavera la estructura vertical tiene una inclinación hacia el oeste con la altura por encima de los 300hPa, pero es barotrópica equivalente por debajo de ese nivel.

3.3 Viento zonal

La media zonal del viento zonal (Figura 3.9) muestra dos máximos, uno en latitudes medias en 200hPa y otro en latitudes plares en la estatósfera, correspondientes al jet subtropical y subpolar, respectivamente. El primero está presente durante todo el año aunque con mayor intensidad y corrido hacia latitudes más ecuatoriales en invierno y primavera. El segundo está presente principalmente en invierno y primavera, e incipiente en otoño. Además en la estratosfera se observan vientos del este en latitudes bajas que son más intensos en verano y otoño.

En la Figura 3.10 se observa que el jet subpolar es más intenso al sur de África, donde además se encuentra en una latitud más ecuatorial que en la región del Pacífico. El jet subtropical también tiene un máximo al sur de África y otro al norte de Nueva Zelanda –especialmente en invierno–, donde además se produce una bifurcación del jet. Se trata de una región de persistentes y frecuentes bloqueos (ej. Trenberth y Mo 1985).

Esta bifurcación del jet sobre Nueva Zelanda se evidencia en el campo de anomalías zonales de viento zonal (Figura 3.11) como anomalías negativas durante todo el año. Este campo también presenta varios pares de QS1 antisimétricos respecto a 60°S. Estas anomalías se corresponden con la variación meridional del jet observado en la Figura 3.10 y son consistentes con la QS1 de geopotencial observada en la Figura 3.3, las cuales generan viento zonal anómalo del este y del oeste al norte y sur del anticiclón respectivamente.

En verano, entre 300hPa y 100hPa sobre el Pacífico ecuatorial existe una zona de anomalías del viento zonal positivas al este y negativas al oeste. Consistente con los campos de temperatura, esto implica divergencias en niveles altos y convergencias en niveles bajos (no se muestra). Evidencia de la circulación tropical forzada por la temperatura superficial del pacífico.

buscar cita

Los campos de viento zonal, temperatura y altura geopotencial están ligados por el balance de viento geostrófico y de viento térmico. El máximo del jet se encuentra en regiones de máxima baroclinicidad y máximo gradiente meridional de Z y donde el gradiente meridional de temperatura se anula.

3.4 Viento meridional

El corte vertical-meridional del promedio zonal viento meridional medio (Figura 3.12) muestra los máximos tropicales presentes en superficie y altura en todas las estaciones, relacionados con la circulación de Hadley. En verano, la rama ascendente se encuentra en el hemisferio sur y se tiene convergencias en niveles bajos y divergencias en niveles altos. En invierno, en cambio, sólo se ve la rama descendente, mucho más intensa que en verano, que genera convergencias en niveles altos y divergencias en niveles bajos al rededor de los 30°S.

Presente durante todo el año, también se observa un maximo de vientos del sur en la costa antártica. Esta es la señal de los vientos catabáticos antárticos producidos por una capa muy estable cerca de superficie y la consistente inclinación de la topografía del continente.. Aunque los datos allí pueden tener limitaciones por la falta de observaciones y la representación de la orografía.

Los campos horizontales de V se muestran en la Figura 3.13. Consistente con los campos de Z^* (Figura 3.3), en niveles altos se observa una QS1 que alcanza su máximo en la estratosfera de primavera.

En invierno entre 500hPa y 100hPa, existe evidencia de un tren de ondas de Rossby que se propaga desde el Índico occidental sudeste llegando a su máxima latitud en 150°O donde comienza a propagarse hacia el norte hasta llegar al sur de Sudamérica. Este tren de ondas puede identificarse en el campo de Z^* (Figura 3.3), pero con mayor dificultad debido a la interferencia de la QS1 y a la dependencia de Z^* con el parámetro de Coriolis, es decir, la latitud. El tren de ondas se distingue en la troposfera alta, también en primavera y con menor intensidad en verano y otoño.

Las anomalías zonales del viento meridional también permiten distinguir otras características cuasestacionarias del clima, como aquellas asociadas con los monzones. En el invierno, en los trópicos se puede observar la anomalía positiva en 850hPa en la costa oeste de África asociada con el flujo hacia el monzón de la India. En altura, el monzón de la India se evidencia en esa estación como anomalía de viento hacia el sur producto de la divergencia de niveles altos generada por la convección anómala. Por otra parte, en verano se evidencia en la troposfera alta sobre Sudamérica tropical anomalías positivas sobre el centro-este del continente y negativas en los océanos subyacentes. Tal patrón de ondas estacionario se relaciona con la presencia del Alto de Bolivia y las vaguadas estacionarias a sus lados, siendo la del este típicamente llamada la Baja del Nordeste (Vera et al. 2006).

No se muestran los campos de anomalías zonales de V ya que son virtualmente idénticos a los campos de V porque la media zonal de esta variable es virtualmente nula en todo el dominio.

Para analizar la influencia tropical en la circulación no es posible usar la altura geopotencial, ya que el balance geoestrófico pierde validez cerca del ecuador. Por lo tanto, es útil analizar el campo de función corriente (ψ). El reanálisis de NCEP provee esta variable en niveles sigma en vez de presión. En la Figura 3.14 se muestra ψ en el nivel 0.2101 sigma, que equivale aproximadamente a 250hPa. Además del campo medio, se muestran las anomalías zonales en sombreado y los flujos de actividad de onda en flechas.

Las características del campo de ψ , tanto el total como las anomalías zonales, es similar al de Z (Figura 3.1, 200hPa) con una estructura eminentemente zonal y un aumento del gradiente meridional en invierno y primavera y los mismos centros de anomalías. La principal diferencia es, además del cambio de signo dada por la dependencia de ψ con f , es que los patrones presentes en las latitudes tropicales se ven con mayor magnitud que los de latitudes medias y altas.

Los flujos de actividad de onda en verano muestran transporte de energía desde el Pacífico este hacia

el sur de África pasando por el Atlántico que se sostiene durante todo el año con menor intensidad. Desde ese lugar también se observa transferencia de energía hacia el hemisferio norte, que se junta con otra región de flujos intensos que viene desde el Pacífico oeste. Sobre el Índico, los flujos son de mayor magnitud en invierno transportando energía hacia el sur.

3.5 Propagacion Meridional de Ondas de Rossby

En la teoría de propagación meridional de ondas de Rossby, el gradiente meridional de vorticidad absoluta (ψ_y)

es importante porque bla bla bla ¿Resumen de la deducción en James?

La Figura 3.15 muestra el campo de ψ_y con una región con valores negativos centrada sobre Nueva Zelanda, en invierno entre 300hPa y 200hPa, coincidiendo con la región de bloqueos. Está flanqueada por el jet subtropical intenso y el jet subpolar más al sur, dando lugar a gradientes meridionales de U negativos más intensos que β . Otras regiones con valores negativos se distinguen en la costa antártica.

Valores de ψ_y negativos son un factor que impiden la propagación meridional de ondas de Rossby barotrópicas. Esta figura reproduce y extiende el resultado de Berbery, Nogués-Paegle, y Horel (1992) (su Figura 3) utilizando 5 años de análisis objetivo del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF). Asimismo, aún con ψ_y positivo, las ondas de Rossby barotrópicas sólo se pueden propagar si su número de onda zonal es menor que el número de onda estacionario (James 1994). En la Figura 3.16 se muestra el número de onda estacionario para el nivel de 200hPa. Entre otoño y primavera, se destaca claramente la región del Pacífico Oeste en la cual la propagación meridional está inhibida. Además, en todas las estaciones, las ondas cortas no pueden propagarse meridionalmente en latitudes altas. La Figura 3.16 muestra que las ondas de Rossby barotrópicas con k menores o iguales a 3 pueden propagarse meridionalmente en las cuatro estaciones hasta aproximadamente los 60°S, excepto en la franja de longitudes entre 60°E y 120°O, donde quedan atrapadas al sur de 45°S (excepto en verano).

La ?? se muestra un corte vertical en 180° del número de onda estacionario. Se observa que en la troposfera alta se dan las condiciones para la propagación desde latitudes más bajas hasta las subpolares. Además se destaca que la zona de inhibición de la propagación meridional es una característica de la troposfera alta solamente, lo que confirma de alguna manera el papel del jet subtropical en producirla.

3.6 Ondas Quasiestacionarias

Como se describió en ??, el análisis estacional de la amplitud y r^2 de Fourier puede hacerse a partir de la media de los campos mensuales o aplicando Fourier a los campos estacionales. En el caso de los datos de NCEP existe poca diferencia, por lo que sólo se muestran los resultados conseguidos mediante esta última metodología.

La Figura 3.17 muestra el corte vertical-meridional de r^2 de Fourier para las ondas estacionales 1 a 4. Consistente con lo encontrado previamente en el campo de Z^* , la QS1 explica la mayor parte de la variabilidad en todo el dominio al sur de los 45°S. La QS2 es preponderante en la estratosfera ecuatorial, en la costa antártica y alrededor de 35°S, donde es el modo dominante en toda la columna de aire en verano. La QS3, a diferencia de las ondas anteriores es importante en una región reducida. Explica una parte substancial de la varianza en niveles bajos al rededor de los 45°S y mayormente

en invierno. La QS4 explica muy poca varianza a excepción de cerca de superficie entre 15°S y 30°S. Ondas más cortas son aún menos importantes (no se muestra).

El r^2 permite analizar la importancia relativa de cada modo con respecto a la variabilidad total, pero lo que importa desde el punto de vista físico es la amplitud de la onda. La Figura 3.18 muestra cortes verticales-meridionales de la amplitud. Las diferencias entre los campos de r^2 y los de amplitud son evidentes comparando con la Figura 3.18 (notar la escala logarítmica en los colores). La amplitud de la QS1 muestra un máximo bien definido centrado en 60°S que en verano se encuentra en niveles más bajos que en las otras estaciones. También existe un máximo relativo entre 15°S y 30°S en verano que migra a latitudes más altas en invierno y primavera. El mismo está presente también en las otras ondas estacionarias.

En el caso de la QS2, se evidencia que a pesar de tener máximos de r^2 en la estratosfera al norte de 45°S, alcanza su máxima amplitud al sur de esa latitud y en 200hPa en verano y en 30hPa en invierno. Su actividad en la costa antártica se extiende en toda la tropósfera en invierno (a pesar de que en r^2 pierde importancia por encima de los 200hPa)

La región de amplitud máxima de la QS3, coincide aproximadamente con la región de máximo r^2 entre otoño y primavera, aunque con menos actividad en superficie y extensión en toda la columna. En verano, en cambio aparece un máximo de amplitud importante que no se observa en el campo de r^2 .

Finalmente, fuera de la superficie, la QS4 presenta un máximo de amplitud bien definido sólo en verano. El máximo entre 15°S y 30°S sigue presente.

Acá podría poner alguna reflexión general de lo que se ve. Por ejemplo, cómo en verano la variabilidad está más acotada a la tropósfera mientras que en invierno y primavera hay más contacto con la estratosfera.

Capítulo 4

Onda 3

introducción a QS3; decir que esto es una onda reconstruida a partir de fourier

4.1 Características típicas

En la Figura 4.1 se muestra el campo de Z^* reconstruido sólo a partir de la QS3 en 300 hPa, que ilustra lo que sucede en todos los niveles dado que su estructura es barotrópica equivalente (como se verá en la Figura 4.2). De acuerdo con lo encontrado en la amplitud de Fourier para la QS3 (Figura 3.18), la amplitud es máxima entre 60°S y 45°S con menor intensidad en primavera. En el verano la fase es tal que una de las tres anomalías anticiclónicas se ubica hacia el este del sur de Sudamérica. Se observa que existe un corrimiento de la fase entre verano e invierno de poco más de 15° (algo ya observado por Loon y Jenne, Roy (1972) y Mo y White (1985)) anticipando que el efecto de la QS3 sobre cada lugar pueda tener una componente estacional.

Además, las anomalías presentan una inclinación meridional que, como la teoría de ondas de Rossby indica, está asociada a transportes de cantidad de movimiento hacia el polo. La inclinación es más importante en las estaciones de transición, pero menor en verano y no detectable en el invierno.

Cuadro 4.1: Transporte meridiano de cantidad de viento zonal NO SE PUBLICA

Estación	[u^*v^*]
Verano	-0.100
Otoño	-0.431
Invierno	-0.016
Primavera	-0.163

La estructura vertical de las perturbaciones zonales de geopotencial reconstruidas a partir de la QS3 se presenta en la Figura 4.2. En todas las estaciones la mayor amplitud se da en 300hPa, con el máximo desarrollo vertical en invierno, seguido por el otoño y verano. Se destaca además la variación estacional de la fase, descripta previamente.

Asimismo, se observa que existe una variación estacional en la inclinación vertical de las perturbaciones. En invierno se observa una ligera inclinación hacia el oeste por debajo de los 300hPa. Algo que no se

detecta en las otras estaciones. La teoría de ondas de Rossby indica que una inclinación hacia el oeste está asociada con transporte de calor hacia el polo por las perturbaciones (James 1994).

En la Figura 4.3 se muestra el desvío estándar de las perturbaciones reconstruidas a partir de la QS3. La variabilidad máxima se da entre los centros ciclónicos y anticiclónicos (marcados en la Figura 4.3 con contornos negros), indicando que la variabilidad del geopotencial asociada a la QS3 se debería principalmente corrimientos de la fase que ocurren dentro de cada estación.

4.1.1 Wavelets

Como se describió en el capítulo 2, se utilizó la metodología de wavelets como alternativa a la de Fourier para aislar la QS3. La amplitud media obtenida mediante wavelets es virtualmente idéntica a la amplitud obtenida con fourier (Figura 4.4).

La metodología de wavelets también permite obtener información de la variación meridional de la amplitud de la QS3. Al igual que con Fourier, esto puede hacerse promediando estacionalmente la amplitud de los campos mensuales o calculando la amplitud de los campos estacionales. Pero a diferencia de Fourier, los resultados de la aplicación de estas dos estrategias usando wavelets son distintos. Esto es evidente en la Figura 4.5 donde se muestra el campo de amplitud de la QS3 según wavelets en líneas y su anomalía zonal en sombreado. Los valores positivos representan regiones donde la amplitud de la QS3 es mayor que la media zonal y viceversa.

Comparando los campos totales de amplitud de wavelets de las Figuras 4.5a y 4.5b se puede observar que no existe mucha diferencia en la amplitud media zonal entre ambas metodologías a excepción de que la amplitud del campo medio siempre es menor que la media de la amplitud.. Las principales diferencias se dan en las anomalías zonales.

Al norte de los 30°S, ambas metodologías dan resultados similares. En primavera, verano y otoño las anomalías zonales son positivas sobre el Pacífico y negativas en el Índico, indicando que hay una QS3 con mayor amplitud sobre éste océano. En invierno, las anomalías zonales desaparecen al norte de 30°S.

Las dos metodologías divergen al sur de 30°S. La anomalía zonal de la amplitud media de la QS3 del campo medio (Figura 4.5a) tiene, en todas las estaciones, un máximo al sur del Índico centrado en 45°S que se desplaza hacia el este en latitudes más altas. Existe un segundo máximo en altas latitudes que en otoño y primavera se encuentran en 120°E y en invierno se encuentra en 180°. La media de la amplitud de la QS3 (Figura 4.5b), en cambio tiene anomalías negativas al sur del Índico y positivas al sur del Pacífico durante todo el año.

Cosas para ver:

* Si bien el máximo medio de la amplitud se da en ~300hPa (Figura 4.4) igual que en fourier, el análisis por longitud muestra algo un poco más complejo. En verano y otoño, la máxima amplitud sigue en 300hPa, pero ésta asciende a entre 100 y 50hPa en invierno y primavera alrededor de 120°O. Además, durante estas estaciones hay indicación de que el máximo cambia de latitud con la altura.

Las diferencias vistas en la Figura 4.5 están relacionadas con la estacionariedad de las ondas , se puede utilizar la relación entre ambas para generar un índice de estacionariedad . Cuanto más similar sea el resultado, más estacionarias son las ondas. Así, la estacionariedad sería máxima en latitudes bajas y

al rededor de 50°S –principalmente en verano– y mínima en dos franjas angostas cerca de 30°S y 75°S.

[Mostrar el gráfico](#)

Esta discusión también aplica a fourier (??), en realidad, pero ahí no estoy mostrando ambos resultados porque da parecido. Quizás este párrafo se puede mover.. o borrar todo si resulta puro sinsentido.

Estas observaciones destacan la utilidad de wavelets en el análisis de ondas cuasiestacionarias. Mientras que el tratamiento con fourier asume a las ondas como una propiedad media de cada círculo de latitud, wavelets permite reconocer su heterogeneidad meridional. Evaluando esta heterogeneidad, sería posible distinguir entre campos donde una onda con un determinado número de onda está presente en todo un círculo de latitud de campos donde ésta está localizada en una región acotada.

Por otro lado, la no ortogonalidad de los wavelets complejizan la interpretación de los resultados ya que no es posible la separación de un campo en modos oscilatorios con distinto número de onda. El análisis de una QS específica, por lo tanto, está contaminado por la actividad de otras QS con longitud de onda cercana.

Wavelets, en resumen, puede entenderse como una *corrección* a fourier que agrega información de asimetrías zonales. Dado que la variabilidad zonal es del orden de un 10% de la amplitud media, en lo que sigue de la tesis se utilizará sólo fourier, dejando el análisis e interpretación de wavelets para futuros trabajos.

4.2 Antecedentes

Teleconnections in the Southern Hemisphere tiene un índice

Southern mid- to high-latitude variability, a zonal wavenumber-3 pattern, and the Antarctic circum-polar wave in the CSIRO coupled model tiene un índice similar al de Marilyn

índice de Marilyn

Breve comentario sobre los índices usados en otros lados. Discutir ventajas y debilidades.

- Amplitud
- Fase (impacto en SA)

De todo eso, motiva decisión del índice.

- Niveles elegidos
- Promedio vs. máximo
- Composiciones de campos y flujos.
- Decisión del índice.

Quiero hacer el índice a partir de la actividad de la onda 3 tomando la región del máximo (latitud entre -65 y -40, y entre 700 y 100 hPa). Variables posibles: amplitud media, amplitud máxima, r², correlación entre campo teórico y observado.

4.3 Amplitud

4.3.1 Máximo o media.

Existen varios estadísticos que podrían utilizarse para representar la amplitud de la QS3 en una región extendida. La media, la máxima, la moda, la mediana, etc... En este caso, se estudió la posibilidad de representarla con la media o la máxima.

Se seleccionaron 9 casos que representan distintas características de la amplitud media y la máxima. Sus valores se muestran en la Figura 4.7, y los campos de Z* (con las QS1 y QS2 restadas) en la Figura 4.8.

Comparando mayo de 1997 con abril de 2012, ambos tienen una media muy similar (Figura 4.7), pero la máxima del primero es menor que la del segundo. Observando el campo de geopotencial (Figura 4.8), la QS3 se aprecia mucho más claramente en 2012 que en 1997.

Enero de 1985 y julio de 1988 son similares en cuanto a la relación de las métricas de amplitud (Figura 4.7), pero en este caso ambos campos de Z* (Figura 4.8) son muy similares en cuanto a intensidad y claridad de la QS3. Los dos meses presentan un tren de ondas que ocupan aproximadamente 1/3 de círculo de latitud. A pesar de que la amplitud máxima de 1985 es menor que la de 1988, el tren de ondas de 1988 se ve algo más claro que el de 1985.

El par septiembre de 2000 y diciembre de 1990 es más claro. Ambas medidas de amplitud son mayores en 1990 (Figura 4.7) y, en efecto, el campo de Z* (Figura 4.8) tiene una estructura de QS3 zonal más clara que el de 2000. Sin embargo, las anomalías sí están presentes en 1990 –un tren de ondas similar al de enero de 1985, aunque con distinta fase– son más intensas, por lo que su efecto local puede ser mayor que las de 2000.

Más extrema aún es la diferencia entre septiembre de 2000 y octubre de 2003. Ambos meses tienen una métrica de amplitud similares (Figura 4.7), pero la QS3 es apenas distinguible en el segundo mes (Figura 4.8).

Estos casos ilustran algunas limitaciones del análisis que sigue. Algunos problemas son inherentes al intentar representar una estructura con variabilidad espacial a partir de un sólo número y otros están atados a la limitación de la descomposición de fourier que trata toda onda como una onda planetaria.

Es importante tener en cuenta que estos 9 casos fueron seleccionados específicamente para ilustrar estas limitaciones y que no son necesariamente representativos de la totalidad de casos posibles. Como se muestra en la Figura 4.9, la amplitud media máxima tienen una excelente correlación ($r^2 > 0.9$) y una relación lineal. Debido a esto, a fines estadísticos la elección de una métrica o la otra no tiene una influencia importante. Desde este momento se usará la amplitud media.

El ciclo anual de la amplitud media se muestra en la Figura 4.10a donde los puntos son datos puntuales. La amplitud máxima se da en agosto así como la mayor variabilidad. Esto es de esperarse en una variable definida positiva que toma valores cercanos a cero. Notar que la amplitud media no es mínima en los meses de primavera, en contraste con lo observado en el análisis climatológico (Figura 3.18) y los campos reconstruidos (Figura 4.1). La resolución a este problema radica en el análisis de la fase (Sección 4.4).

La serie temporal de la amplitud media se muestra en la Figura 4.10b donde en líneas horizontales se marca la amplitud media anual para cada año indicando en color rojo o azul si dicho valor está por encima o debajo de la media de la serie respectivamente. Se observan series de años con anomalías

positivas consistentemente seguidos por anoamías negativas (1985-1990, 1992-1996 y 1999-2005) y otras con persistencia de anomalías positivas o negativas (2005-2009 y 2012-2015). No hay evidencia visual de periodicidades ni de una tendencia secular.

Correlación con SOI? Siguiendo a Mo& White. Ellos encontraron una correlación entre un índice (medio fumado, la verdad) y SOI. Pero Cai et al hicieron su índice y no encontraron correlación (en un modelo).

4.4 Fase

Además de la amplitud, las sondas planetarias se caracterizan por su fase.

intro sobre la fase

La Figura 4.11 muestra la fase media (localización media del máximo de geopotencial) y el rango delimitado por ± 1 desvío estándar para cada mes para los 20 años con más amplitud de cada mes. En rojo y azul se indican la localización de los centros de máxima y mínima anomalía de geopotencial respectivamente de los 10 casos más extremos. El mapa se muestra para referencia, pero notar que la posición de los puntos en el eje vertical no tiene significado geográfico.

Se observa el ciclo anual en la fase ya se podía apreciar en la Figura 4.1. La fase media se centra en 55°O en enero y se desplaza a 90°O en junio con valores intermedios en los meses de transición. El continente queda al este del máximo de geopotencial en invierno que, por balance geoestrófico, implica vientos del sur. En verano se da la situación contraria. Esto resalta que el efecto de la QS3 sobre Sudamérica depende de forma crucial en la fase.

Superpuesto a el ciclo anual, en la Figura 4.11 también se puede apreciar la variabilidad interanual para cada mes. Ésta es considerable y de una magnitud comparable a la del ciclo anual. En particular, es notorio el aumento en la variabilidad en los meses de primavera, al punto de que en noviembre la fase prácticamente no tiene una posición predilecta.

La gran variabilidad presente durante los meses de primavera, en comparación con el resto del año, explica por qué en los campos medios la QS3 aparece débil a pesar de que su amplitud mensual no es menor. Al hacer el promedio, los campos que están defasados en entre $1/4$ y $3/4$ de longitud de onda (entre 30° y 90° en el caso de la QS3) interfieren destructivamente entre ellos, eliminando la señal en los campos medios. En primavera, más del 30% de los meses tienen algún nivel de interferencia destructiva con el campo medio, comparado con el 13% en verano.

Cuadro 4.2: Desvío estándar de la fase para cada estación - NO SE PUBLICA

Estación	SD
1	17.33446
2	14.76324
3	20.77567
4	18.05311
5	24.53463
6	22.75816
7	19.78503
8	22.25149

Estación	SD
9	22.27158
10	27.65658
11	41.90526
12	33.14720

Cuadro 4.3: Porcentaje de meses con interferencia destructiva - NO SE PUBLICA

season	V1
Verano	12.903
Otoño	18.280
Invierno	26.882
Primavera	31.183

Observando ahora la distribución de los centros ciclónicos y anticiclónicos (puntos rojos y azules, respectivamente) se nota que, a pesar de que climatológicamente la Sudamérica está afectada por un máximo de Z^* de la QS3, la variabilidad interanual implica que hay un número no despreciable de años donde el continente tiene un mínimo de Z^* asociado a esa onda. Aún sólo mirando a los 20 años más intensos de cada mes, en noviembre hay 5 casos y en diciembre, 4.

4.5 Estaciones

En las secciones anteriores se mostraron campos medios estacionales utilizando la definición tradicional de las estaciones climatológicas (verano = DEF, otoño = MAM, invierno = JJA, primavera = SON). Sin embargo, como éstas son definidas a partir del ciclo anual de temperatura en latitudes medias no constituyen necesariamente el mejor agrupamiento de los datos para otras variables u otras latitudes (por ejemplo, la Antártida).

Una metodología muy utilizada para la clasificación de campos es el análisis de componentes principales (PCA).

La tabla ?? muestra la varianza explicada de cada componente principal obtenida a partir de los campos reconstruidos de QS3. Las primeras dos componentes explican más del 80% de la varianza y cada una explica una parte similar de la varianza, indicando que se trata de autovalores degenerados. Sabiendo, además, que los campos de QS3 prácticamente sólo tienen dos grados de libertad (amplitud y fase), la elección de seleccionar las dos primera componentes es natural además de justificada por la tabla ??.

Cuadro 4.4: Varianza explicada por las 5 primeras componentes principales de los campos de QS3 reconstruidos.

PC	R^2
1	0.436
2	0.397
3	0.054

PC	R^2
4	0.038
5	0.026

La forma de las dos primeras componentes principales del campo de QS3 (??) son dos QS3 en cuadratura cuya combinación lineal resulta en otra QS3 cuya fase depende de la amplitud relativa de cada componente. En verano predomina la PC1, mientras que en invierno predomina la PC2 como se muestra en la Figura 4.13. En este diagrama se puede mapear aproximadamente la amplitud y la fase media de cada mes a la distancia y el ángulo con respecto al origen.

En la Figura 4.13 también se hace una posible modificación de las estaciones clásicas adaptada para el análisis de la QS3 basada en la posición media de cada mes en el espacio de componentes principales. Enero, febrero y marzo tienen preponderancia del PC1 y casi nulo PC2, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre tienen una mezcla similar de componentes, pero es conveniente separar los dos primeros para respetar la progresión temporal. Junio y julio no están tan juntos como los demás meses, pero se los puede agrupar por tener gran magnitud de PC2. Finalmente, noviembre y diciembre aparecen como *outliers* en este diagrama debido a que su mayor variabilidad (como se notó en la Sección 4.4) hace que no predomine ninguna componente principal. Es posible clasificarlos juntos como meses de “no estacionaridad” indicando que se trata de una época del año donde la QS3 no está presente.

El efecto de esta nueva clasificación en los campos medios se presenta en las figuras 4.14 y ???. Comparando con las figuras ?? y ?? de la sección 4 se ve que los campos de las estaciones de transición (AM y ASO) son más similares entre ellas tanto en el campo horizontal como en el corte meridional. Los meses no estacionarios (ND), por su parte, prácticamente carecen de QS3.

El uso de componentes principales para el análisis de una onda que cambia de fase es similar a la metodología utilizada para el monitoreo de la MJO [por lo que sería posible su utilización como](#) cita de MJO indicador de la actividad de la QS3 distinto de la amplitud media de fourier. La exploración de dicho indicador está por fuera del objetivo de este trabajo.

Una desventaja de esta clasificación es que no todas las estaciones tienen la misma cantidad de meses, lo cual dificulta la comparación estadística entre distintas estaciones. ## Persistencia (ver dónde va)

En la Figura 4.16 se muestra la correlación del campo de QS3 de cada mes con los demás. La línea escalonada marca la separación del año de manera que un número a la izquierda de la misma implica correlación de ese mes con meses del año siguiente. Las correlaciones justo a la izquierda de la línea escalonada son positivas y relativamente altas para casi todos los meses salvo noviembre, diciembre y agosto. Esto implica que estos meses tienen poca similaridad de un año a otro. Noviembre y diciembre también presentan bajas correlaciones en general con los demás meses y ambas observaciones se puede comprender a la luz de los resultados de las secciones anteriores: al ser meses con actividad de la onda 3 poco estacionaria, sus campos de QS3 no son consistentemente similares con ningún otro mes. Esta interpretación no parece posible para agosto, ya que su variabilidad no es particularmente alta (Figura 4.11). ¿qué pasa con

Los valores un mes a la derecha de la linea escalonada son también generalmente altos indicando buena concordancia entre los campos de un mes y el siguiente. Para esto nuevamente las excepciones son noviembre, diciembre y julio. La explicación para estas bajas correlaciones posiblemente sea la misma que para las anteriores.

Las correlaciones entre meses corridos 6 meses son bajas para los meses de verano e invierno y medias

para los meses de transición. Es decir, los meses de verano son muy distintos de los de invierno, mientras que los de transición son medianamente parecidos a todos. Esta es una consecuencia del ciclo anual de la fase (Figura 4.11).

4.6 R2

En la ??, se mostró la estructura vertical de la varianza explicada por la QS3 para cada estación (Figura 3.17). En esta sección se explora la estructura horizontal de dicha propiedad. Para esto, se toma como r^2 la correlación cuadrada entre el valor de Z^* y el de QS3 para cada punto de grilla y cada mes.

Los campos horizontales de r^2 para 300hPa se muestran en la ??, con los centros de máximas anomalías marcados con líneas. En las cuatro estaciones la QS3 explica la mayor parte de la varianza en el hemisferio oeste entre 60°S y 45°S. Lejos de ser homogéneos, los campos muestran tres máximos localizados con cierta persistencia durante el año. El primero, al sur del Índico, está presente en verano y otoño en 60°E que se mueve hacia el este en invierno y primavera. Algo similar sucede en el segundo máximo al sur del Pacífico, que pasa de 180° a 120° entre otoño y primavera. Hay un tercer máximo en el Atlántico sur cuyo desplazamiento hacia el este es bastante menor. Finalmente, en verano y otoño hay un máximo en latitudes bajas en el pacífico central.

Si se compara la posición de los máximos de r^2 con los centros de QS3, el máximo del Índico, por ejemplo, coincide con un anticiclón en verano pero se encuentra entre dos centros en otoño y lo mismo pasa con el máximo del Atlántico. Éste último coincide con un centro anteciclónico en verano pero está más cerca de uno ciclónico en invierno. No parece haber una asociación entre los máximos de r^2 y los centros de QS3.

Comparando con la Figura 4.5 de campos de amplitud de wavelets, se puede observar cierta correspondencia entre las anomalías zonales de wavelets y los campos de r^2 . Ambos son más intensos en el hemisferio occidental, muestran una translación general hacia el este entre verano e invierno e incluso ambos presentan máximos en el pacífico central. Que estas características se recuperen utilizando dos metodologías independientes brindan robustez al resultado.

Si se realiza un análisis análogo pero en base a las estaciones definidas en la Sección 4.5 las principales diferencias son un debilitamiento de los máximos durante EFM y una fuerte intensificación del máximo del Atlántico durante DN (no se muestra). Las características generales no cambian.

Conclusión: no voy a usar el r2 a partir del campo reconstruido.

4.7 Regresiones

Los campos de QS3 reconstruida a partir de Fourier permiten conocer la forma idealizada del campo de geopotencial asociado a esa onda, pero por su naturaleza no permiten conocer el estado típico de la atmósfera cuando la QS3 está activa. Haciendo la regresión entre el índice de QS3 obtenido en la sección anterior, se pueden obtener...

4.7.1 Geopotencial

En la Figura 4.18 se muestra la regresión del campo de Z con la amplitud media de la QS3. Las variables están estandarizados de manera que los valores en la figura representan el cambio típico en el campo de Z relacionado con el aumento de la amplitud media de la QS3 en 1 desvío estándar. Existe mucha heterogeneidad en las características presentes en los distintos meses.

Enero tiene una señal importante al sur del Pacífico, donde se observa un tren de ondas originado al este de Nueva Zelanda, y al sur del Índico, donde hay un máximo de geopotencial. En febrero, la estructura se mantiene similar, pero con menor propagación meridional, una intensificación del anticiclón en Sudamérica y un debilitamiento del ubicado al sur del Índico. En marzo, está presente una QS3 con mínima variación meridional que ocupa todo el círculo de latitud entre 60°S y 45°S. Abril es similar a marzo, pero sin centros ciclónicos. En mayo, aparece nuevamente un tren de ondas con propagación meridional pero en vez de terminar al sur de Sudamérica, lo hace en el Mar de Weddell. Junio, al igual que marzo, presenta una estructura de QS3 zonal, pero menos definida y, consistente con el corrimiento de la fase observado en la Sección 4.4 (Figura 4.11), con los centros ciclónicos y anticiclónicos desplazados hacia el oeste.

Cuadro 4.5: Correlación entre QS3 y SAM - NO SE PUBLICA

month	p.value	estimate
1	0.4352	0.1454
2	0.3666	0.1679
3	0.1898	0.2419
4	0.8678	0.0312
5	0.6560	-0.0833
6	0.3847	-0.1618
7	0.0009	-0.5670
8	0.1330	-0.2759
9	0.1355	0.2742
10	0.0930	0.3070
11	0.5600	-0.1088
12	0.0225	0.4086

En julio, el patrón de QS3 se ve opacado por anomalías positiva de geopotencial en latitudes antárticas y negativas en latitudes medias. En la Figura 4.19 se muestran los mismos campos que en la Figura 4.18 pero en coordenadas polares para julio y diciembre. En esta proyección es fácil identificar el patrón similar al SAM negativo presente en julio y el SAM positivo presente en diciembre. En efecto, la correlación entre el índice SAM y la amplitud media de la QS3 es -0.57 (p -valor $\sim 9 \times 10^{-4}$) para julio y 0.41 (p -valor ~ 0.0225) para diciembre¹. Estos dos meses son los únicos con una relación significativa con al menos 95% de confianza.

Volviendo a la Figura 4.18, agosto muestra una estructura de QS3 zonal salvo en la región de Sudamérica, donde el centro anticiclónico esperado a partir de una QS3 se encuentra a mayor latitud, sobre la Península Antártica. Septiembre muestra un tren de ondas similar al de enero pero con una conexión clara entre las anomalías sobre Sudamérica y las del sur del Índico. En octubre, el patrón de QS3 se ve claramente en los máximos de Z, pero no tanto en los mínimos y el tren de ondas Pacífico-Atlántico

¹Correlación de Pearson, tests a dos colas

con signo invertido (cyclón sobre Sudamérica). El campo de noviembre es muy similar al de abril; hay indicios de un tren de ondas proveniente del sur de Australia hacia Sudamérica. Finalmente, en diciembre se tiene un patrón similar a enero pero modificado por la señal de la SAM positiva detectada en el párrafo anterior.

4.7.2 Función Corriente

En la Figura 4.20 se muestra la anomalía zonal de la regresión de ψ con la amplitud media de la QS3 junto con los flujos de actividad de onda calculados a partir del mismo. A partir de la misma se puede confirmar la existencia de los trenes de onda identificados en la Figura 4.18 y ampliar el análisis a los trópicos. En mayo, por ejemplo, aparece claramente una fuente de actividad de onda sobre Indonesia que genera un flujo hacia el sur de Sudamérica y otro hacia el Pacífico central.

4.8 Composición de campos.

Me parece que toda esta sección está de más. La composición de campos no suma nada por encima de la regresión. Dan los mismos campos e incluso la discusión sobre la fase que no coincide ya lo escribí en la Sección 4.4. Quizás se le puede sacar algo de jugo a mostrar los casos individuales, pero por ahora lo salteo.

Descripción de la selección.

Cosas para ver:

Años con coincidencia, años sin coincidencia. Meses donde la fase coincide (julio) vs meses donde no coincide (septiembre). También, años donde hay seguidilla de meses seleccionados (1999). Aunque posiblemente sea casualidad (no hay mucha persistencia mes a mes.)

Pequeña digresión: Efecto de la fase.

La climatología de la fase se va a discutir más adelante, pero... discutir el efecto de promediar campos con similar amplitud pero fase distinta. Del gráfico, septiembre tiene 1997 y 2003 con fase a 180° , lo que significa que va a haber cancelación parcial. Enero, por el contrario, no tiene ningún año en contrafase, aunque sí algunos a 90° , que desdibujan el patrón.

Cosas para ver:

Ambos criterios coinciden en casi todos los años seleccionados, así que no hay mucha diferencia. En efecto, las composiciones son casi iguales (no se muestra). Voy a usar la amplitud.

Estos gráficos me parecen importantes para ver lo que hay “adentro” de la composición, pero no sé bien qué decir sobre ellos. Supongo que lo principal es que hay años donde la onda

4.9 Fuentes de variabilidad interna

(Discusión escrita más de papers), Pero nos concentraremos en la fuente externa.

4.10 Fuentes externas

4.10.1 SST

En la Figura 4.26 se muestra la regresión de SST sobre la amplitud de la QS3 con las regiones con p-valor nominalmente menor a 0.01^2 marcadas con líneas negras. Los valores son casi nulos o sin significancia en todos los meses y los pocos patrones observados no son estables. Existe una señal en el pacífico ecuatorial en febrero, mayor, septiembre, noviembre y diciembre (invertida en estos últimos dos) pero no alcanza significancia estadística en ningún caso. Diciembre es el mes con más áreas con señal importante, indicando que la QS3 durante este mes podría estar asociada con aguas frías en el Pacífico sur y el Atlántico ecuatorial, y cálidas en el Atlántico sur.

Existen algunas correspondencias entre este patrón de SST de la Figura 4.26 y las regresiones de ψ de la Figura 4.18. Las regiones de aguas frías en el Pacífico sur presentes en agosto y diciembre coinciden con centros ciclónicos (máximos de ψ). La región de agua caliente en el pacífico central en febrero podría ser la fuente de los trenes de ondas originados al sur de la misma a partir de la generación de convección anómala de forma similar al máximo de SST en mayo en la costa este de Australia, o en enero al sur del Índico.

La regresión de la amplitud de QS3 con radiación saliente de onda larga (OLR) se muestra en la Figura 4.27 donde valores negativos (colores rojos) indican convección anómala intensificada y viceversa. El mes con mayor señal es febrero, con convección intensa en el Pacífico central e inhibida en el Pacífico occidental. Este patrón tipo El Niño coincide con la regresión en SST (Figura 4.26) y es similar al que se observa en mayo y septiembre, aunque en éstos es menos intenso. El agua ecuatorial fría de diciembre, en cambio, tiene su correlato en una convección inhibida en el pacífico central e intensificada en Indonesia, asemejándose a un patrón tipo La Niña.

La consistencia física entre las regresiones de SST y OLR no deberían ser indicio de robustez ya que la correlación negativa entre ambas variables en la región del Pacífico ecuatorial implica que no son variables independientes. La falta de significancia estadística parece mostrar que la señal de la SST sobre la QS3, de existir, es menor a la que puede detectarse con estos datos y esta metodología.

²Notar que se trata de un p-valor nominal sin tener en cuenta problemas de multiplicidad o autocorrelación

Capítulo 5

Experimentos

5.1 Validación SPEEDY

Para la validación de SPEEDY con respecto a NCEP se muestran los niveles de 200hPa y 500hPa como representación de niveles altos y medios respectivamente. Las conclusiones no cambian sustancialmente en el resto de los niveles.

Una primer gran limitación de SPEEDY es su pobre representación de la estratosfera. Sólo el más alto de sus 8 niveles está en la estatosfera (30hPa) y al ser la *tapa* del modelo, que tiene una “esponja” para evitar la propagación de ondas de gravedad (??), no es un nivel con información confiable.

5.1.1 Altura Geopotencial

Anomalía

El campo medio de geopotencial está bien representado en el modelo (no se muestra) mientras que las mayores diferencias se encuentran en el campo de anomalías zonales. El mismo se muestra en la Figura 5.1 donde en sombreado se muestra el campo de SPEEDY y en contornos el correspondiente a NCEP (convención que se mantendrá en el resto de las figuras de validación). Speedy representa correctamente la estructura aproximadamente barotrópica equivalente de las anomalías zonales. Reproduce el patrón de QS1 y su intensificación en invierno, aunque en verano es demasiado débil y en invierno demasiado intenso. Por ejemplo, en primavera el máximo de Z en 500hPa en 60°S supera los 120mpg en SPEEDY mientras que en NCEP no llega a 80mpg.

Si bien la ubicación de los máximos y mínimos de Z en SPEEDY es aproximadamente la correcta no logra capturar parte de la estructura fina. En 500hPa durante otoño, invierno y primavera, SPEEDY presenta un sólo máximo en 120°O a pesar de que NCEP tiene dos máximos identificables con ciclos anuales independientes.

En la Figura 5.2 se muestra la diferencia entre el campo de Z* de NCEP y SPEEDY. En verano y otoño la principal diferencia radica en que NCEP muestra una alta más intensa de la QS1 al norte de 60°S. En invierno y primavera se observa un tren de ondas con propagación meridional que une el Índico con el Atlántico con número de onda planetaria 3. Un tren de ondas similar fue identificado en las observaciones en la ???. Su aparición al hacer la resta NCEP - SPEEDY indica que el mismo no está presente en la corrida Control.

En la Figura 5.3 se muestra el corte de Z^* en 60°S . Se evidencia la falta de inclinación de las anomalías zonales de SPEEDY, las cuales son mucho más barotrópicas que en las observaciones. Esto indica que la QS1 en SPEEDY no está asociada a transporte de calor hacia el polo, por lo que es de esperarse que los términos en la ecuación de balance de energía tengan distinta magnitud relativa.

entiende bien
ro decir

5.1.2 Temperatura

En la Figura 5.4 se muestra el campo total de temperatura de SPEEDY en sombreado y NCEP en líneas. En 850hPa y 500hPa, ambos campos son muy similares, tanto en el gradiente meridional como en las anomalías zonales (que se muestran mejor en la ??). En niveles altos (200hPa) las simulación control diverge considerablemente de las observaciones. En verano y en otoño, SPEEDY muestra un gradiente meridional mucho más importante que NCEP y en invierno y primavera el gradiente máximo se da entre 30°S y 45°S para SPEEDY, y en 60°S en NCEP.

En cuanto a las anomalías zonales (Figura 5.5), éstas coinciden en niveles bajos, donde la influencia superficial es importante, pero divergen en altura. En 500hPa, las anomalías Antárticas de SPEEDY coinciden aproximadamente en ubicación con las de NCEP aunque son ligeramente más débiles en invierno y primavera. En 60°S , en verano hay buena coincidencia, pero entre otoño e invierno la QS1 observada en esas latitudes virtualmente desaparece en SPEEDY mientras que en primavera vuelve a crecer incluso con mayor intensidad que en NCEP. En 200hPa, SPEEDY carece casi totalmente de anomalías zonales significativas al sur de los 45°S durante todo el año a diferencia de NCEP, que muestra una estructura de QS1 bien definida con máxima amplitud en primavera. Al norte de esa latitud las anomalías de SPEEDY coinciden mejor con NCEP.

5.1.3 Viento zonal

En la Figura 5.6 se muestra el viento zonal para SPEEDY y NCEP. El jet subtropical se encuentra más al norte y ligeramente más elevado en verano, así como considerablemente más intenso en todas las estaciones. La principal discrepancia se da en altura. Por encima de los 30hPa, SPEEDY carece de niveles verticales y aún por debajo no logra desarrollar un jet polar. En invierno y primavera hay un aumento del viento zonal con la altura en latitudes donde debería estar el jet, pero no llega a formar un máximo ni alcanza las magnitudes observadas en NCEP. Esta falta de niveles verticales también se observa en los estes ecuatoriales de menor magnitud en verano y otoño.

Dada la importancia del jet polar en la dinámica atmosférica durante los meses de invierno y primavera, su mala representación es una limitación muy importante del modelo SPEEDY.

Cosas para ver:

Jet polar en invierno y primavera en niveles altos ($< 100 \text{ hPa}$). Jet subtropical en niveles “medios”.

5.1.4 Gradiente meridional de vorticidad absoluta

Comparando con la figura Figura 3.15 (nivel de 200hPa), se ve que la franja de máximo gradiente presente en todas las estaciones es más zonal en el caso de SPEEDY y corrida hacia el sur en verano. La región de gradientes negativos que se desarrolla en invierno sobre Nueva Zelanda tiene menor extensión y no aparece en otoño ni primavera.

En la Figura 5.10 se muestra un corte meridional del número de onda estacionario en 180° . En verano no hay regiones prohibidas en ningún modelo, pero la región entre 45°S y 60°S aparece como un mínimo en SPEEDY y un máximo en NCEP. Esto implica que la propagación meridional inhibida para un amplio rango de números de onda en SPEEDY pero no en NCEP. En particular, la QS3 puede propagarse meridionalmente en las observaciones, pero no en el modelo. En otoño la situación es inversa: al rededor de 40°S , NCEP muestra una región con número de onda estacionario imaginario, impidiendo la propagación meridional, mientras que en SPEEDY no existe tan impedimento. La QS3 nuevamente se ve afectada, teniendo propagación meridional irrestricta al norte de 60°S en SPEEDY pero quedando atrapada al sur de 50°S en las observaciones. En invierno y primavera la concordancia entre SPEEDY y NCEP es mayor.

5.1.5 Función corriente

La función corriente en 200hPa de SPEEDY se muestra en la Figura 5.11 (donde el sombreado corresponde a la anomalía zonal y las flechas a los flujos de actividad de onda) en comparación con los mismos campos de NCEP (Figura 3.14; notar que en NCEP está en coordenadas σ) existe una correspondencia general buena en los trópicos. La localización de los máximos y mínimos coincide en aproximadamente en todas las estaciones. En verano y primavera no aparece la alta de Bolivia relacionada con el SAMS, pero sí la baja del noroeste. La intensidad de las anomalías es menor en todas las estaciones, especialmente en el HN. Consecuentemente, también tienen menor magnitud los flujos de actividad de onda

5.1.6 Onda 3

En la Figura 5.12 se muestra la amplitud de la QS3 media para SPEEDY en contornos y NCEP en líneas. En verano, entre 45°S y 60°S SPEEDY coincide con NCEP en la localización y extensión del máximo, pero subestima la intensidad. El máximo secundario en latitudes bajas aparece más al sur y en un nivel más alto en SPEEDY. En otoño, SPEEDY carece casi por completo de señal de QS3 en comparación con NCEP. Si se calcula la amplitud media de la QS3 SPEEDY sí tiene una señal importante (no se muestra), indicando que la diferencia con NCEP se debe no a la falta de una onda 3, sino a su característica no estacionaria. En invierno, la amplitud de la QS3 media está subestimada en SPEEDY y corriente hacia el polo. Además, está mucho más restringida a niveles troposféricos en comparación con NCEP; posiblemente como consecuencia de la falta de niveles verticales y la mala representación del jet polar. En primavera, por el contrario, la señal en SPEEDY es considerablemente mayor que en NCEP.

La QS3 reconstruida para SPEEDY se muestra en la Figura 5.13 donde además de confirmarse la variación de la amplitud prevista a partir de la ??, se puede apreciar la estructura horizontal. En verano, invierno y primavera, la inclinación de los centros es hacia el este, contraria a las observaciones e indicando transporte de cantidad de movimiento zonal hacia el norte en vez de hacia el sur. En otoño, por supuesto, el campo de QS3 de SPEEDY es virtualmente nulo.

5.2 Comparación entre corridas

Como se vio en la sección XX, además de la corrida Control, se realizaron 3 corridas para evaluar la sensibilidad de la QS3 a distintos parámetros del modelo. **NOLAND** es idéntica a **Control** a

excepción de que se desactivaron los modelos de mar, hielo y tierra y se reemplazó la SST por su media climatológica mensual. **SSTZONAL** es similar, pero la SST fue reemplazada por su media zonal mensual.

5.2.1 Altura geopotencial

Los campos de Z^* en 200hPa para cada corrida se muestra en la Figura 5.14. La corrida NOLAND no presenta diferencias obvias con respecto a Control. SSTZONAL en cambio, muestra una clara disminución de las anomalías zonales. Todas las corridas presentan una QS1 en altas latitudes con máximo en invierno pero su intensidad es notablemente menor en SSTZONAL en comparación a las otras dos. La QS1 en latitudes polares, en cambio, mantiene su amplitud en todas las corridas.

La figura Figura 5.15 muestra la diferencia entre Z^* de la corrida Control y las corridas de sensibilidad. NOLAND sólo muestra cambios significativos en invierno y primavera, donde la diferencia es un tren de ondas de propagación meridional muy similar al observado en la Figura 5.2 y presente en las observaciones (??). Es decir que a pesar de que la corrida Control carece del mismo, éste se desarrolla correctamente si se elimina la variabilidad de la temperatura superficial y su interacción con la atmósfera.

La diferencia entre SSTZONAL y Control se da principalmente entre 45°S y 60°S y responde a la casi desaparición de la QS1 en esas latitudes. Estos resultados son consistentes con los de Quintanar y Mechoso (1995b) dado que la eliminación de las anomalías zonales reduciría la convección anómala que genera los trenes de onda que ellos concluyeron son el principal sostén de este patrón. En invierno y primavera, está presente el tren de ondas observado en NOLAND - Control, pero con menor amplitud. Esto quizás se deba a que éste se encuentra enmascarado por los otros cambios.

5.2.2 Temperatura

La ?? presenta la diferencia de temperatura en 850hPa entre las corridas. Para NOLAND, las únicas diferencias se dan en la Antártida en verano e invierno, donde ésta simula temperaturas menores y mayores respectivamente. Al no tener un suelo que interactúa con el aire, es posible???

SSTZONAL tiene las mismas diferencias que NOLAND en la Antártida, a la que se le suman diferencias en latitud más bajas a causa de la eliminación de los contrastes zonales de SST. Durante todo el año hay temperaturas mayores en la costa este del Pacífico y menores en la oeste, indicando una situación tipo Niño que, en realidad representan la desaparición de la lengua fría al este y la pileta de agua caliente al oeste.

5.2.3 Viento zonal

La diferencia del viento meridional entre corridas se muestra en la Figura 5.17. NOLAND - Control casi nulas diferencias en otoño. En verano NOLAND tiene vientos más intensos al norte y sur de Nueva Zelanda y menos intensos sobre ésta región, indicando una intensificación de los bloqueos con respecto a la corrida Control; el mismo patrón se observa en primavera. En invierno y primavera hay valores positivos en latitudes bajas indicando un debilitamiento de los alisios.

En SSTZONAL el patrón de aumento de los bloqueos se ve intensificado. En otoño, invierno y primavera se observan franjas de valores negativos al sur de 30° y positivos al norte, indicando que el jet se

encuentra desplazado hacia el norte. En las regiones ecuatoriales, los alisios son más intensos durante todo el año, lo cual resulta paradójico dada la estructura tipo Niño observada en la ??.

5.2.4 Función corriente

En la Figura 5.18 se muestra la anomalía zonal de la función corriente para cada corrida y los flujos de acción de onda. La misma es consistente con las observaciones generales de la Figura 5.14. Para todos los meses las anomalías en SSTZONAL son muy menores que las otras dos corridas y los flujos de actividad de onda son casi nulos en el HS y menores que las otras dos corridas en los trópicos del HN. La persistencia de las anomalías en el HN en comparación con el HS sugiere que el forzante principal de estos patrones de onda es el orográfico, ya que éste es el único forzante zonalmente asimétrico en SSTZONAL.

Para la corrida NOLAND, las diferencias son mínimas en verano y otoño. En invierno y primavera se observan anomalías más intensas al rededor de 30° y los flujos de acción de onda que son más hacia el sur al rededor de 60°E en comparación a la corrida Control. Nuevamente, esto es consistente con lo visto en la Figura 5.15 donde en NOLAND aparecía el tren de ondas desde el Índico hacia el pacífico que estaba ausente en la corrida Control.

La diferencia de la anomalía zonal función corriente y de los flujos de acción de onda entre las corridas se muestra en la ???. Las diferencias indicadas en los párrafos anteriores se muestran con más claridad.

Esto es medio poco y podría borrarse. No sé.

5.2.5 Onda 3

En la Figura 5.20 se muestra la amplitud de la QS3 para cada estación y cada corrida. En verano se observa una reducción de la señal de la QS3 en 60°S entre Control, NOLAND y SSTZONAL además de un ligero corrimiento hacia el sur. La señal de más al norte, en cambio, no presenta cambios importantes más allá del mismo corrimiento que la señal anterior. En otoño la poca señal existente en Control prácticamente desaparece en en SSTZONAL, pero no hay cambios en NOLAND. En SSTZONAL hay un aumento de la amplitud de la QS3 en la costa antártica.

En invierno, NOLAND tiene la mayor señal de QS3 entre las simulaciones y Control, la mínima. Esto posiblemente se deba a la aparición del tren de ondas desde el Índico identificado en la Figura 5.15. Primavera es la estación con el cambio más dramático. Pasa de tener la señal más alta en la Corrida control a tener una de las menores en NOLAND y SSTZONAL. La amplitud de la QS3 en 60°S y 300hPa desaparece prácticamente en su totalidad

de nuevo las diferencias no muestran nada distinto que no se vea en los campos. Quizás lo saco.

Es importante notar que estas observaciones son sensibles a la metodología utilizada. La Figura 5.22 muestra la amplitud media de la QS3 para cada corrida y es útil compararla con la Figura 5.20 (que muestra la amplitud de la QS3 media). Verano se comporta de manera similar, con una ligera disminución de la señal en NOLAND y SSTZONAL.

Otoño tiene un gran cambio. Tanto la corrida Control como NOLAND y SSTZONAL tienen una señal fuerte que no cambia significativamente entre corridas. Esto indica que la baja señal en otoño en SPEEDY tiene es causada por que la onda 3 está presente mes a mes, pero no estacionariamente. Lo mismo parece suceder invierno de la corrida Control y primavera de NOLAND y SSTZONAL.

Para profundizar en esta observación, la Figura 5.23 muestra el desvío estándar de la fase media mensual para cada estación y corrida. Si se asume distribución normal, aproximadamente el 95% de los datos están en un rango de $\pm 2\sigma$ al rededor de la media. Como la fase está acotada entre 0° y 120° , valores de σ por encima de 30° implica que los datos están distribuidos casi uniformemente en todo el dominio.

En verano, el desvío es mínimo y aumenta ligeramente en NOLAND y SSTZONAL pero siempre por debajo de los 30° . En otoño, todas las corridas muestran valores altos muy por encima de los 30° , indicando que hay muy poca estacionaridad en todas las corridas. En invierno, la corrida Control está en el límite de los 30° y NOLAND y SSTZONAL tienen valores menores. En primavera, la corrida Control tiene valores mínimos de σ mientras que NOLAND y SSTZONAL presentan valores muy altos, por encima de los 30° . Estos valores son consistentes con lo observado en la comparación de las figuras 5.21 y ?? y sugieren que las diferencias observadas entre las corridas en la señal de la QS3 se deben principalmente a mayor o menor estacionaridad y no a una mayor o menor amplitud de las onda planetaria 3.

En la Figura 5.24, se muestra el ciclo anual de la amplitud de la onda 3 para cada corrida. La amplitud media en ningún mes presenta cambios significativos entre los modelos, dando más peso a la hipótesis de que los cambios observados en la señal de la QS3 se deben a cambios en la variabilidad de la fase.

5.2.6 Regresiones

hasta acá

5.3 Cosas inesperadas...

me dio neumonía. :(

- ??
- protif!

Capítulo 6

Conclusiones

Capítulo 7

Agradecimientos

Referencias

- Berbery, E H, J Nogués-Paegle, y J D Horel. 1992. «Wavelike southern hemisphere extratropical teleconnections». doi:DOI: 10.1175/1520-0469(1992)049<0155:WSHET>2.0.CO;2.
- Court, Arnold. 1942. «Tropopause Disappearance During the Antarctic Winter». *Bulletin of the American Meteorological Society* 23 (5). American Meteorological Society: 220-38. doi:10.2307/26255916.
- James, I. N. 1994. *Introduction to circulating atmospheres*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511622977.
- Karoly, David J. 1985. «An atmospheric climatology of the Southern Hemisphere based on ten years of daily numerical analyses(1972-82). II- Standing wave climatology». *Australian Meteorological Magazine* 33 (3): 105-16.
- Loon, Harry van, y L. Jenne, Roy. 1972. «The Zonal Harmonic Standing Waves in the Southern Hemisphe». *Journal of Geophysical Research* 77 (6): 992-1003.
- Mo, Kingtse C., y Glenn H. White. 1985. «Teleconnections in the Southern Hemisphere». doi:10.1175/1520-0493(1985)113<0022:TITSH>2.0.CO;2.
- Quintanar, Arturo I., y Carlos R. Mechoso. 1995a. «Quasi-stationary waves in the Southern Hemisphere. Part I: observational data». doi:10.1175/1520-0442(1995)008<2659:QSWITS>2.0.CO;2.
- . 1995b. «Quasi-Stationary Waves in the Southern Hemisphere. Part II: Generation Mechanisms». *Journal of Climate* 8 (11): 2673-90. doi:10.1175/1520-0442(1995)008<2673:QSWITS>2.0.CO;2.
- Trenberth, Kevin E., y K. C. Mo. 1985. «Blocking in the Southern Hemisphere». doi:10.1175/1520-0493(1985)113<0003:BITSH>2.0.CO;2.
- Vera, Carolina, W. Higgins, J. Amador, T. Ambrizzi, R. Garreaud, D. Gochis, D. Gutzler, et al. 2006. «Toward a unified view of the American monsoon systems». *Journal of Climate* 19 (20): 4977-5000. doi:10.1175/JCLI3896.1.
- Vera, Carolina, Gabriel Silvestri, Vicente Barros, y Andrea Carril. 2004. «Differences in El Niño response over the Southern Hemisphere». *Journal of Climate* 17 (9): 1741-53. doi:10.1175/1520-0442(2004)017<1741:DIENRO>2.0.CO;2.
- Zängl, G. 2001. «The tropopause in the polar regions». *Journal of Climate* 14 (14): 3117-39. doi:10.1175/1520-0442(2001)014<3117:TTITPR>2.0.CO;2.

Índice de figuras

2.1	Ejemplo fourier - fig:fourier-ejemplo	41
2.2	Wavelets - fig:wavelet-ejemplo	41
3.1	Campo de Z (NCEP) - fig:gh-ncep	42
3.2	Desvío estándar por círculo de latitud. - fig:sd-gh-ncep	43
3.3	Anomalía zonal de altura geopotencial. - fig:ghz-ncep	44
3.4	Corte zonal de anomalía de geopotencial en -60°. - fig:ghz-ncep-corte60	45
3.5	Temperatura media. - fig:t-ncep	46
3.6	Corte meridional de temperatura media. - fig:t-ncep-corte	47
3.7	Anomalía zonal de temperatura. - fig:tz-ncep	48
3.8	Corte zonal de anomalía de temperatura en -60°. - fig:t-ncep-corte60	49
3.9	Viento zonal medio. - fig:u-ncep-corte	49
3.10	Viento zonal. - fig:u-ncep	50
3.11	Anomalía zonal de viento zonal. - fig:uz-ncep	51
3.12	Media zonal del viento meridional. - fig:v-ncep-corte	52
3.13	Viento meridional medio. - fig:v-ncep	53
3.14	Función corriente x 1099 - fig:psi-ncep	55
3.15	Gradiente meridional de vorticidad absoluta * 1e11 - fig:etady-ncep	56
3.16	Número de onda estacionario en 200hPa. - fig:ks-ncep	57
3.17	R^2 de fourier. - fig:r2-ncep	58
3.18	Amplitud de fourier. - fig:ampl-ncep	59
4.1	Media de reconstrucción de onda 3. - fig:qs3-ncep	60
4.2	Corte - fig:qs3-ncep-corte	60
4.3	Desvío estándar de la reconstrucción de QS3. Se incluyen en negro, contornos que describen la posición de los centros de las perturbaciones. - fig:qs3sd-ncep	61
4.4	Amplitud de wavelets (sombreados) y de fourier (contornos) - fig:wavelet-fourier-ncep	61
4.5	Campo medio de la amplitud de la onda 3 según wavelets (contornos) y su anomalía zonal (sombreado) en 300hPa. - fig:waveletz-ncep	62
4.6	Corte zonal en -60° de la amplitud media de la onda 3 según wavelets (contornos) y su anomalía zonal (sombreado). - fig:wavelet-ncep-corte	63
4.7	Distribución de amplitud para 12 fechas. En rojo la amplitud máxima, en azul la amplitud media. - fig:ampl-max-mean	64
4.8	Anomalía zonal geopotencial en 300hPa para fechas seleccionadas. - fig:ghz-ncep-select	64
4.9	Correlación entre amplitud máxima y media. - fig:cor-mean-max	65
4.10	Amplitud media - fig:ampl-ts	66
4.11	Ciclo anual de la fase (20 mayores amplitudes para cada mes) - fig:fase-boxplot	67
4.12	Primeras dos componentes principales del campo de QS3 - fig:eof	68
4.13	Valor medio de las dos primeras componentes principales del campo de QS3 - fig:pc1-pc2	68
4.14	Media de reconstrucción de onda 3 en 300hPa - fig:qs3-qssseason-ncep	69
4.15	Corte - fig:qs3-qssseason-ncep-corte	69
4.16	Correlación lageada para cada mes con los 12 siguientes. - fig:lag-cor	70
4.17	Correlación cuadrada media para estaciones según onda3. - fig:cor-campo	70
4.18	Regresión sobre amplitud. - fig:regr-gh-ncep	71
4.19	Igual que figura XX, pero en proyección polar para julio y septiembre. - fig:regr-gh-polar	72
4.20	Regresión de Psi con la amplitud (anomalía zonal). - fig:regr-psi-ncep	73
4.21	Tabla de selección - fig:seleccion-tabla	74
4.22	Tabla de interacción - fig:interaccion-tabla	75

4.23 Composición de campos - fig:gh-comp	76
4.24 Campos para los 10 eneros seleccionados. - fig:gh-qs3-select-ene	77
4.25 Campos para los 10 septiembre seleccionados. - fig:gh-qs3-select-sep	78
4.26 Regresión de SST con la amplitud de la onda 3 - fig:regr-sst-ncep	79
4.27 Regresión de QS3 con OLR - fig:regr-olr-ncep	80
5.1 Anomalía zonal de altura geopotencial (speedy sombreado, ncep contornos) - fig:ghz-sp-nc	81
5.2 Diferencia entre speedy y ncep - fig:ghz-dif-sp-nc	82
5.3 Corte zonal de anomalía de geopotencial en -60° (speedy sombreado, ncep contornos). - fig:ghz-sp-nc-corte60	83
5.4 Temperatura - fig:t-nc-sp	84
5.5 T* - fig:tz-sp-nc	85
5.6 Viento zonal medio (speedy contornos, ncep sombreado). - fig:u-sp-nc-corte	85
5.7 Viento zonal (contornos ncep, sombreado speedy). - fig:u-sp-nc	86
5.8 Diferencia entre ncep y speedy en viento zonal - fig:u-dif-sp-nc	87
5.9 Gradiente meridional de vorticidad absoluta (speedy). - fig:etady-sp-nc	88
5.10 Número de onda estacionario medio por círculo de latitud. - fig:ks-sp-nc-corte	89
5.11 Función corriente x 1099 - fig:psi-sp	90
5.12 Amplitud de fourier (speedy en sombreado, ncep en contornos). - fig:ampl-sp-nc	91
5.13 Media de reconstrucción de onda 3 (sombreado speedy, contornos ncep) - fig:qs3-sp-nc	91
5.14 Anomalía zonal de altura geopotencial. - fig:ghz-sp-runs	92
5.15 Diferencia Corrida - control para Z* - fig:ghz-dif-sp-runs	93
5.16 Diferencia Control - corrida para T - fig:tz-dif-sp-runs	94
5.17 Diferencia control - corrida para U. - fig:u-dif-sp-runs	95
5.18 Anomalía zonal de función corriente y flujos de acción de onda. - fig:psi-sp-runs	96
5.19 Diferencia en psi.z y flujos de acción de onda. - fig:psiz-dif-sp-runs	97
5.20 Amplitud de la onda 3 media para cada corrida. - fig:ampl-sp-runs	97
5.21 Diferencia de amplitud entre la corrida control y cada corrida. - fig:ampl-dif-sp-runs .	97
5.22 Amplitud media de la onda 3 mensual para cada corrida. - fig:ampl-mean-sp-runs . .	98
5.23 Desvío estándar (en grados) de la fase media mensual para cada estación y cada corrida. - fig:sd-fase-sp-runs	98
5.24 Ciclo anual de amplitud de onda 3. - fig:index-sp-boxplot	98




Figura 2.1: Ejemplo fourier - fig:fourier-ejemplo




Figura 2.2: Wavelets - fig:wavelet-ejemplo




Figura 3.1: Campo de Z (NCEP) - fig:gh-ncep




Figura 3.2: Desvío estándar por círculo de latitud. - fig:sd-gh-ncep




Figura 3.3: Anomalía zonal de altura geopotencial. - fig:ghz-ncep




Figura 3.4: Corte zonal de anomalía de geopotencial en -60° . - fig:ghz-ncep-corte60




Figura 3.5: Temperatura media. - fig:t-ncep




Figura 3.6: Corte meridional de temperatura media. - fig:t-ncep-corte




Figura 3.7: Anomalía zonal de temperatura. - fig:tz-ncep




Figura 3.8: Corte zonal de anomalía de temperatura en -60° . - fig:t-ncep-corte60




Figura 3.9: Viento zonal medio. - fig:u-ncep-corte




Figura 3.10: Viento zonal. - fig:u-ncep




Figura 3.11: Anomalía zonal de viento zonal. - fig:uz-ncep




Figura 3.12: Media zonal del viento meridional. - fig:v-ncep-corte




Figura 3.13: Viento meridional medio. - fig:v-ncep

3.1 Función corriente




Figura 3.14: Función corriente x 1099 - fig:psi-ncep




Figura 3.15: Gradiante meridional de vorticidad absoluta * 1e11 - fig:etady-ncep




Figura 3.16: Número de onda estacionario en 200hPa. - fig:ks-ncep




Figura 3.17: R^2 de fourier. - fig:r2-ncep




Figura 3.18: Amplitud de fourier. - fig:ampl-ncep




Figura 4.1: Media de reconstrucción de onda 3. - fig:qs3-ncep




Figura 4.2: Corte - fig:qs3-ncep-corte




Figura 4.3: Desvío estándar de la reconstrucción de QS3. Se incluyen en negro, contornos que describen la posición de los centros de las perturbaciones. - fig:qs3sd-ncep






Figura 4.4: Amplitud de wavelets (sombreados) y de fourier (contornos) - fig:wavelet-fourier-ncep



3.1. FUNCIÓN CORRIENTE




Figura 4.6: Corte zonal en -60° de la amplitud media de la onda 3 según wavelets (contornos) y su anomalía zonal (sombreado). - fig:wavelet-ncep-corte




Figura 4.7: Distribuci n de amplitud para 12 fechas. En rojo la amplitud m xima, en azul la amplitud media. - fig:ampl-max-mean




Figura 4.8: Anomal a zonal geopotencial en 300hPa para fechas seleccionadas. - fig:ghz-ncep-select




Figura 4.9: Correlación entre amplitud máxima y media. - fig:cor-mean-max




Figura 4.10: Amplitud media - fig:ampl-ts




Figura 4.11: Ciclo anual de la fase (20 mayores amplitudes para cada mes) - fig:fase-boxplot




Figura 4.12: Primeras dos componentes principales del campo de QS3 - fig: eof




Figura 4.13: Valor medio de las dos primeras componentes principales del campo de QS3 - fig:pc1-pc2




Figura 4.14: Media de reconstrucción de onda 3 en 300hPa - fig:qs3-qssseason-ncep




Figura 4.15: Corte - fig:qs3-qssseason-ncep-corte




Figura 4.16: Correlación lageada para cada mes con los 12 siguientes. - fig:lag-cor




Figura 4.17: Correlación cuadrada media para estaciones según onda3. - fig:cor-campo




Figura 4.18: Regresión sobre amplitud. - fig:regr-gh-ncep




Figura 4.19: Igual que figura XX, pero en proyección polar para julio y septiembre. - fig:regr-gh-polar





Figura 4.20: Regresión de Psi con la amplitud (anomalía zonal). - fig:regr-psi-ncep






Figura 4.22: Tabla de interacción - fig:interaccion-tabla




Figura 4.23: Composición de campos - fig:gh-comp




Figura 4.24: Campos para los 10 eneros seleccionados. - fig:gh-qs3-select-ene




Figura 4.25: Campos para los 10 septiembre seleccionados. - fig:gh-qs3-select-sep




Figura 4.26: Regresión de SST con la amplitud de la onda 3 - fig:regr-sst-ncep




Figura 4.27: Regresión de QS3 con OLR - fig:regr-olr-ncep




Figura 5.1: Anomalía zonal de altura geopotencial (speedy sombreado, ncep contornos) - fig:ghz-sp-nc




Figura 5.2: Diferencia entre speedy y ncep - fig:ghz-dif-sp-nc




Figura 5.3: Corte zonal de anomalía de geopotencial en -60° (speedy sombreado, ncep contornos). - fig:ghz-sp-nc-corte60




Figura 5.4: Temperatura - fig:t-nc-sp



Figura 5.5: T^* - fig:tz-sp-nc

Figura 5.6: Viento zonal medio (speedy contornos, ncep sombreado). - fig:u-sp-nc-corte




Figura 5.7: Viento zonal (contornos ncep, sombreado speedy). - fig:u-sp-nc




Figura 5.8: Diferencia entre ncep y speedy en viento zonal - fig:u-dif-sp-nc




Figura 5.9: Gradiente meridional de vorticidad absoluta (speedy). - fig:etady-sp-nc




Figura 5.10: Número de onda estacionario medio por círculo de latitud. - fig:ks-sp-nc-corte




Figura 5.11: Función corriente x 1099 - fig:psi-sp




Figura 5.12: Amplitud de fourier (speedy en sombreado, ncep en contornos). - fig:ampl-sp-nc




Figura 5.13: Media de reconstrucción de onda 3 (sombreado speedy, contornos ncep) - fig:qs3-sp-nc





Figura 5.14: Anomalía zonal de altura geopotencial. - fig;ghz-sp-runs

Figura 5.15: Diferencia Corrida - control para Z^* - fig:ghz-dif-sp-runs




Figura 5.16: Diferencia Control - corrida para T - fig:tz-dif-sp-runs




Figura 5.17: Diferencia control - corrida para U. - fig:u-dif-sp-runs




Figura 5.18: Anomalía zonal de función corriente y flujos de acción de onda. - fig:psi-sp-runs




Figura 5.19: Diferencia en psi.z y flujos de acción de onda. - fig:psiz-dif-sp-runs




Figura 5.20: Amplitud de la onda 3 media para cada corrida. - fig:ampl-sp-runs




Figura 5.21: Diferencia de amplitud entre la corrida control y cada corrida. - fig:ampl-dif-sp-runs




Figura 5.22: Amplitud media de la onda 3 mensual para cada corrida. - fig:ampl-mean-sp-runs




Figura 5.23: Desvío estándar (en grados) de la fase media mensual para cada estación y cada corrida. - fig:sd-fase-sp-runs




Figura 5.24: Ciclo anual de amplitud de onda 3. - fig:index-sp-boxplot