
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Laurea Magistrale in Fisica

Statistical Mechanics of Disordered Systems

Appunti del corso

A cura di

Elisabetta Agnello

Anno Accademico

2025/2026



github . com / elisabettagnello

Disclaimer

Il presente documento costituisce una raccolta di appunti personali presi durante le lezioni del corso di *Statistical Mechanics of Disordered Systems*.

Si prega di notare che questo materiale **non è stato sottoposto a una revisione sistematica** né è stato verificato dal docente. Pertanto, è possibile che siano presenti:

- Errori concettuali o imprecisioni tecniche;
- Refusi o errori di battitura;
- Parti incomplete o sezioni mancanti.

Questi appunti sono destinati esclusivamente come supporto allo studio e non sostituiscono in alcun modo il materiale didattico ufficiale. L'autore non si assume alcuna responsabilità per l'uso delle informazioni qui contenute.

Contatti e Segnalazioni

Per consultare l'archivio aggiornato, segnalare refusi o proporre integrazioni agli appunti, puoi utilizzare i seguenti canali:

 **Archivio Appunti:** elisabettagnello.github.io/elisabetta-physics-notes/

 **GitHub:** github.com/elisabettagnello

 **LinkedIn:** linkedin.com/in/elisabetta-agnello

 **Email:** agnelloe24@gmail.com

github . com / elisabettagnello

Indice

1	Lezione 1	1
1.1	Introduzione al Corso	1
1.2	Il Modello di Hopfield	1
1.2.1	Memoria Associativa e Punti Fissi	2
1.2.2	La Regola di Apprendimento di Hebb	3
1.2.3	Connessione con la Meccanica Statistica	3
1.2.4	Diagramma di Fase del Modello di Hopfield	4
1.3	Problemi di Soddisfacimento di Vincoli (CSP)	5
1.3.1	Il problema XORSAT	5
2	Lezione 2	9
2.1	Derivazione dell'Entropia di Shannon	9
2.2	Divergenza di Kullback-Leibler (DKL)	11
2.3	Somma di Variabili Aleatorie Indipendenti	12
2.3.1	Legge dei Grandi Numeri	12
2.3.2	Teorema Centrale del Limite(TLC)	12
2.3.3	Teoria delle Grandi Deviazioni	12
2.4	Probabilità di una Sequenza Empirica	15
3	Lezione 3	17
3.1	Funzione di Cramer per una Variabile Binaria	17
3.2	Introduzione alle Variabili Correlate	19
3.2.1	Entropia e Informazione Mutua	20
3.3	Il Modello di Ising	22
3.3.1	Il Modello di Ising Unidimensionale (1D)	22
3.3.2	Funzioni di Correlazione Spaziale	25
4	Lezione 4	27
4.1	Il Metodo della Matrice di Trasferimento	27
4.1.1	Teorema di Fluttuazione-Dissipazione	30
4.1.2	Autovettori e il Loro Significato Fisico	30
4.1.3	Funzione di Correlazione	31
5	Lezione 5	33
5.1	Metodo della Matrice di Trasferimento 1D	33
5.2	Modello di Curie-Weiss	34

6	Lezione 6	37
6.1	Modello di Curie-Weiss	37
6.1.1	Transizione del Primo Ordine	38
6.1.2	Transizione del Secondo Ordine	39
6.2	Stati Stabili, Metastabili e Instabili	40
6.3	Ciclo di Isteresi e Punti Spinodali	42
6.3.1	Criticità nei Punti Spinodali	43
6.3.2	Caratterizzazione Analitica dei Punti Spinodali	43
6.4	Punti Critici in una Transizione del Secondo Ordine	43
6.5	Criticità nel Modello XY	44
6.6	Modello 3-Spin	45
6.7	Modello di Potts	46
7	Lezione 7	47
7.1	Ergodicità e Dinamica dei Sistemi	47
7.1.1	Barriere Energetiche ed Entropiche	47
7.1.2	Modello a 3-Spin	48
7.1.3	Modello di Potts	48
7.1.4	Nucleazione in Sistemi a Taglia Finita	49
7.2	Sistemi Disordinati	50
7.2.1	La Frustrazione	50
7.2.2	Media Annealed e Quenched	51
8	Lezione 8	53
8.1	Modelli Ferromagnetici Diluiti	53
8.1.1	Diagramma di Fase	54
8.2	Disuguaglianze di Griffiths	55
8.2.1	Dimostrazione della Prima Disuguaglianza	55
8.2.2	Dimostrazione della Seconda Disuguaglianza: Positività delle Correlazioni Connesse	56
8.3	Bound sulla Temperatura Critica	57
8.3.1	Dimostrazione:	58
8.4	Criterio di Harris Generalizzato	61
9	Lezione 9	65
9.1	Generalizzazione del Criterio di Harris	65
9.1.1	Analisi della Stabilità	66
9.2	Fase di Griffiths e Zeri di Lee-Yang	67
9.2.1	Zeri di Lee-Yang	68
9.2.2	Singularità di Griffiths	69
9.2.3	Dinamica dei Sistemi Disordinati	71
10	Lezione 10	73
10.1	Lunghezza di Correlazione	73
10.1.1	Effetti di Taglia Finita	74
10.2	Dinamica di Glauber per Ising 1D	75
10.2.1	Dinamica della Correlazione Spaziale	75
10.3	Dinamica dei Difetti (Domain Walls)	78
10.3.1	Fallimento del Campo Medio e Pseudo-gap	79

10.4	Modello di Ginzburg-Landau Dipendente dal Tempo (TDGL)	81
11	Lezione 11	83
11.1	Coarsening e Aging	83
11.2	Modello $O(N)$ e Dinamica di Rilassamento	83
11.2.1	Funzioni di Correlazione e Lunghezza Dinamica	84
11.3	Dinamica nel Ferromagnete Diluito	87
11.3.1	Fase Paramagnetica ($T > T_c(p = 1)$)	87
11.3.2	Fase di Griffiths ($T < T_c(p = 1)$)	89

github . com / elisabettagnello

Lezione 1

Data: 01/10/2025

1.1 Introduzione al Corso

Questo corso si propone di illustrare cosa cambia in alcuni modelli fondamentali, che magari abbiamo già incontrato, quando vengono resi più complessi. Essendo un corso di meccanica statistica, il nostro punto di partenza sarà il **modello di Ising**, che rivedremo e risolveremo di nuovo per introdurre tecniche non convenzionali come la fisica del disordine. Su questo modello base andremo poi a costruire modelli più complicati, introducendo elementi di disordine.

Affronteremo concetti come le transizioni di fase, la rottura spontanea di simmetria, la metastabilità e la rottura dell'ergodicità, analizzandoli separatamente, poiché nei modelli che studieremo questi fenomeni possono avvenire in momenti e per motivi diversi. Partendo dal modello di Ising, introdurremo il disordine passando al modello di "random field", per poi dedicare l'intera seconda metà del corso agli **spin glass**.

Il corso si concentrerà sugli aspetti tecnici; impareremo a fare i conti con il metodo delle repliche e il metodo della cavità. L'obiettivo finale è quello di essere in grado di risolvere i sistemi più complicati che oggi sappiamo trattare: i sistemi disordinati su grafi arbitrari (grafi random), che hanno innumerevoli applicazioni.

1.2 Il Modello di Hopfield

Il modello di Hopfield rappresenta un esempio affascinante di applicazione della meccanica statistica a un campo completamente diverso, quello delle neuroscienze. Il modello è stato introdotto da John Hopfield, un fisico che si è interessato ai processi cognitivi dal punto di vista biologico, nel tentativo di modellizzare il meccanismo di propagazione dell'informazione all'interno del cervello nel modo più semplice possibile.

Modellizzazione del Neurone

Il primo passo consiste nel semplificare al massimo il comportamento di un neurone. L'attività di un neurone è caratterizzata fondamentalmente da due stati: uno stato in cui è a riposo ("dormiente") e uno stato in cui si attiva e rilascia un potenziale d'azione ("spara"). Per modellizzare questo comportamento, discretizziamo il sistema sia nello spazio (considerando N neuroni) sia nel tempo e associamo lo stato del neurone i al

tempo t a una variabile di spin, S_i^t , che può assumere due valori. Per convenzione, usiamo i valori ± 1 :

$$S_i^t \in \{-1, 1\} \quad (1.1)$$

dove $S_i^t = +1$ rappresenta lo stato in cui il neurone "spara" e $S_i^t = -1$ quello in cui "non spara".

Dinamica della Rete

Un neurone decide se sparare o meno in base ai segnali che riceve dagli altri neuroni a cui è connesso. In un modello a campo medio (fully connected), in cui ogni neurone interagisce con tutti gli altri, il segnale totale ricevuto dal neurone i al tempo t è dato dalla somma pesata degli stati di tutti gli altri neuroni:

$$\text{Segnale}_i^t = \sum_{j \neq i} J_{ij} S_j^t \quad (1.2)$$

I termini J_{ij} sono i **pesi sinaptici** e rappresentano l'intensità e la natura della connessione tra il neurone j e il neurone i . Queste connessioni possono essere di due tipi:

- **Eccitatorie** ($J_{ij} > 0$): se il neurone j spara, induce il neurone i a sparare.
- **Inibitorie** ($J_{ij} < 0$): se il neurone j spara, induce il neurone i a non sparare, depolarizzandolo.

La dinamica del sistema è definita da una semplice regola di aggiornamento. Lo stato del neurone i al tempo successivo, $t + 1$, è determinato dal segno del segnale totale che riceve. Se il segnale supera una soglia (che per semplicità poniamo a zero), il neurone sparerà; altrimenti, non sparerà. Matematicamente:

$$S_i^{t+1} = \text{sign} \left(\sum_{j \neq i} J_{ij} S_j^t \right) \quad (1.3)$$

Questa è una dinamica deterministica e parallela: dato uno stato iniziale della rete S^0 , l'evoluzione del sistema è completamente definita.

1.2.1 Memoria Associativa e Punti Fissi

L'evoluzione di uno stato S della rete può essere vista come una traiettoria nello spazio delle configurazioni: $S^0 \rightarrow S^1 \rightarrow S^2 \rightarrow \dots \rightarrow S^*$.

Uno stato S^* è un **punto fisso** della dinamica se, una volta raggiunto, il sistema non evolve più, ovvero viene mappato in se stesso dalla regola di aggiornamento.

Questo processo può essere interpretato, dal punto di vista neurofisiologico, come il **recupero di un ricordo**. Lo stato iniziale S^0 può essere pensato come l'input sensoriale che il cervello riceve. La successiva dinamica interna porta il sistema a convergere verso un punto fisso S^* , che rappresenta il concetto o il ricordo associato a quell'input. Questo è il motivo per cui il modello è detto di **memoria associativa**: stati iniziali diversi, purché sufficientemente simili a un ricordo immagazzinato, convergono allo stesso punto fisso.

1.2.2 La Regola di Apprendimento di Hebb

La domanda fondamentale è: come devono essere scelti i pesi sinaptici J_{ij} affinché i punti fissi della dinamica corrispondano a specifici ricordi che vogliamo immagazzinare?. Le connessioni sinaptiche nel cervello non sono fisse, ma si alterano quando impariamo. Hopfield propose di utilizzare la **regola di Hebb**, un principio neuroscientifico secondo cui "neuroni che si attivano insieme, si collegano" (**neurons that fire together, wire together**).

Supponiamo di voler memorizzare P "pattern" o ricordi, $\underline{\xi}^\mu$, con $\mu = 1, \dots, P$. Ogni pattern è un vettore di N componenti, dove N è il numero di neuroni (o spin), e $\xi_i^\mu \in \{-1, 1\}$. La regola di Hebb prescrive di definire i pesi sinaptici come segue:

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^P \xi_i^\mu \xi_j^\mu \quad (1.4)$$

Questa formula ha un'interpretazione biologica intuitiva: se, per un dato ricordo μ , due neuroni i e j sono coerenti (cioè ξ_i^μ e ξ_j^μ hanno lo stesso segno), il loro contributo al peso J_{ij} è positivo, rafforzando la loro connessione. Se invece sono incoerenti, il contributo è negativo, creando una connessione inibitoria. Questo processo può essere visto come il risultato di un **processo di apprendimento**: presentando ripetutamente i pattern alla rete, le connessioni sinaptiche si adattano per codificare queste memorie, **favorendo i neuroni coerenti**.

1.2.3 Connessione con la Meccanica Statistica

La dinamica di Hopfield ha una profonda connessione con la meccanica statistica. La regola di aggiornamento è equivalente a una dinamica a temperatura zero (gradient descent) che minimizza un'energia, o **Hamiltoniana**. Consideriamo un'Hamiltoniana della forma:

$$H = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (1.5)$$

L'energia che coinvolge un singolo spin S_i può essere scritta come:

$$H_i = -S_i \left(\sum_{j \neq i} J_{ij} S_j \right) \quad (1.6)$$

La quantità tra parentesi è il **campo locale** sentito dallo spin S_i :

$$h_i = \sum_{j \neq i} J_{ij} S_j \quad (1.7)$$

Per minimizzare l'energia, lo spin S_i tenderà ad allinearsi con il suo campo locale, ovvero $S_i = \text{sign}(h_i)$. Questa è esattamente la dinamica di Hopfield.

Di conseguenza, **i punti fissi della dinamica corrispondono ai minimi locali dell'Hamiltoniana H** .

Questa equivalenza permette di studiare le proprietà della rete, come la sua capacità di memorizzazione, utilizzando gli strumenti della meccanica statistica. Invece di analizzare la dinamica, si studiano le proprietà termodinamiche del sistema descritto da H alla distribuzione di Gibbs-Boltzmann $P_{GB}(S) \propto e^{-\beta H}$, dove $\beta = 1/T$.

1.2.4 Diagramma di Fase del Modello di Hopfield

Si studia il modello nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$) e mantenendo costante il rapporto $\alpha = P/N$, detto **carico della rete**. Il diagramma di fase nel piano (α, T) rivela tre regioni principali:




Figura 1.1: Diagramma di fase qualitativo del modello di Hopfield.

Per caratterizzare le fasi, si usano parametri d'ordine come la sovrapposizione con una memoria m^μ e l'overlap tra repliche q :

$$m^\mu = \frac{1}{N} \sum_i S_i \xi_i^\mu \quad (1.8)$$

$$q = \frac{1}{N} \sum_i S_i^{(1)} S_i^{(2)} \quad (1.9)$$

- **Fase Paramagnetica (P):** Ad alta temperatura, l'agitazione termica domina e gli spin sono orientati casualmente. Non c'è correlazione né con le memorie ($m = 0$) né tra configurazioni diverse ($q = 0$).
- **Fase di Recupero (R - Retrieval):** A bassa temperatura e per un basso carico di rete ($\alpha < \alpha_c$), il sistema può recuperare le memorie. In questa fase, esistono stati termodinamicamente stabili in cui la sovrapposizione con una delle memorie è non nulla ($m \neq 0$). Il valore critico del carico a $T = 0$ è $\alpha_c \approx 0.138$. Una rete di N neuroni può memorizzare in modo affidabile al massimo circa il 14% di N pattern.
- **Fase di Spin Glass (S):** Se il carico della rete supera la soglia critica ($\alpha > \alpha_c$), il sistema entra in una fase di spin glass. La sovrapposizione con le memorie è nulla ($m = 0$), ma l'overlap tra repliche è non nullo ($q \neq 0$). Il paesaggio energetico diventa estremamente complesso, con un numero esponenziale di minimi locali ("stati spuri") che non corrispondono a nessuna delle memorie originali. La dinamica si blocca in questi stati spuri e il recupero fallisce.

1.3 Problemi di Soddisfacimento di Vincoli (CSP)

Un'altra area in cui le tecniche della meccanica statistica dei sistemi disordinati si sono rivelate fondamentali è lo studio dei **Constraint Satisfaction Problems** (CSP) in computer science.

Un CSP è un problema di ottimizzazione combinatoria in cui si deve trovare una configurazione di variabili discrete che soddisfi un insieme di vincoli. Consideriamo un sistema con:

- N variabili binarie, $S_i \in \{-1, 1\}$.
- M vincoli (o clausole).

La difficoltà del problema è tipicamente misurata dal rapporto $\alpha = M/N$, ovvero il numero medio di vincoli per variabile. All'aumentare di α , ci si aspetta una transizione da un regime in cui il problema è facilmente **soddisfacibile** (SAT) a uno in cui è **insoddisfacibile** (UNSAT). Nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$), questa transizione diventa una **transizione di fase netta** (sharp transition), dove la probabilità che un'istanza random sia soddisfacibile passa da 1 a 0 in un punto critico α_s .




Figura 1.2: Transizione di fase SAT/UNSAT.

Tuttavia, l'analisi ha rivelato una struttura più complessa. Per molti problemi, esiste una regione intermedia **SAT-HARD**, dove le soluzioni esistono ma sono estremamente difficili da trovare per gli algoritmi di ricerca locale. Gli algoritmi tipicamente riescono a trovare soluzioni fino a una soglia $\alpha_d < \alpha_s$, ma falliscono nella regione $[\alpha_d, \alpha_s]$. La fisica statistica ha fornito una spiegazione per questo fenomeno, collegandolo a un cambiamento nella struttura dello spazio delle soluzioni.

1.3.1 Il problema XORSAT

Un problema apparentemente semplice che mostra questa struttura complessa è XOR-SAT. In termini di computer science, il problema è definito come segue:

- N variabili booleane $x_i \in \{\text{True}, \text{False}\}$ (o $\{0, 1\}$).
- M clausole, ognuna delle quali coinvolge 3 variabili scelte a caso (i, j, k) .

- Ogni clausola impone un vincolo di **OR esclusivo (XOR)**: $x_i \oplus x_j \oplus x_k = c_a$, dove c_a è 0 o 1.

Se le variabili sono in $\{0, 1\}$, il vincolo si scrive come $(x_i + x_j + x_k) \pmod{2} = c_a$.

Si tratta quindi di risolvere un sistema di M equazioni lineari modulo 2 in N incognite. Questo problema può essere risolto in tempo polinomiale (cubico, $O(N^3)$) con l'eliminazione gaussiana, che è un algoritmo globale. Tuttavia, gli algoritmi *locali*, che usano solo informazioni locali, falliscono nel trovare soluzioni nella fase HARD.

Mappatura su un Modello di Spin

Per studiare questo problema con la meccanica statistica, mappiamo le variabili booleane x_i su variabili di spin S_i tramite la trasformazione $S_i = (-1)^{x_i}$.

Con questa mappatura, il prodotto di tre spin è legato alla somma delle variabili booleane:

$$S_i S_j S_k = (-1)^{x_i + x_j + x_k} \quad (1.10)$$

Per semplicità, consideriamo il caso in cui tutte le clausole devono essere soddisfatte con risultato 0, cioè $(x_i + x_j + x_k) \pmod{2} = 0$.

Questo corrisponde a richiedere $S_i S_j S_k = 1$ per ogni clausola (i, j, k) .

Una configurazione è una soluzione se soddisfa tutti gli M vincoli: $\sum_{(i,j,k)} S_i S_j S_k = M$.

Possiamo definire un'Hamiltoniana tale che il suo stato fondamentale (energia minima) corrisponda alle soluzioni del problema:

$$H = M - \sum_{(i,j,k)} S_i S_j S_k \quad (1.11)$$

Lo stato fondamentale ha energia $H = 0$ e si raggiunge quando tutti i vincoli sono soddisfatti. Il disordine in questo modello non risiede negli accoppiamenti (che sono tutti uguali a -1), ma nella struttura del **grafo** di interazione, che è random poiché le triplette (i, j, k) sono scelte a caso.

La Transizione di Fase e la Struttura delle Soluzioni

Un calcolo semplice suggerisce che il numero di soluzioni dovrebbe essere 2^{N-M} , poiché ogni equazione lineare indipendente dimezza lo spazio delle soluzioni.

L'entropia (il logaritmo del numero di soluzioni) per spin sarebbe

$$S = \frac{1}{N} \log_2(2^{N-M}) = (1 - \alpha) \log_2(1) \quad (1.12)$$

implicando che le soluzioni scompaiano solo per $\alpha_s = 1$.

Tuttavia, sperimentalmente e teoricamente si trova che la soglia di soddisfacibilità è $\alpha_s \approx 0.918$. La discrepanza nasce dal fatto che il calcolo precedente assume che tutti i vincoli siano linearmente indipendenti, il che cessa di essere vero quando iniziano a formarsi dipendenze lineari. Ad un certo punto, si forma un sottoinsieme di variabili, chiamato **core**, che riceve un numero di vincoli così alto che diventa localmente insoddisfacibile, rendendo l'intero problema UNSAT anche se $\alpha < 1$.

La transizione verso la fase HARD a $\alpha_d < \alpha_s$ è spiegata da un cambiamento topologico nello spazio delle soluzioni.

- **Fase EASY-SAT** ($\alpha < \alpha_d$): Lo spazio delle soluzioni è un unico grande "cluster" connesso. È facile muoversi da una soluzione all'altra con piccole modifiche, e gli algoritmi locali possono esplorare questo spazio in modo efficiente.
- **Fase HARD-SAT** ($\alpha_d < \alpha < \alpha_s$): Lo spazio delle soluzioni, pur contenendo ancora un numero esponenziale di configurazioni, si frammenta in molti cluster piccoli e isolati. Si verifica una **rottura di ergodicità**. Questa clusterizzazione crea barriere energetiche che intrappolano gli algoritmi di ricerca locale in minimi locali di energia che non sono soluzioni, impedendo loro di raggiungere le vere soluzioni a energia zero.

Questa transizione topologica, invisibile a livello dell'entropia totale (che rimane una funzione regolare di α), è il vero ostacolo per gli algoritmi.




Figura 1.3: Rappresentazione del cambiamento topologico nello spazio delle soluzioni.

github . com / elisabettagnello

Lezione 2

Data: 02/10/2025

2.1 Derivazione dell'Entropia di Shannon

Per dedurre l'espressione dell'entropia di Shannon, consideriamo il seguente esperimento mentale. Supponiamo di dover trasmettere una sequenza di N bit. Lo spazio delle possibili configurazioni ha una dimensione di 2^N . Per specificare una di queste 2^N "parole", è necessario trasmettere tutti gli N bit.

Ora, supponiamo di poter classificare queste 2^N configurazioni in base al valore di un'osservabile, come la magnetizzazione media o l'energia. Sia X tale osservabile, che può assumere l valori distinti: $X \in \{x_1, x_2, \dots, x_l\}$. Se consideriamo una misura uniforme sullo spazio delle 2^N configurazioni, X si comporta come una variabile aleatoria, assumendo i suoi valori con diverse probabilità.

Definiamo la probabilità p_i come la probabilità che la variabile aleatoria X assuma il valore x_i :

$$p_i = P[X = x_i] \quad (2.1)$$

Queste probabilità definiranno l'entropia della variabile X .

Consideriamo uno scenario di trasmissione di informazione da un trasmettitore a un ricevitore. Invece di trasmettere tutti gli N bit della configurazione, comunichiamo al ricevitore solo il valore x_i che l'osservabile X assume su quella specifica configurazione. Questa informazione riduce l'incertezza del ricevitore.

Dopo aver comunicato che $X = x_i$, il numero di configurazioni possibili non è più 2^N , ma si riduce al numero di configurazioni compatibili con questa condizione, che è $2^N p_i$. Di conseguenza, il numero di bit necessari per identificare univocamente la configurazione passa da N a $N + \log_2(p_i)$. Poiché $p_i \leq 1$, il termine $\log_2(p_i)$ è negativo (o nullo), indicando una riduzione del numero di bit da trasmettere. Assegnare un valore alla variabile aleatoria riduce l'incertezza di una quantità pari a $-\log_2(p_i)$.

L'incertezza media associata alla non conoscenza della variabile aleatoria X si ottiene calcolando il valore di aspettazione di questa quantità su tutti i possibili valori di X . L'incertezza associata al valore x_i è $-\log_2(p_i)$, e questo valore si presenta con probabilità p_i . L'incertezza media, o entropia di X , è quindi la somma pesata:

$$H_X = - \sum_{i=1}^l p_i \log_2(p_i) \quad (2.2)$$

Questa quantità può essere interpretata in due modi equivalenti: come il contenuto medio di informazione che si ottiene scoprendo il valore della variabile aleatoria, o come l'incertezza media sulla variabile prima di conoscerne il valore.

Proprietà dell'Entropia

- **Positività:** Per variabili con un numero discreto e finito di valori, l'entropia è sempre non negativa, $H_X \geq 0$. È legata a un conteggio di configurazioni.
- **Caso Certo:** Se la variabile X è certa, assume un solo valore con probabilità $p_i = 1$ e tutti gli altri con probabilità zero. In questo caso, l'entropia è nulla, $H_X = 0$.
- **Massima Entropia:** L'entropia è massima quando tutti i valori possibili sono equiprobabili. Se X può assumere l valori, il massimo si ha per $p_i = 1/l$ per ogni i , e vale $H_X = \log_2(l)$.
- **Variabili Continue:** Per le variabili continue, l'entropia di Shannon non è più necessariamente positiva e perde l'interpretazione diretta di conteggio. In questi casi, concetti come l'informazione mutua, che si basano su differenze di entropie, sono più robusti.
- **Subadditività:** Date due variabili aleatorie X e Y , che possono essere correlate, l'entropia congiunta è subadditiva:

$$H_{X,Y} \leq H_X + H_Y \quad (2.3)$$

L'uguaglianza vale se e solo se le variabili sono statisticamente indipendenti, ovvero se la loro distribuzione congiunta si fattorizza: $P(x, y) = P(x)P(y)$. La correlazione riduce l'incertezza totale perché la conoscenza di una variabile fornisce informazione sull'altra.

Esempio: Variabile di Bernoulli

Consideriamo una variabile di Bernoulli che può assumere due valori (e.g., 0 e 1) con probabilità q e $1 - q$ rispettivamente. La sua entropia è data da:

$$H_X = -q \log_2(q) - (1 - q) \log_2(1 - q) \quad (2.4)$$

Questa funzione è nulla per $q = 0$ e $q = 1$ (eventi certi) e raggiunge il suo massimo, $\log_2(2) = 1$, per $q = 1/2$ (massima incertezza).

2.2 Divergenza di Kullback-Leibler (DKL)

La divergenza di Kullback-Leibler (DKL), o entropia relativa, è una misura della "distanza" tra due distribuzioni di probabilità, $p(x)$ e $q(x)$. Date due distribuzioni, la DKL di q rispetto a p è definita come:

$$D_{KL}(q||p) = \sum_x q(x) \log \left(\frac{q(x)}{p(x)} \right) \quad (2.5)$$

Questa espressione può essere interpretata come il valore di aspettazione, calcolato sulla distribuzione q , del logaritmo del rapporto tra le due distribuzioni.

Proprietà della DKL

- **Non-negatività:** $D_{KL}(q||p) \geq 0$. L'uguaglianza $D_{KL}(q||p) = 0$ si verifica se e solo se $q(x) = p(x)$ per ogni x .

Dimostrazione: Utilizziamo la disuguaglianza $\ln(A) \leq A - 1$ per $A > 0$, dove l'uguaglianza vale solo per $A = 1$.

$$\begin{aligned} -D_{KL}(q||p) &= -\sum_x q(x) \log \left(\frac{q(x)}{p(x)} \right) = \sum_x q(x) \log \left(\frac{p(x)}{q(x)} \right) \\ &\leq \sum_x q(x) \left(\frac{p(x)}{q(x)} - 1 \right) \\ &= \sum_x p(x) - \sum_x q(x) = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

Poiché $-D_{KL}(q||p) \leq 0$, segue che $D_{KL}(q||p) \geq 0$. L'uguaglianza si ha quando l'argomento del logaritmo, $p(x)/q(x)$, è uguale a 1 per ogni x , cioè quando le distribuzioni coincidono.

- **Asimmetria:** In generale, $D_{KL}(q||p) \neq D_{KL}(p||q)$. Per questo non è una vera e propria distanza metrica.
- **Convessità:** La DKL è una funzione convessa nel suo primo argomento, q .

2.3 Somma di Variabili Aleatorie Indipendenti

Consideriamo una sequenza di N variabili aleatorie $x_1, x_2, \dots, x_N$ che sono indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.). Assumiamo che abbiano momento primo (media μ) e secondo (varianza σ^2) finiti. Siamo interessati a caratterizzare la variabile somma:

$$S_N = \sum_{i=1}^N x_i \quad (2.6)$$

Esistono tre livelli di descrizione per il comportamento di S_N per N grande.

2.3.1 Legge dei Grandi Numeri

Questo è il primo e più semplice livello di informazione. Ci dice che, per N molto grande, la somma S_N si concentra attorno al suo valore atteso.

$$S_N \approx N\mu \quad (2.7)$$

O, in modo equivalente, la media campionaria S_N/N converge alla media teorica μ .

2.3.2 Teorema Centrale del Limite(TLC)

Il TLC fornisce un'informazione più dettagliata, descrivendo le fluttuazioni di S_N . Queste fluttuazioni sono di ordine $\sqrt{N}$ e sono note come "piccole deviazioni".

$$S_N \approx N\mu + \sqrt{N\sigma^2}Z \quad (2.8)$$

Il teorema afferma che la variabile standardizzata converge in distribuzione a una variabile Gaussiana con media nulla e varianza unitaria:

$$\frac{S_N - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}} \rightarrow Z \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (2.9)$$

Questo significa che S_N è approssimativamente distribuita come una Gaussiana con media $N\mu$ e varianza $N\sigma^2$.

2.3.3 Teoria delle Grandi Deviazioni

Il terzo livello si occupa di eventi rari, le "grandi deviazioni". Siamo interessati alla probabilità che la somma S_N assuma un valore che si discosta dal suo valore medio di una quantità di ordine N , non $\sqrt{N}$. Vogliamo calcolare la probabilità di un evento del tipo $S_N = \lambda N$, con $\lambda \neq \mu$. È ragionevole aspettarsi che questa probabilità sia esponenzialmente piccola in N . Perché un evento così raro accada, è necessario che molte delle variabili x_i assumano valori atipici. Se ogni variabile lo fa con una probabilità leggermente inferiore a 1, la probabilità congiunta per N variabili sarà una potenza di N . La teoria postula che:

$$P(S_N = \lambda N) \sim e^{-NI(\lambda)} \quad (2.10)$$

dove $I(\lambda)$ è la **funzione di Cramér** o funzione di rate. Il compito della teoria è calcolare $I(\lambda)$ a partire dalla distribuzione $p(x)$ della singola variabile.

Calcolo di $I(\lambda)$ con il Metodo del Punto di Sella

La probabilità può essere scritta in forma integrale:

$$P(S_N = \lambda N) = \int \prod_{i=1}^N dp(x_i) \delta\left(\sum_i x_i - \lambda N\right) \quad (2.11)$$

Usando la rappresentazione integrale della delta di Dirac, si ottiene:

$$P(S_N = \lambda N) \propto \int \prod_{i=1}^N dp(x_i) \int dq e^{-iq\lambda N + iq \sum_i x_i} \quad (2.12)$$

$$\propto \int dq e^{-iq\lambda N} \left[\int dp(x) e^{iqx} \right]^N \quad (2.13)$$

$$\propto \int_{-i\infty}^{+i\infty} dh e^{-h\lambda N} \left[\int dp(x) e^{hx} \right]^N \quad (2.14)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo effettuato una rotazione nel piano complesso $h = iq$. Definiamo la **funzione generatrice dei cumulanti** scalata, $R(h)$:

$$R(h) = \log \mathbb{E}_x[e^{hx}] = \log \left(\int dp(x) e^{hx} \right) \quad (2.15)$$

L'integrale (2.14) diventa:

$$P(S_N = \lambda N) \propto \int_{-i\infty}^{+i\infty} dh e^{N(R(h) - \lambda h)} \quad (2.16)$$

Per N grande, questo integrale può essere valutato con il metodo del punto di sella. L'integrale è dominato dal valore di h che rende stazionario l'esponente. Stiamo integrando lungo l'asse immaginario, ma possiamo deformare il cammino di integrazione nel piano complesso per passare attraverso un punto di sella sull'asse reale. Tale punto, h^* , annulla le oscillazioni dell'integrando. Il punto di sella h^* è determinato dalla condizione:

$$\left. \frac{d}{dh} (R(h) - \lambda h) \right|_{h=h^*} = 0 \quad \implies \quad R'(h^*) = \lambda \quad (2.17)$$

Lungo l'asse reale, questo punto corrisponde a un **minimo** dell'esponente (poiché $R''(h) \geq 0$), ma è un **massimo** lungo il cammino di integrazione deformato, dominando così il valore dell'integrale. L'approssimazione del punto di sella fornisce:

$$P(S_N = \lambda N) \sim \exp[N(R(h^*) - \lambda h^*)] \quad (2.18)$$

Confrontando con la forma $e^{-NI(\lambda)}$, identifichiamo la funzione di Cramér:

$$I(\lambda) = \lambda h^*(\lambda) - R(h^*(\lambda)) \quad (2.19)$$

dove $h^*(\lambda)$ è la soluzione di $R'(h) = \lambda$. Questa espressione è una **trasformata di Legendre** della funzione $R(h)$. Può anche essere scritta come:

$$I(\lambda) = \max_h (h\lambda - R(h)) \quad (2.20)$$

Interpretazione fisica: La derivata $R'(h)$ è il valore medio di x calcolato con una distribuzione "deformata" o "tiltata" $p(x)e^{hx}$:

$$R'(h) = \frac{\int dp(x)xe^{hx}}{\int dp(x)e^{hx}} = \langle x \rangle_h \quad (2.21)$$

La condizione del punto di sella $R'(h^*) = \lambda$ significa che stiamo scegliendo un h^* tale da deformare la distribuzione originale in modo che il suo nuovo valore medio sia esattamente λ , l'evento raro che vogliamo osservare. In questo modo, l'evento raro diventa tipico sotto la nuova misura. Il termine λh^* in $I(\lambda)$ sottrae "l'aiuto" che abbiamo introdotto artificialmente per rendere l'evento probabile.

Proprietà di $I(\lambda)$ e Connessione con il TLC

- $R(h)$ e $I(\lambda)$ sono una la trasformata di Legendre dell'altra.
- La derivata seconda $R''(h) = \langle x^2 \rangle_h - \langle x \rangle_h^2 \geq 0$, quindi $R(h)$ è convessa.
- Attraverso le proprietà della trasformata di Legendre, si può mostrare che anche $I(\lambda)$ è sempre convessa: $I''(\lambda) = 1/R''(h^*) \geq 0$.
- La funzione $I(\lambda)$ ha un unico minimo globale in $\lambda = \mu$ (il valore medio), dove $I(\mu) = 0$. Per tutti gli altri valori $\lambda \neq \mu$, $I(\lambda) > 0$.

Vicino al suo minimo μ , possiamo approssimare $I(\lambda)$ con una parabola:

$$I(\lambda) \approx \frac{(\lambda - \mu)^2}{2\sigma^2} \quad (2.22)$$

Sostituendo questa approssimazione nella formula delle grandi deviazioni, si ottiene:

$$P(S_N = \lambda N) \sim e^{-N \frac{(\lambda - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \exp \left\{ -\frac{(N\lambda - N\mu)^2}{2N\sigma^2} \right\} \quad (2.23)$$

Questa è esattamente la forma di una distribuzione Gaussiana per la variabile S_N con media $N\mu$ e varianza $N\sigma^2$, **recuperando così il Teorema del Limite Centrale come approssimazione locale della teoria delle grandi deviazioni.**

2.4 Probabilità di una Sequenza Empirica

Consideriamo ora un problema più generale. Invece di guardare solo alla somma delle variabili x_i , analizziamo l'intera sequenza di N osservazioni. Supponiamo che la variabile X possa assumere l valori discreti $\{x_1, \dots, x_l\}$ con probabilità teoriche $\{p_1, \dots, p_l\}$. Dopo N estrazioni, non osserveremo esattamente Np_j occorrenze del valore x_j , ma piuttosto un numero Nq_j , dove q_j è la **frequenza empirica**:

$$q_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}[x_i = x_j] \quad (2.24)$$

Vogliamo calcolare la probabilità di osservare una specifica sequenza di frequenze empiriche $\{q_1, \dots, q_l\}$ dato che le variabili sono generate dalla distribuzione teorica $\{p_1, \dots, p_l\}$. La probabilità di una specifica sequenza con Nq_j occorrenze di x_j per ogni j è data da:

$$\prod_{j=1}^l p_j^{Nq_j}$$

Il numero di sequenze diverse che corrispondono allo stesso insieme di frequenze empiriche $\{q_j\}$ è dato dal coefficiente multinomiale:

$$\frac{N!}{\prod_{j=1}^l (Nq_j)!}$$

La probabilità totale è quindi:

$$P(\{q_j\}|\{p_j\}) = \frac{N!}{\prod_{j=1}^l (Nq_j)!} \prod_{j=1}^l p_j^{Nq_j} \quad (2.25)$$

Utilizzando l'approssimazione di Stirling per i fattoriali per N grande, si può dimostrare che questa probabilità segue un principio di grandi deviazioni:

$$P(\{q_j\}|\{p_j\}) \sim \exp \left\{ -N \sum_j q_j \log \left(\frac{q_j}{p_j} \right) \right\} \quad (2.26)$$

$$= \exp \{ -N D_{KL}(q||p) \} \quad (2.27)$$

Questo risultato fondamentale mostra che la probabilità di osservare una distribuzione empirica q quando la vera distribuzione è p , è esponenzialmente piccola in N con una rate function data esattamente dalla divergenza di Kullback-Leibler tra le due distribuzioni. Questo principio è alla base di molti metodi moderni di inferenza statistica e machine learning, dove si cerca di minimizzare la divergenza tra un modello generativo e la distribuzione dei dati osservati.

github . com / elisabettagnello

Lezione 3

Data: 08/10/2025

3.1 Funzione di Cramer per una Variabile Binaria

Consideriamo una variabile binaria x che può assumere i valori $+1$ e -1 con probabilità $1/2$.

$$x = \begin{cases} +1 & \text{con } p = 1/2 \\ -1 & \text{con } p = 1/2 \end{cases} \quad (3.1)$$

La funzione di Cramer $I(\lambda)$, che caratterizza le grandi deviazioni della somma di N di tali variabili, può essere calcolata. L'espressione iniziale che si ottiene tramite la trasformata di Legendre è:

$$I(\lambda) = \lambda \operatorname{arctanh}(\lambda) - \log(\cosh(\operatorname{arctanh}(\lambda))) \quad (3.2)$$

Sfruttando le proprietà delle funzioni iperboliche, questa espressione può essere riscritta in una forma molto più simmetrica e interpretabile:

$$I(\lambda) = \frac{1+\lambda}{2} \log(1+\lambda) + \frac{1-\lambda}{2} \log(1-\lambda) \quad (3.3)$$

Questa forma può essere ulteriormente espressa in relazione a una quantità di tipo entropico. Possiamo scrivere:

$$I(\lambda) = \log(2) - S(\lambda) \quad (3.4)$$

dove $S(\lambda)$ è l'entropia di una variabile di Bernoulli che assume due valori con probabilità $p_1 = \frac{1+\lambda}{2}$ e $p_2 = \frac{1-\lambda}{2}$:

$$S(\lambda) = -\frac{1+\lambda}{2} \log\left(\frac{1+\lambda}{2}\right) - \frac{1-\lambda}{2} \log\left(\frac{1-\lambda}{2}\right) \quad (3.5)$$

È ragionevole che la funzione di Cramer sia legata all'opposto dell'entropia: dove l'entropia è grande (massima incertezza, $\lambda = 0$), la funzione di Cramer è piccola (minima), indicando che il valore medio è il più probabile. Viceversa, dove l'entropia è piccola (vicino a $\lambda = \pm 1$), la funzione di Cramer è grande, indicando che le deviazioni estreme sono improbabili.

Il grafico di $I(\lambda)$ in funzione di λ è una curva convessa, con un minimo in $\lambda = 0$ dove vale zero. Ai bordi del dominio, per $\lambda \rightarrow \pm 1$, la funzione tende a $\log(2)$.




Figura 3.1: $I(\lambda)$ in funzione di λ

Nell'intorno di $\lambda = 0$, la funzione può essere approssimata da una parabola $I(\lambda) \approx \lambda^2/2$. Questo risultato è coerente con il Teorema del Limite Centrale: la somma di variabili con valore di aspettazione nullo e varianza unitaria tende a una distribuzione gaussiana.

La convessità della funzione di Cramer è una proprietà cruciale per le somme di variabili indipendenti. Essa garantisce l'esistenza di un unico minimo, e quindi di un unico valore più probabile (tipico) per la media campionaria. Allontanandosi da questo valore, la probabilità di osservare una certa media decade esponenzialmente in N . Questa caratteristica fondamentale viene a mancare quando si considerano variabili correlate, che è l'argomento che affronteremo ora. Il mondo non è fatto di variabili indipendenti, e la principale conseguenza della correlazione è la possibile perdita di convessità, che porta alla comparsa di più minimi per la funzione di Cramer.

3.2 Introduzione alle Variabili Correlate

Per descrivere un sistema di due variabili correlate, X e Y , è necessario utilizzare la **distribuzione di probabilità congiunta**, $P_{X,Y}(x,y)$. Per semplicità di notazione, la indicheremo come $P(x,y)$.

A partire dalla distribuzione congiunta, si possono definire altre due distribuzioni fondamentali.

Le **distribuzioni marginali** si ottengono "integrando via" (o sommando, nel caso discreto) le altre variabili. Forniscono la distribuzione di probabilità di una singola variabile, indipendentemente dal valore delle altre.

$$P_X(x) = \sum_y P(x,y) \quad (3.6)$$

$$P_Y(y) = \sum_x P(x,y) \quad (3.7)$$

Le **distribuzioni condizionali** descrivono la probabilità di una variabile, dato che un'altra variabile ha assunto un valore specifico. La distribuzione congiunta può essere fattorizzata in due modi equivalenti:

$$P(x,y) = P_{Y|X}(y|x)P_X(x) = P_{X|Y}(x|y)P_Y(y) \quad (3.8)$$

Questo significa che per generare una coppia (x,y) si può prima estrarre x dalla sua marginale $P_X(x)$ e poi, condizionatamente al valore di x ottenuto, estrarre y da $P_{Y|X}(y|x)$, o viceversa.

Uguagliando le due espressioni per la probabilità congiunta, si ottiene immediatamente il **Teorema di Bayes**:

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_{Y|X}(y|x)P_X(x)}{P_Y(y)} \quad (3.9)$$

Questa formula, sebbene sia una semplice identità matematica, assume un significato profondo quando si passa dal concetto di **correlazione** a quello di **causalità**. È un principio fondamentale da tenere sempre a mente: **correlazione non implica causalità**. Il fatto che due eventi siano statisticamente correlati non significa che uno sia la causa dell'altro. Esistono innumerevoli esempi di "correlazioni spurie", in cui due serie di dati mostrano andamenti quasi identici pur essendo causalmente slegate.

Il Teorema di Bayes acquista il suo potere inferenziale quando si ipotizza un modello causale, ad esempio che una variabile X (la causa) influenzi una variabile Y (l'effetto). In questo contesto, i termini del teorema assumono un'interpretazione fisica precisa:

- $P_{X|Y}(x|y)$ è la **distribuzione a posteriori**: la probabilità (o la nostra credenza) sulla causa x dopo aver osservato l'effetto y .
- $P_X(x)$ è la **distribuzione a priori** (o *prior*): la nostra conoscenza o aspettativa sulla variabile X prima di effettuare qualsiasi misura su Y .
- $P_{Y|X}(y|x)$ è la **verosimiglianza** (o *likelihood*): questa è la probabilità condizionata "in avanti", che descrive come la causa x produce l'effetto y . Questo termine incapsula il nostro **modello** del processo fisico.
- $P_Y(y)$ è un termine di normalizzazione (l'*evidence*).

L'inferenza bayesiana consiste quindi nell'utilizzare un'osservazione (y) e un modello ($P_{Y|X}(y|x)$) per aggiornare la nostra conoscenza su una causa non osservata (x), passando dalla distribuzione a priori a quella a posteriori.

Se le variabili X e Y sono indipendenti, l'intero formalismo si semplifica notevolmente. La condizione di indipendenza è che la distribuzione congiunta si fattorizzi nel prodotto delle marginali:

$$P(x, y) = P_X(x)P_Y(y) \quad (3.10)$$

Di conseguenza, le distribuzioni condizionali diventano indipendenti dalla variabile condizionante:

$$P_{Y|X}(y|x) = P_Y(y) \quad (3.11)$$

$$P_{X|Y}(x|y) = P_X(x) \quad (3.12)$$

3.2.1 Entropia e Informazione Mutua

A ogni distribuzione di probabilità possiamo associare un'entropia di Shannon, che misura l'incertezza o la quantità di informazione.

- **Entropia Congiunta:** Misura l'incertezza totale della coppia di variabili (X, Y) .

$$H_{X,Y} = - \sum_{x,y} P(x, y) \log P(x, y) \quad (3.13)$$

- **Entropia Condizionale:** Misura l'incertezza media residua su Y quando il valore di X è noto. Si calcola mediando l'entropia di $P_{Y|X}(y|x)$ su tutti i possibili valori di x .

$$H_{Y|X} = - \sum_x P_X(x) \sum_y P_{Y|X}(y|x) \log P_{Y|X}(y|x) \quad (3.14)$$

Queste quantità sono legate dalla **regola della catena** (*chain rule*) per l'entropia:

$$H_{X,Y} = H_X + H_{Y|X} \quad (3.15)$$

L'incertezza totale è la somma dell'incertezza su X più l'incertezza residua su Y una volta noto X .

Per quantificare in modo simmetrico l'informazione condivisa tra due variabili, si introduce l'**Informazione Mutua** (*Mutual Information*), una quantità fondamentale nell'analisi dati e nell'inferenza.

$$I_{X,Y} = \sum_{x,y} P(x, y) \log \frac{P(x, y)}{P_X(x)P_Y(y)} \quad (3.16)$$

Questa quantità è la divergenza di Kullback-Leibler tra la distribuzione congiunta $P(x, y)$ e la distribuzione che le variabili avrebbero se fossero indipendenti, $P_X(x)P_Y(y)$. Quindi, $I_{X,Y} = D_{KL}(P(x, y) || P_X(x)P_Y(y))$.

Proprietà fondamentali:

- $I_{X,Y} \geq 0$.
- $I_{X,Y} = 0$ se e solo se X e Y sono indipendenti.

L'informazione mutua può essere espressa in termini di entropie, rivelandone il significato intuitivo:

$$I_{X,Y} = H_Y - H_{Y|X} = H_X - H_{X|Y} \quad (3.17)$$

Essa rappresenta la **riduzione dell'incertezza** su una variabile (es. H_Y) che si ottiene grazie alla conoscenza dell'altra (misurata dall'incertezza residua $H_{Y|X}$). Se le variabili sono perfettamente correlate (es. $Y = f(X)$), allora $H_{Y|X} = 0$ e $I_{X,Y} = H_Y$: conoscere X rimuove tutta l'incertezza su Y .

Dalla Statistica Classica alla Meccanica Statistica in Alta Dimensione

La statistica classica si occupa tipicamente di sistemi con un numero basso di variabili. Quando il numero di variabili N diventa molto grande ($N \gg 1$), si entra nel campo della *High-Dimensional Statistics*. In questo regime, molti metodi classici falliscono (la cosiddetta "maledizione dell'alta dimensionalità", *curse of dimensionality*), ma emergono nuovi fenomeni collettivi che possono essere studiati con gli strumenti della meccanica statistica.

Per i fisici statistici, l'alta dimensionalità è una "benedizione" (*blessing of dimensionality*), perché nel limite $N \rightarrow \infty$ (limite termodinamico) le fluttuazioni si riducono e le quantità macroscopiche si concentrano attorno ai loro valori medi, rendendo i calcoli analitici possibili e predittivi. L'intuizione geometrica cambia radicalmente: per esempio, una distribuzione gaussiana N -dimensionale, che in bassa dimensione ha la sua massima probabilità nell'origine, in alta dimensione concentra quasi tutta la sua massa su un guscio sferico a distanza $\sqrt{N}$ dall'origine.

3.3 Il Modello di Ising

Il modello di Ising è il modello archetipico per lo studio di un gran numero di variabili binarie interagenti. Fu proposto da Wilhelm Lenz e studiato dal suo dottorando Ernst Ising nel 1923 per descrivere il fenomeno del ferromagnetismo.

Consideriamo un insieme di N variabili binarie $S_i \in \{-1, +1\}$, chiamate **spin**, disposte sui vertici di un grafo $G = (V, E)$. L'energia del sistema, descritta dall'Hamiltoniana, è data da:

$$H(\underline{S}) = -J \sum_{(i,j) \in E} S_i S_j - h \sum_{i \in V} S_i \quad (3.18)$$

dove:

- Il primo termine descrive l'interazione a coppie tra spin connessi da un arco del grafo. J è la **costante di accoppiamento**. Se $J > 0$ (**ferromagnetico**), lo stato di minima energia è quello in cui gli spin sono allineati ($S_i S_j = 1$), favorendo l'ordine.
- Il secondo termine descrive l'interazione degli spin con un **campo magnetico esterno** h . Lo stato di minima energia favorisce l'allineamento degli spin con il campo.

Il comportamento del modello dipende crucialmente dalla **topologia** del grafo (catena 1D, reticolo quadrato 2D, ecc.) e dalla sua **dimensione** D . Per i reticoli regolari, si definiscono due dimensioni critiche:

- **Lower Critical Dimension (LCD)**: È la dimensione minima al di sotto della quale non può esistere una transizione di fase a temperatura finita. Per il modello di Ising, $LCD = 1$.
- **Upper Critical Dimension (UCD)**: È la dimensione al di sopra della quale il comportamento critico del sistema diventa indipendente dalla dimensione e viene descritto correttamente dalla teoria di campo medio. Per il modello di Ising, $UCD = 4$.

3.3.1 Il Modello di Ising Unidimensionale (1D)

Ising, nella sua tesi, risolse il modello su una catena lineare ($D = 1$), trovando che non presenta una transizione di fase a $T > 0$, un risultato deludente che lo portò a concludere erroneamente che il modello non potesse descrivere il ferromagnetismo e ad abbandonare la fisica.

L'Hamiltoniana 1D con interazioni ai primi vicini è:

$$H(\underline{S}) = -J \sum_i S_i S_{i+1} - h \sum_i S_i \quad (3.19)$$

Le **condizioni al contorno** sono importanti:

- **Open Boundary Conditions (OBC)**: La catena è aperta. La somma sulle interazioni va da $i = 1$ a $N - 1$.
- **Closed/Periodic Boundary Conditions (CBC)**: La catena è chiusa ad anello, con $S_{N+1} \equiv S_1$. La somma va da $i = 1$ a N .

Nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$), le due condizioni portano agli stessi risultati per le grandezze intensive.




Figura 3.2: Modello di Ising 1D.

Risoluzione del Modello di Ising 1D

Risolvere un modello di meccanica statistica significa calcolare la sua **funzione di partizione** Z nell'insieme canonico.

$$Z = \sum_{\{\underline{S}\}} e^{-\beta H(\underline{S})} \quad (3.20)$$

dove $\beta = 1/T$ (poniamo $k_B = 1$) e la somma è su tutte le 2^N configurazioni di spin.

Da Z si deriva l'**energia libera di Helmholtz** $F = -T \log Z$.

Poiché $Z \propto e^N$ e $F \propto N$, si lavora con l'energia libera intensiva $f = F/N$, che è una quantità di ordine 1 nel limite termodinamico. Tutte le grandezze termodinamiche si ottengono derivando f rispetto ai parametri esterni (β e h):

- **Energia libera intensiva:** $f(\beta, h) = -\frac{1}{N\beta} \log Z$
- **Energia interna:** $\epsilon = \frac{\langle H \rangle}{N} = \frac{\partial(\beta f)}{\partial \beta} = f + \beta \frac{\partial f}{\partial \beta}$.
- **Entropia:** $S = \beta^2 \frac{\partial f}{\partial \beta}$.
- **Magnetizzazione:** $m = \frac{\langle \sum_i S_i \rangle}{N} = -\frac{\partial f}{\partial h}$.
- **Suscettività magnetica:** $\chi_m = \frac{\partial m}{\partial h} = -\frac{\partial^2 f}{\partial h^2}$.

Calcolo della Funzione di Partizione (con $h=0$)

Consideriamo il caso $h = 0$.

$$Z = \sum_{\{\underline{S}\}} e^{\beta J \sum_i S_i S_{i+1}} = \sum_{\{\underline{S}\}} \prod_i e^{\beta J S_i S_{i+1}} \quad (3.21)$$

Utilizziamo la seguente identità:

$$e^{AS} = \cosh(A)[1 + S \tanh(A)] \quad (3.22)$$

per $S = \pm 1$.

Applicandola a ogni termine del prodotto con $A = \beta J$ e $S = S_i S_{i+1}$, otteniamo:

$$Z = [\cosh(\beta J)]^M \sum_{\{S\}} \prod_i (1 + S_i S_{i+1} \tanh(\beta J)) \quad (3.23)$$

dove M è il numero di interazioni ($M = N - 1$ per OBC, $M = N$ per CBC).

Quando si espande il prodotto e si somma su tutte le configurazioni di spin, sopravvivono solo i termini in cui ogni variabile S_k compare con potenza pari.

- **OBC:** L'unico termine che sopravvive è quello in cui si prende "1" da ogni fattore, poiché qualsiasi altra scelta lascerebbe gli spin ai bordi con potenza dispari. La somma vale quindi 1×2^N .

$$Z_{OBC} = 2^N [\cosh(\beta J)]^{N-1} \quad (3.24)$$

- **CBC:** Sopravvivono due termini: prendere tutti "1" (contributo 1) e prendere tutti i termini con $\tanh(\beta J)$, che formano un ciclo chiuso (contributo $[\tanh(\beta J)]^N$).

$$Z_{CBC} = 2^N [\cosh(\beta J)]^N (1 + [\tanh(\beta J)]^N) \quad (3.25)$$

Nel limite $N \rightarrow \infty$, i risultati per OBC e CBC coincidono. L'energia libera intensiva $f = -\frac{1}{\beta N} \log Z$ è:

$$f = -\frac{1}{\beta} \log(2 \cosh(\beta J)) = -T \log(2) - T \log(\cosh(J/T)) \quad (3.26)$$

L'energia interna intensiva è:

$$\epsilon = \frac{\partial(\beta f)}{\partial \beta} = -J \tanh(\beta J) \quad (3.27)$$

Tutte le grandezze sono analitiche per $T > 0$, confermando l'**assenza di una transizione di fase** a temperatura finita. A $T = 0$, $\epsilon = -J$ (stato fondamentale ordinato), mentre a $T \rightarrow \infty$, $\epsilon \rightarrow 0$ (stato disordinato).




Figura 3.3: Grandezze termodinamiche del modello di Ising 1D in funzione della temperatura.

3.3.2 Funzioni di Correlazione Spaziale

Sebbene non ci sia una transizione di fase, il sistema sviluppa ordine a $T = 0$. Studiamo questo attraverso la **funzione di correlazione spaziale** tra due spin a distanza r :

$$C(r) = \langle S_i S_{i+r} \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{S\}} S_i S_{i+r} e^{-\beta H(\underline{S})} \quad (3.28)$$

Per omogeneità (usando CBC), possiamo calcolare $\langle S_0 S_r \rangle$. Con un calcolo analogo a quello per Z , si trova che i termini che sopravvivono nel numeratore sono quelli che formano una catena di "link" tra il sito 0 e il sito r .

$$C(r) = \frac{[\tanh(\beta J)]^r + [\tanh(\beta J)]^{N-r}}{1 + [\tanh(\beta J)]^N} \quad (3.29)$$

Nel limite termodinamico $N \rightarrow \infty$:

$$C(r) = [\tanh(\beta J)]^r \quad (3.30)$$

Questa è la forma di un **decadimento esponenziale**:

$$C(r) = e^{-r/\xi(T)} \quad (3.31)$$

dove la **lunghezza di correlazione** $\xi(T)$ è:

$$\xi(T) = -\frac{1}{\log(\tanh(\beta J))} \quad (3.32)$$

Quando $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$), $\tanh(\beta J) \rightarrow 1$, $\log(\tanh(\beta J)) \rightarrow 0^-$, e quindi $\xi(T) \rightarrow \infty$. La lunghezza di correlazione **diverge a temperatura nulla**. Per $T \ll J$, si ha:

$$\xi(T) \approx \frac{1}{2J} e^{2\beta J} \quad (3.33)$$

Questa divergenza esponenziale significa che, a temperature molto basse, il sistema sviluppa correlazioni su distanze macroscopiche, avvicinandosi allo stato ordinato del ferromagnete. La dinamica di rilassamento verso questo stato diventa infinitamente lenta, un fenomeno noto come "rallentamento critico".

github . com / elisabettagnello

Lezione 4

Data: 09/10/2025

4.1 Il Metodo della Matrice di Trasferimento

In questa lezione continuiamo l'analisi del modello di Ising, introducendo una tecnica risolutiva per sistemi unidimensionali nota come il metodo della **Matrice di Trasferimento**. Questo approccio si rivela estremamente potente, non solo per il calcolo della funzione di partizione, ma anche per ottenere grandezze fisiche come le marginali e le funzioni di correlazione. L'idea fondamentale è quella di "propagare" l'informazione lungo il sistema, costruendo la soluzione un passo (o uno spin) alla volta.

Consideriamo un sistema di spin unidimensionale con condizioni al contorno periodiche (CBC). L'Hamiltoniana del sistema è data da:

$$H(\underline{S}) = -J \sum_i S_i S_{i+1} - h \sum_i S_i \quad (4.1)$$

dove la somma è estesa a tutti gli spin del sistema. La funzione di partizione totale del sistema è:

$$Z = \sum_{\underline{S}} e^{-\beta H(\underline{S})} \quad (4.2)$$

La Funzione di Partizione Parziale

Il cuore del metodo consiste nell'introdurre una **funzione di partizione parziale**, $Z_{i,j}(S_i, S_j)$, definita su un sotto-insieme di spin tra il sito i e il sito j . Questa funzione non è un singolo numero, ma un oggetto che dipende dai valori degli spin ai bordi di questo sotto-insieme, S_i e S_j . Fissati questi due valori, sommiamo su tutte le configurazioni degli spin interni.

$$Z_{i,j}(S_i, S_j) = \sum_{\{s_k\}_{i < k < j}} e^{-\beta H_{i,j}(\{s_k\})} \quad (4.3)$$

Questa funzione contiene molta più informazione rispetto alla funzione di partizione totale definita sulla stessa regione. Infatti, mentre la funzione di partizione complessiva fornisce un unico valore che tiene conto di tutte le configurazioni possibili, la funzione parziale mantiene esplicitamente la dipendenza dagli spin ai bordi.

Poiché ciascuno di essi può assumere due valori, $S_i, S_j \in \{+1, -1\}$, la funzione $Z_{i,j}(S_i, S_j)$ non rappresenta un solo numero ma un insieme di *quattro* valori distinti:

$$Z_{i,j}(S_i, S_j) \longrightarrow \begin{cases} Z_{i,j}(+1, +1), \\ Z_{i,j}(+1, -1), \\ Z_{i,j}(-1, +1), \\ Z_{i,j}(-1, -1). \end{cases}$$

Ciascuno di questi termini corrisponde al contributo statistico della regione compresa tra i e j sotto specifiche condizioni ai bordi. In questo senso, $Z_{i,j}$ può essere interpretata come una *matrice* 2×2 che codifica l'influenza reciproca tra i due spin estremi.

La funzione di partizione totale Z può essere recuperata da quella parziale. Ad esempio, considerando l'intera catena da $i = 1$ a $j = N$ e imponendo la condizione periodica $S_{N+1} = S_1$, si ha:

$$Z = \sum_{S_1} Z_{1,N}(S_1, S_1) \quad (4.4)$$

L'utilità della funzione di partizione parziale risiede nella possibilità di scrivere una relazione ricorsiva. Supponiamo di conoscere $Z_{i,j}(S_i, S_j)$ e di voler calcolare la funzione di partizione per una catena più lunga di uno spin, $Z_{i,j+1}(S_i, S_{j+1})$. Possiamo ottenerla aggiungendo l'interazione dello spin S_j con il nuovo spin S_{j+1} e sommando su tutti i possibili valori di S_j .

$$Z_{i,j+1}(S_i, S_{j+1}) = \sum_{S_j} Z_{i,j}(S_i, S_j) e^{\beta J S_j S_{j+1} + \beta h S_{j+1}} \quad (4.5)$$

Questo passaggio definisce implicitamente una "matrice" che trasferisce l'informazione dal passo j al passo $j + 1$. Tuttavia, l'espressione $e^{\beta J S_j S_{j+1} + \beta h S_{j+1}}$ non è simmetrica rispetto allo scambio degli indici j e $j + 1$, il che potrebbe portare ad autovalori complessi, complicando l'analisi.

Simmetrizzazione della Matrice di Trasferimento

Per ovviare al problema della simmetria, possiamo riscrivere in modo equivalente l'Hamiltoniana del sistema, distribuendo il campo magnetico locale h a metà su due interazioni adiacenti.

$$H(\underline{S}) = -J \sum_i S_i S_{i+1} - \frac{h}{2} \sum_i (S_i + S_{i+1}) \quad (4.6)$$

Con questa forma, il termine che si aggiunge a ogni passo diventa simmetrico. Definiamo quindi la **Matrice di Trasferimento** $T(S_j, S_{j+1})$ come:

$$T(S_j, S_{j+1}) = e^{\beta J S_j S_{j+1} + \frac{\beta h}{2} (S_j + S_{j+1})} \quad (4.7)$$

Essendo gli spin binari ($S = \pm 1$), questa può essere rappresentata come una matrice 2×2 , con righe indicizzate da S_j e colonne da S_{j+1} .

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta J + \beta h} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J - \beta h} \end{pmatrix} \quad (4.8)$$

Questa matrice è ora manifestamente simmetrica.

Funzione di Partizione e Autovalori

Utilizzando la matrice di trasferimento, la funzione di partizione totale per una catena di N spin con condizioni periodiche può essere espressa elegantemente come la traccia della potenza N -esima di T .

$$Z = \sum_{S_1, \dots, S_N} T(S_1, S_2) T(S_2, S_3) \cdots T(S_N, S_1) = \text{Tr}(T^N) \quad (4.9)$$

L'operazione di traccia implementa la chiusura del ciclo, ovvero l'identificazione di S_{N+1} con S_1 .

Poiché la matrice T è simmetrica, ammette due autovalori reali, λ_1 e λ_2 . La funzione di partizione diventa:

$$Z = \lambda_1^N + \lambda_2^N \quad (4.10)$$

Nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$), il termine dominante è quello associato all'autovalore più grande, che per convenzione chiamiamo λ_1 ($\lambda_1 > \lambda_2$).

$$Z \approx \lambda_1^N \quad (4.11)$$

L'energia libera di Helmholtz per spin, $f = -(\frac{1}{\beta N}) \log Z$, è quindi determinata unicamente dall'autovalore principale.

$$f = -\frac{1}{\beta} \log \lambda_1 \quad (4.12)$$

Questo risultato è di fondamentale importanza: la complessità di una somma su 2^N stati è stata ridotta al calcolo dell'autovalore più grande di una piccola matrice 2×2 . Svolgendo i calcoli per la matrice T , si ottiene:

$$\lambda_1 = e^{\beta J} \left[\cosh(\beta h) + \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right] \quad (4.13)$$

$$\lambda_2 = e^{\beta J} \left[\cosh(\beta h) - \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right] \quad (4.14)$$

L'espressione esatta per l'energia libera in presenza di campo magnetico è:

$$f = -J - \frac{1}{\beta} \log \left(\cosh(\beta h) + \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right) \quad (4.15)$$

Suscettività Magnetica e Funzioni di Correlazione

Avendo a disposizione l'energia libera per qualsiasi valore del campo h , possiamo calcolare la magnetizzazione m e la suscettività magnetica χ_m .

$$m = -\frac{\partial f}{\partial h} = \frac{\sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}} \quad (4.16)$$

Per campi piccoli ($h \rightarrow 0$), la magnetizzazione risponde linearmente, $m \approx \chi_m h$. La suscettività risulta:

$$\chi_m \approx \beta e^{2\beta J} \quad (4.17)$$

4.1.1 Teorema di Fluttuazione-Dissipazione

Esiste una relazione profonda e generale, nota come **Teorema di Fluttuazione-Dissipazione**, che collega la risposta di un sistema a una perturbazione esterna (la suscettività) alle fluttuazioni interne del sistema in equilibrio (la funzione di correlazione).

La suscettività è definita come $\chi = \frac{\partial m}{\partial h}$. Partendo dalla definizione di magnetizzazione media $\langle S_i \rangle$:

$$m = \frac{1}{N} \sum_i \langle S_i \rangle = \frac{1}{N} \sum_i \frac{\sum_S S_i e^{-\beta H}}{\sum_S e^{-\beta H}} \quad (4.18)$$

Derivando rispetto ad h , e ricordando che $H = H_0 - h \sum_j S_j$, otteniamo:

$$\chi = \frac{\partial}{\partial h} \left(\frac{1}{N} \sum_i \langle S_i \rangle \right) = \frac{\beta}{N} \sum_{i,j} (\langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle) \quad (4.19)$$

Sfruttando l'invarianza traslazionale del sistema, possiamo riscrivere la doppia somma come una singola somma sulla distanza relativa $r = j - i$:

$$\chi = \beta \sum_r (\langle S_0 S_r \rangle - \langle S_0 \rangle \langle S_r \rangle) = \beta \sum_r C(r) \quad (4.20)$$

La suscettività è proporzionale all'integrale (o somma) della funzione di correlazione connessa $C(r)$.

Dato che la funzione di correlazione per il modello di Ising 1D decade esponenzialmente con una forma del tipo $C(r) \propto e^{-|r|/\xi}$, possiamo approssimare la somma con un integrale nel continuo:

$$\sum_r C(r) \propto \int_{-\infty}^{+\infty} dr e^{-|r|/\xi} = 2 \int_0^{+\infty} dr e^{-r/\xi} = 2\xi \quad (4.21)$$

Questo mostra che la suscettività è direttamente proporzionale alla lunghezza di correlazione. Dai calcoli espliciti si trova che la lunghezza di correlazione è $\xi = \frac{1}{2} e^{2\beta J}$, che, inserita nella relazione precedente, ci porta a:

$$\chi_m \propto \beta(2\xi) = \beta \left(2 \cdot \frac{1}{2} e^{2\beta J} \right) = \beta e^{2\beta J} \quad (4.22)$$

Questo spiega perché χ_m diverge esponenzialmente a basse temperature: è un riflesso del fatto che la lunghezza di correlazione ξ sta divergendo.

4.1.2 Autovettori e il Loro Significato Fisico

La matrice di trasferimento contiene ancora più informazioni. Oltre agli autovalori, anche i suoi autovettori hanno un preciso significato fisico. Poiché T è simmetrica e reale, possiamo scomporla spettralmente:

$$T(S, \tilde{S}) = \lambda_1 v_1(S) v_1(\tilde{S}) + \lambda_2 v_2(S) v_2(\tilde{S}) \quad (4.23)$$

dove v_1 e v_2 sono gli autovettori ortonormali.

La probabilità marginale di trovare un singolo spin nello stato S_1 , $p(S_1)$, si ottiene sommando su tutti gli altri spin. Nel formalismo della matrice di trasferimento, questo porta a:

$$p(S_1) = \frac{T^N(S_1, S_1)}{Z} \quad (4.24)$$

Utilizzando la decomposizione spettrale e considerando il limite $N \rightarrow \infty$, dove λ_1 domina:

$$T^N(S_1, S_1) \approx \lambda_1^N v_1(S_1) v_1(S_1) \quad (4.25)$$

Poiché $Z \approx \lambda_1^N$, otteniamo un risultato notevole:

$$p(S_1) = [v_1(S_1)]^2 \quad (4.26)$$

Il quadrato delle componenti dell'autovettore principale fornisce le probabilità marginali dello spin. Per il modello di Ising, la probabilità marginale $p(S)$ di un singolo spin, parametrizzata tramite la magnetizzazione media $m = \langle S \rangle$, è data da:

$$p(S) = \begin{cases} \frac{1+m}{2} & , \text{ se } S = +1 \\ \frac{1-m}{2} & , \text{ se } S = -1 \end{cases} \quad (4.27)$$

Gli autovettori, quindi, assumono la forma:

$$v_1 = \left(\sqrt{\frac{1+m}{2}}, \sqrt{\frac{1-m}{2}} \right), \quad v_2 = \left(\sqrt{\frac{1-m}{2}}, -\sqrt{\frac{1+m}{2}} \right) \quad (4.28)$$

È facile dimostrare che:

$$\begin{aligned} v_1^2(s) &= \frac{1+ms}{2} \\ \sum_{s=\{\pm 1\}} v_{1,2}^2(s) &= 1 \\ \sum_{s=\{\pm 1\}} s v_1(s) v_1(s) &= m \end{aligned} \quad (4.29)$$

$$\sum_{s=\{\pm 1\}} s v_1(s) v_2(s) = \sqrt{1-m^2} \quad (4.30)$$

4.1.3 Funzione di Correlazione

Il secondo autovalore, λ_2 , che finora non abbiamo utilizzato, gioca un ruolo cruciale nel determinare il decadimento della funzione di correlazione. Per dimostrarlo, calcoliamo il valore di aspettazione $\langle S_i S_j \rangle$ utilizzando il formalismo della matrice di trasferimento. L'idea è di inserire gli operatori di spin S_i e S_j nella catena di matrici che costituisce la funzione di partizione.

$$\langle S_i S_j \rangle = \frac{\sum_{\underline{S}} S_i S_j e^{-\beta H}}{Z} = \frac{1}{Z} \text{Tr} (T \cdots T S_i T \cdots T S_j T \cdots T) \quad (4.31)$$

Raggruppando i prodotti di matrici, l'espressione diventa:

$$\langle S_i S_j \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{S_i, S_j} S_i T^{j-i}(S_i, S_j) S_j T^{N-(j-i)}(S_j, S_i) \quad (4.32)$$

Per semplicità e sfruttando l'invarianza traslazionale, poniamo $i = 0$ e $j = r$. L'espressione da calcolare è quindi:

$$\langle S_0 S_r \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{S_0, S_r} S_0 T^r(S_0, S_r) S_r T^{N-r}(S_r, S_0) \quad (4.33)$$

Ora sostituiamo la decomposizione spettrale di $T^k(S, \tilde{S}) = \sum_{\alpha=1,2} \lambda_\alpha^k v_\alpha(S) v_\alpha(\tilde{S})$ all'interno della somma. L'espressione diventa un prodotto di quattro termini, due per T^r e due per T^{N-r} .

$$\begin{aligned} \langle S_0 S_r \rangle = Z^{-1} \sum_{S_0, S_r} S_0 (\lambda_1^r v_1(S_0) v_1(S_r) + \lambda_2^r v_2(S_0) v_2(S_r)) \times \\ S_r (\lambda_1^{N-r} v_1(S_r) v_1(S_0) + \lambda_2^{N-r} v_2(S_r) v_2(S_0)) \end{aligned} \quad (4.34)$$

Nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$), consideriamo che $Z \approx \lambda_1^N$. I termini dominanti nella somma sono quelli che contengono λ_1^N . Si hanno due contributi principali:

1. Il prodotto dei termini con λ_1 da entrambe le parentesi.
2. I prodotti "incrociati" che combinano λ_1^r con λ_2^{N-r} e λ_2^r con λ_1^{N-r} .

Analizziamo il primo contributo:

$$Z^{-1} \lambda_1^r \lambda_1^{N-r} \left(\sum_{S_0} S_0 v_1(S_0)^2 \right) \left(\sum_{S_r} S_r v_1(S_r)^2 \right) \quad (4.35)$$

Poiché $Z \approx \lambda_1^N$, il fattore λ_1^N si cancella. Ricordando che $v_1(S)^2 = p(S)$, le somme non sono altro che il valore medio dello spin, $\langle S \rangle = m$. Questo termine è quindi m^2 , ovvero $\langle S_0 \rangle \langle S_r \rangle$.

Analizziamo ora uno dei termini incrociati (l'altro è identico):

$$Z^{-1} \lambda_2^r \lambda_1^{N-r} \left(\sum_{S_0} S_0 v_2(S_0) v_1(S_0) \right) \left(\sum_{S_r} S_r v_2(S_r) v_1(S_r) \right) \quad (4.36)$$

Il fattore $Z^{-1} \lambda_1^{N-r} = (\lambda_1^N)^{-1} \lambda_1^{N-r} = \lambda_1^{-r}$ si combina con λ_2^r per dare $(\frac{\lambda_2}{\lambda_1})^r$. Le due somme sono identiche e il loro quadrato è $(\sum_S S v_1(S) v_2(S))^2$. Svolgendo il calcolo si trova che questo termine vale $(1 - m^2)$.

Mettendo insieme i pezzi, otteniamo che la funzione di correlazione connessa, $C^c(r) = \langle S_0 S_r \rangle - \langle S_0 \rangle \langle S_r \rangle$, è data dal solo termine incrociato:

$$C(r) = (1 - m^2) \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^r \quad (4.37)$$

Questo risultato è fondamentale: dimostra che la correlazione decade esponenzialmente con la distanza r . Il tasso di decadimento è controllato dal rapporto tra il secondo e il primo autovalore, definendo una **lunghezza di correlazione** ξ :

$$C(r) \propto e^{-r/\xi} \quad \text{con} \quad \xi = -\frac{1}{\log(|\lambda_2/\lambda_1|)} \quad (4.38)$$

Un punto critico, dove le correlazioni diventano a lungo raggio ($\xi \rightarrow \infty$), corrisponde alla situazione in cui i due autovalori diventano degeneri, $\lambda_2 \rightarrow \lambda_1$.

Lezione 5

Data: 10/10/2025

5.1 Metodo della Matrice di Trasferimento 1D

Usando il metodo della matrice di trasferimento, si possono calcolare le proprietà di un sistema 1D.

L'energia libera è data dal primo autovalore λ_1 :

$$f = -T \log(\lambda_1) \quad (5.1)$$

La funzione di correlazione $C(r)$ tra due spin a distanza r decade esponenzialmente:

$$C(r) = (1 - m^2) \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^r \propto e^{-r/\xi} \quad (5.2)$$

Dove ξ è la lunghezza di correlazione:

$$\xi = \frac{1}{\log\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)} \quad (5.3)$$

Il rapporto degli autovalori per il modello di Ising 1D è:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\cosh(\beta h) + \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}}{\cosh(\beta h) - \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}} \quad (5.4)$$

Se $T \ll 1$ si ha:

$$\xi \approx \frac{1}{2\beta h} \quad (5.5)$$

La lunghezza di correlazione ξ diverge (indicando una transizione di fase) solo se $h = 0$ e $T \rightarrow 0$. Se $h \neq 0$, la lunghezza di correlazione è sempre finita e dipende dal campo esterno. La presenza di un campo esterno pone un cut-off sulla correlazione: il sistema è meno correlato.

5.2 Modello di Curie-Weiss

Si considera un modello di Ising definito su un **grafo completo** (ovvero ogni nodo è connesso a tutti gli altri). L'Hamiltoniana è data da:

$$H(S) = -J \sum_{i < j} s_i s_j - h \sum_i s_i \quad (5.6)$$

Per garantire che l'energia sia estensiva, poniamo $J = 1/N$. In questa approssimazione, ogni spin interagisce con la media di tutti gli altri.

Possiamo approssimare il termine di interazione:

$$\sum_{i < j} s_i s_j \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i s_i \right) \left(\sum_j s_j \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_i s_i \right)^2$$

Definendo la magnetizzazione totale $M = \sum_i s_i$ e la magnetizzazione per spin $m = M/N$, l'Hamiltoniana (in questa approssimazione di campo medio) diventa:

$$H(S) \approx -\frac{1}{2N} \left(\sum_i s_i \right)^2 - h \sum_i s_i = -\frac{1}{2N} M^2 - hM \quad (5.7)$$

Riscrivendo in termini di m , l'Hamiltoniana dipende solo da m :

$$H = N \left(-\frac{m^2}{2} - hm \right) \quad (5.8)$$

Definiamo l'energia per spin:

$$\mathcal{E}(m) = -\frac{1}{2} m^2 - hm \quad (5.9)$$

Funzione di Partizione

Calcoliamo la funzione di partizione $Z = \sum_S e^{-\beta H(S)}$. Effettuiamo un cambio di variabile, passando dalla somma su tutte le configurazioni $\{S\}$ alla somma sulla magnetizzazione totale M :

$$Z = \sum_{M=-N}^N e^{-\beta H(M)} \cdot \#(\vec{S} : \sum_i s_i = M) \quad (5.10)$$

Il termine $\#(\vec{S} : \sum_i s_i = M)$ è il numero di configurazioni con M fissato. Questo è un problema combinatorio. Il numero di spin "up" è $N_{\uparrow} = \frac{N+M}{2}$ e "down" è $N_{\downarrow} = \frac{N-M}{2}$.

$$\#(\vec{S} : \sum_i s_i = M) = \binom{N}{\frac{N+M}{2}} \quad (5.11)$$

Usando l'approssimazione di Stirling per $N \rightarrow \infty$, questo termine può essere scritto come $\exp(N \cdot s(m))$, dove $s(m)$ è l'entropia per spin:

Equazione per Spin

$$s(m) = - \left[\frac{1+m}{2} \log \left(\frac{1+m}{2} \right) + \frac{1-m}{2} \log \left(\frac{1-m}{2} \right) \right] \quad (5.12)$$

La funzione di partizione (nel continuo) diventa:

$$Z \approx \int_{-1}^1 dm \exp [N(-\beta \mathcal{E}(m) + s(m))] \quad (5.13)$$

Definiamo l'energia libera di Helmholtz per spin $f(m)$:

$$f(m) = \mathcal{E}(m) - Ts(m) \quad (5.14)$$

La funzione di partizione può essere riscritta come:

$$Z \approx \int dm e^{-N\beta f(m)} \quad (5.15)$$

Per N grande, questo integrale è dominato dal valore m^* che minimizza $f(m)$ (**metodo del punto di sella**). L'energia libera che domina la termodinamica f_{th} è data da questo minimo:

$$f_{th} = \min_m f(m) = \mathcal{E}(m^*) - Ts(m^*) \quad (5.16)$$

La funzione $f(m)$ (energia libera) contiene informazioni su tutte le configurazioni (anche quelle meno probabili), mentre $f_{th} = \min f(m)$ è l'energia libera termodinamica.

Equazione di Autoconsistenza

Per trovare il minimo m^* , deriviamo $f(m)$ rispetto a m e poniamo la derivata a zero:

$$m^* : \left. \frac{\partial f}{\partial m} \right|_{m^*} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial m} = -m - h + T \cdot \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+m}{1-m} \right) = 0 \quad (5.17)$$

Usando la relazione $\operatorname{arctanh}(m) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+m}{1-m} \right)$, otteniamo l'equazione di autoconsistenza (o equazione del punto di sella):

Equazione di Autoconsistenza

$$m^* = \tanh [\beta(m^* + h)] \quad (5.18)$$

Analisi delle Soluzioni e Transizione di Fase

Per $h = 0$: L'equazione diventa $m = \tanh(\beta m)$. Questa equazione può avere una o tre soluzioni.

- Se $T > T_c$ (alta temperatura): L'unica soluzione è $m = 0$. L'energia libera $f(m)$ ha un solo minimo in $m = 0$.
- Se $T < T_c$ (bassa temperatura): Ci sono tre soluzioni: $m = 0$ (massimo locale, instabile) e due soluzioni simmetriche $\pm m^* \neq 0$. Queste sono i minimi di $f(m)$ e rappresentano uno stato con magnetizzazione spontanea.

Questo fenomeno, per cui il sistema sceglie una delle due soluzioni $\pm m^*$ per $T < T_c$, è la **rottura spontanea della simmetria**.

Nel punto di transizione del secondo ordine (per $h = 0, T = T_c$), si osservano una serie di fenomeni concomitanti (metastabilità, transizione di fase, divergenza della suscettività, ecc.).

github . com / elisabettagnello

Lezione 6

Data: 16/10/2025

6.1 Modello di Curie-Weiss

L'Hamiltoniana del modello di Curie-Weiss è data da:

$$H = -\frac{1}{N} \sum_{i < j} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (6.1)$$

L'energia libera (di Landau), in funzione del parametro d'ordine m è:

$$f(m) = -\frac{m^2}{2} - hm - Ts(m) \quad (6.2)$$

dove $s(m)$ è il termine entropico:

$$s(m) = -\frac{1+m}{2} \log\left(\frac{1+m}{2}\right) - \frac{1-m}{2} \log\left(\frac{1-m}{2}\right) \quad (6.3)$$

Abbiamo tracciato un diagramma di fase nel piano (h, T) . In questo piano è identificata una linea, chiamata **linea spinodale**, tale che:

- All'interno della regione delimitata dalla linea spinodale, l'energia libera $f(m)$ presenta tre punti stazionari: due minimi e un massimo.
- All'esterno di tale regione, $f(m)$ ha un solo minimo.




Figura 6.1: La linea verde sull'asse $h = 0$ per $T < T_c$ indica la transizione del primo ordine. La linea tratteggiata rappresenta la linea spinodale.

Energia Libera Termodinamica

Definiamo l'**energia libera termodinamica** f_{th} come il minimo assoluto della funzione $f(m)$ rispetto a m nell'intervallo $[-1, 1]$:

$$f_{th}(T, h) = \min_{m \in [-1, 1]} f(m; T, h) \quad (6.4)$$

Questa f_{th} è la funzione che descrive la termodinamica del sistema. Finché N è finito, tutto è regolare. Tuttavia, nel limite $N \rightarrow \infty$, possono svilupparsi delle singolarità.

La funzione $f(m)$ di per sé è analitica. La singolarità non nasce da $f(m)$, ma dall'operazione di min. Essendoci potenzialmente più soluzioni (più minimi), quando il minimo assoluto "passa" da una soluzione (un ramo) all'altra, si possono verificare cambiamenti drastici che introducono singolarità (la continuazione analitica da un ramo all'altro non è possibile).

Definiamo m_{th} (o m^*) come il valore che minimizza $f(m)$:

$$m_{th} = \operatorname{argmin}_{m \in [-1, 1]} f(m) \quad (6.5)$$

Questo m_{th} è la soluzione dell'equazione di punto sella:

$$m^* = \tanh(\beta(m^* + h)) \quad (6.6)$$

6.1.1 Transizione del Primo Ordine

Lungo tutta la regione $h = 0$ con $T < T_c$ (la linea verde nella Figura 6.1), la funzione f_{th} ha una singolarità nella sua **derivata prima**. Questa è definita come una **transizione di fase del primo ordine**.

La derivata prima dell'energia libera non è definita in quei punti. In particolare, il limite venendo da $h > 0$ e il limite venendo da $h < 0$ assumono valori diversi.

Ricordiamo che la magnetizzazione termodinamica è legata alla derivata dell'energia libera:

$$m_{th} = -\frac{\partial f_{th}}{\partial h} \quad (6.7)$$

Se tracciamo m_{th} in funzione di T e h (Figura 6.2), vediamo una superficie che presenta un "taglio" o "salto" lungo l'asse $h = 0$ per $T < T_c$.




Figura 6.2: Rappresentazione della superficie della magnetizzazione termodinamica $m_{th}(T, h)$, evidenziando la discontinuità (salto) lungo l'asse $h = 0$ per $T < T_c$.

Muovendosi a T fissa, quando si attraversa $h = 0$, la magnetizzazione m_{th} fa un salto discontinuo (es. da un valore positivo a uno negativo).

Se m_{th} ha un salto, significa che la derivata prima $\partial f_{th}/\partial h$ ha un salto. Questo implica che la derivata prima non è ben definita, poiché i limiti destro e sinistro non coincidono:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\partial f_{th}}{\partial h} \neq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\partial f_{th}}{\partial h} \quad (\text{per } T < T_c) \quad (6.8)$$

6.1.2 Transizione del Secondo Ordine

Il punto finale di questo luogo di singolarità del primo ordine, cioè il punto $(h = 0, T = T_c)$, è una singolarità del **secondo ordine**. Questa è chiamata **transizione di fase del secondo ordine** (o transizione critica).

Il fatto che alla fine di una linea di singolarità della derivata prima ci sia un punto con singolarità della derivata seconda è una necessità analitica. Lo si può capire visualizzando il grafico di m_{th} (Figura 6.2): man mano che ci si sposta lungo la linea $h = 0$ verso T_c , il "salto" (la discontinuità) nella magnetizzazione si stringe. Al punto critico T_c , il salto si chiude e m_{th} diventa continua. Tuttavia, nel momento esatto in cui il salto si chiude, la derivata $\partial m_{th}/\partial h$ (che è la derivata seconda di f_{th}) diventa infinita.

$$\frac{\partial^2 f_{th}}{\partial h^2} = \frac{\partial m_{th}}{\partial h} = \infty \quad (\text{per } h = 0, T = T_c) \quad (6.9)$$

Prima di diventare regolare (analitica) per $T > T_c$, la funzione passa per questo punto critico in cui la derivata seconda diverge.

6.2 Stati Stabili, Metastabili e Instabili

Analizziamo il sistema a $T < T_c$ fissata e muoviamoci in $h \neq 0$. Vogliamo plottare tutte le soluzioni m^* dell'equazione di punto sella. Risolvere $m^*(h)$ è difficile, ma possiamo plottare $h(m^*)$ parametricamente:

$$h = T \operatorname{arctanh}(m^*) - m^* \quad (6.10)$$

Plottando h in funzione di m^* (scambiando gli assi), si ottiene la caratteristica curva a "S" (Figura 6.3).




Figura 6.3: Soluzioni dell'equazione di punto sella in funzione del campo (per $T < T_c$).

Dobbiamo dare un significato a questi rami di soluzioni:

1. **Stato Stabile:** È la soluzione m^* che corrisponde al minimo globale di $f(m)$. Questa è la soluzione termodinamica m_{th} . Per $h > 0$, è il ramo con $m > 0$; per $h < 0$, è il ramo con $m < 0$.
2. **Stato Metastabile:** È la soluzione m^* che corrisponde a un minimo locale di $f(m)$, ma non globale.
3. **Stato Instabile:** È la soluzione m^* che corrisponde a un massimo locale di $f(m)$.

Per visualizzarlo, tracciamo $f(m)$ vs m (Figura 6.4). Per $T < T_c$ e h leggermente positivo, $f(m)$ avrà:

- Un **minimo globale (stabile)** a $m > 0$.
- Un **minimo locale (metastabile)** a $m < 0$.
- Un **massimo locale (instabile)** tra i due.




Figura 6.4: Andamento dell'energia libera $f(m)$ per $T < T_c$ e $h > 0$.

Per **stato osservabile** intendiamo uno stato con tempi di vita grandi, che sopravvive su scale temporali umane:

- Se $\frac{\partial f}{\partial m} \neq 0$, il sistema cambia stato su tempi microscopici e non è osservabile.
- Uno stato osservabile deve avere $\frac{\partial f}{\partial m} = 0$.

Questo giustifica la focalizzazione sui punti stazionari, che possono essere di natura diversa (stabili, instabili, metastabili). Un punto **metastabile** è un minimo locale: il sistema, pur non trovandosi nello stato termodinamicamente dominante, risulta stabile rispetto a piccole perturbazioni e può permanere a lungo “intrappolato” in quella configurazione.

Per passare dallo stato metastabile a quello stabile, il sistema deve superare la barriera di energia rappresentata dallo stato instabile (Figura 6.4). Se Δ è la differenza di energia libera tra lo stato instabile e lo stato metastabile, la probabilità di trovarsi sulla cima della barriera è:

$$\frac{P(\text{instabile})}{P(\text{metastabile})} \approx e^{-\beta N \Delta} \quad (6.11)$$

Nei modelli a campo medio, il tempo per superare la barriera scala esponenzialmente con N , diventando infinito nel limite termodinamico. Questo è fondamentale per capire sistemi come i vetri (che sono sistemi metastabili che evolvono su tempi lunghissimi).

Le transizioni del primo ordine (acqua-ghiaccio) sono più comuni e mostrano coesistenza di stati (stabile e metastabile), i due minimi hanno esattamente la stessa energia libera.

6.3 Ciclo di Isteresi e Punti Spinodali

Il concetto di metastabilità è alla base del fenomeno dell'**isteresi**. Consideriamo la caratteristica curva a "S" (Figura 6.3):

1. Partiamo da h molto grande (positivo): il sistema è nello stato stabile $m > 0$.
2. Abbassiamo il campo h : la magnetizzazione segue il ramo stabile.
3. Attraversiamo $h = 0$ e andiamo a h leggermente negativo: il sistema non salta immediatamente allo stato termodinamico (che ora sarebbe $m < 0$), ma rimane "agganciato" al ramo $m > 0$, che ora è diventato **metastabile**.
4. Il sistema segue il ramo metastabile fino a che quel ramo esiste.

Uno sperimentatore osserva quindi una **magnetizzazione residua** non nulla a campo quasi nullo. Il punto in cui il ramo metastabile cessa di esistere è chiamato **punto spinodale**.

5. Raggiunto il punto spinodale, la soluzione metastabile scompare, e il sistema deve "saltare" bruscamente all'unico stato stabile rimasto (quello $m < 0$).
6. Se ora invertiamo il processo (da h negativo a h positivo), il sistema tratterà un percorso simmetrico, saltando dall'altro punto spinodale.

Questo percorso chiuso è il **ciclo di isteresi**.




Figura 6.5: Energia libera $f(m^*; T, h)$ delle soluzioni stazionarie in funzione di h . I rami più bassi rappresentano lo stato stabile. I rami superiori sono gli stati metastabili e instabili.

6.3.1 Criticità nei Punti Spinodali

Un sistema è **critico** quando è estremamente suscettibile: una piccola perturbazione (cambiamento di h) causa una risposta macroscopica (cambiamento di m).

- Al punto di transizione termodinamica ($h = 0, T < T_c$), il sistema non è critico. Se perturbo h di poco, m cambia di poco (rimane sullo stesso ramo).
- Ai **punti spinodali**, il sistema è critico. Arrivando al punto spinodale, un cambiamento infinitesimo di h causa un salto macroscopico di m .

Criticità nelle transizioni del primo ordine

Nelle transizioni del primo ordine, il punto di transizione termodinamica e il punto critico (spinodale) sono separati.

6.3.2 Caratterizzazione Analitica dei Punti Spinodali

Il punto spinodale è un punto in cui la funzione $f(m)$ sviluppa un **flesso a tangente orizzontale**. Le condizioni analitiche per il punto spinodale sono:

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 0 \quad (\text{è uno "stato", un punto stazionario}) \quad (6.12)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} = 0 \quad (\text{è "critico", la curvatura è nulla}) \quad (6.13)$$

La derivata seconda è proporzionale all'inverso della suscettività locale; quando $\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} \rightarrow 0$ la suscettività diverge: il sistema è estremamente piatto e suscettibile alle fluttuazioni.

6.4 Punti Critici in una Transizione del Secondo Ordine

Torniamo ora al punto di transizione del secondo ordine ($h = 0, T = T_c$). Questo punto è speciale perché la linea spinodale (luogo dei punti critici) interseca l'asse della transizione termodinamica ($h = 0$).

Criticità nelle transizioni del secondo ordine

In una transizione del secondo ordine i concetti di criticità, transizione termodinamica e rottura spontanea della simmetria coincidono.

Per parlare di rottura spontanea della simmetria, dobbiamo essere a $h = 0$, altrimenti la simmetria Z_2 ($S_i \rightarrow -S_i$) è rotta "a mano" dal campo esterno.

A $h = 0$, $f(m)$ è una funzione pari. Analizziamo $f(m)$ vs m (Figura 6.6):

- $T > T_c$: $f(m)$ ha un singolo minimo in $m = 0$ (stato paramagnetico simmetrico). La derivata seconda $\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} > 0$.
- $T = T_c$: Il minimo in $m = 0$ si appiattisce. Questo è il punto critico con $\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} = 0$.

- $T < T_c$: Lo stato simmetrico $m = 0$ diventa un massimo locale ($\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} < 0$), cioè diventa instabile. Il sistema deve "scegliere" spontaneamente uno dei due nuovi minimi globali simmetrici ($+m^*$ o $-m^*$). Questa è la rottura spontanea della simmetria.




Figura 6.6: Energia libera $f(m)$ a $h = 0$ al variare della temperatura, illustrando la rottura spontanea della simmetria.

6.5 Criticità nel Modello XY

Si tende a pensare che, una volta rotta la simmetria ($T < T_c$), il sistema non sia più critico (infatti nei minimi $m \neq 0$ del modello di Ising, $\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} > 0$). Questa è una semplificazione dovuta alla simmetria Z_2 . Consideriamo un modello con simmetria più ricca, come il **Modello XY**, dove $m \in \mathbb{R}^2$.

- $T > T_c$: L'energia libera è un paraboloide con minimo in $m = (0, 0)$.
- $T < T_c$: Avviene la rottura spontanea della simmetria. L'energia libera assume la forma a **"cappello messicano"** (Sombrero).

Il sistema rompe la simmetria scegliendo un punto sul fondo del cappello ($|m| = m^* > 0$). Tuttavia, il sistema rimane critico rispetto alle perturbazioni lungo il fondo del cappello. Muoversi lungo quella direzione (cambiare l'angolo θ di m) non costa energia. Esistono dei **modi di Goldstone** che mantengono il sistema critico anche nella fase a simmetria rotta.

Questo è fondamentale nei sistemi disordinati (spin glass), che possono avere una transizione di fase e rimanere critici (suscettibili) anche nella fase "fredda" (vetrosa).

6.6 Modello 3-Spin

Consideriamo interazioni non a 2 corpi, ma a 3 corpi (modello P-spin, con $P = 3$).

L'Hamiltoniana (fully-connected) è:

$$H = -\frac{1}{N^2} \sum_{i < j < k} S_i S_j S_k \quad (6.14)$$

La normalizzazione $1/N^2$ è necessaria perché la somma ha $\mathcal{O}(N^3)$ termini.

Questa Hamiltoniana **non** ha la simmetria Z_2 . Se $S_i \rightarrow -S_i$, allora $H \rightarrow -H$. Non ci può essere rottura spontanea di simmetria.

Approssimando h :

$$H \approx -\frac{N}{6} \left(\frac{1}{N} \sum S_i \right)^3 = -\frac{Nm^3}{6} \quad (6.15)$$

L'energia libera diventa:

$$f(m) = -\frac{m^3}{6} - Ts(m) \quad (6.16)$$

L'equazione di punto sella è:

$$-\frac{m^2}{2} + T \operatorname{arctanh}(m) = 0 \quad (6.17)$$

- $m = 0$ è sempre una soluzione.
- Esiste una temperatura spinodale T_s sotto la quale compaiono due nuove soluzioni $m \neq 0$.
- Esiste una temperatura T_1 (con $T_1 < T_s$) dove l'energia libera della soluzione $m = 0$ e quella della soluzione $m \neq 0$ si incrociano.

Abbassando la temperatura, a T_1 , il sistema **salta** discontinuamente da $m = 0$ a $m \neq 0$. Questa è una transizione del primo ordine **in temperatura**.

Di nuovo, il punto di transizione termodinamica (T_1) non è critico. L'unico punto critico è il **punto spinodale** (T_s), dove nasce la soluzione $m \neq 0$. Questo dimostra che interazioni a più corpi producono spontaneamente metastabilità e transizioni del primo ordine.

In natura, le forze fondamentali sono a 2 corpi (gravitazionale, elettromagnetica). Tuttavia, nei sistemi complessi (vetri, polimeri, sistemi biologici), si usano **teorie effettive**. Integrando via via gradi di libertà (es. con il gruppo di rinormalizzazione), le interazioni a 2 corpi generano interazioni efficaci a 3, 4, o più corpi.

6.7 Modello di Potts

Un altro modo per generare transizioni del primo ordine è mantenere l'interazione a 2 corpi, ma aumentare il numero di stati microscopici (da $q = 2$ di Ising a $q > 2$). Definiamo il **Modello di Potts**: $x_i \in \{1, 2, \dots, q\}$. L'Hamiltoniana è:

$$H = -\frac{1}{N} \sum_{i < j} \delta_{x_i, x_j} \quad (6.18)$$

- Per $q = 2$, si recupera il modello di Ising (transizione del secondo ordine).
- Per $q > 2$, il modello presenta una **transizione del primo ordine** in temperatura.

Questo modello presenta **due** punti spinodali in temperatura: un punto spinodale per lo stato ferromagnetico ed uno per lo stato paramagnetico (lo stato $m = 0$ stesso diventa instabile sotto una certa T).

Lezione 7

Data: 17/10/2025

7.1 Ergodicità e Dinamica dei Sistemi

Nello studio della meccanica statistica dei sistemi complessi, il punto di partenza per comprendere la dinamica è il concetto di **ergodicità**. Un sistema si definisce ergodico se, durante la sua evoluzione temporale, è in grado di visitare tutti i microstati accessibili nello spazio delle fasi con una frequenza proporzionale alla loro probabilità termodinamica (distribuzione di Boltzmann). In termini pratici, questo implica l'equivalenza tra media temporale e media d'insieme (statistica).

Tuttavia, quando studiamo sistemi reali o simulazioni, dobbiamo confrontarci con due scale temporali fondamentali:

1. **Tempo di osservazione (t_{obs}):** Il tempo fisico o computazionale che abbiamo a disposizione per misurare le proprietà del sistema.
2. **Tempo ergodico (t_{erg}):** Il tempo caratteristico necessario al sistema per esplorare l'intero spazio delle fasi, superando eventuali barriere di potenziale.

Un sistema si definisce ergodico, quindi, quando il tempo ergodico è comparabile con il tempo di osservazione.

Se $t_{obs} \ll t_{erg}$, il sistema si trova in una condizione di **rottura dell'ergodicità** (o ergodicità rotta). Il sistema rimane confinato ("intrappolato") in una sottoregione dello spazio delle fasi (uno stato metastabile) e le medie misurate non corrisponderanno a quelle termodinamiche di equilibrio. Questo fenomeno è noto come *critical slowing down* quando ci si avvicina a una transizione di fase.

7.1.1 Barriere Energetiche ed Entropiche

Il meccanismo che impedisce al sistema di esplorare lo spazio delle fasi è la presenza di barriere nell'energia libera. Possiamo classificarle in due tipi:

- **Barriere Energetiche:** Sono ostacoli dovuti a un aumento dell'energia interna U (come in un sistema a doppia buca). Per superarle, il sistema deve attendere una fluttuazione termica sufficiente. Il tempo di scavalco segue tipicamente la legge di Arrhenius:

$$\tau \sim \tau_0 e^{\left(\frac{\Delta U}{k_B T}\right)} \quad (7.1)$$

Se siamo a basse temperature o se la barriera è molto alta, il tempo di esplorazione diventa enorme. In tal caso, il sistema rimane intrappolato in una regione dello spazio delle fasi e l'ergodicità è rotta (o richiede tempi infiniti).

- **Barriere Entropiche:** Queste barriere non sono dovute a "muri" di energia, ma alla vastità dello spazio delle fasi. Immaginate un paesaggio energetico piatto (un "flat landscape"), simile a un campo da golf o al deserto del Sahara.

In una barriera entropica, il sistema non "vede" il gradiente di energia che lo guiderebbe verso il minimo. Deve muoversi per pura diffusione in uno spazio ad alta dimensionalità. Sebbene non ci siano muri energetici da scalare, la probabilità di imboccare casualmente la "strada stretta" che porta al minimo è esponenzialmente piccola. In questi casi, è l'entropia (il numero di stati) a intrappolare il sistema, non l'energia.

7.1.2 Modello a 3-Spin

Un esempio illuminante per comprendere la differenza tra barriere energetiche ed entropiche è il modello di spin con interazione a 3 corpi (p-spin con $p = 3$). L'Hamiltoniana (in approssimazione di campo medio) dipende dalla magnetizzazione m come:

$$H(m) \approx -N \frac{m^3}{6} \quad (7.2)$$

Confrontiamo la dinamica di rilassamento verso il minimo (ferromagnetico, $m = 1$) partendo da uno stato disordinato ($m \approx 0$):

- **Modello a 2-spin (Curie-Weiss):** L'energia è $e(m) \sim -m^2$. La forza termodinamica è $F = -\frac{\partial e}{\partial m} \sim m$. Vicino a zero, c'è una pendenza lineare che "spinge" il sistema verso l'ordine.
- **Modello a 3-spin:** L'energia è $e(m) \sim -m^3$. La forza è $F = -\frac{\partial e}{\partial m} \sim m^2$.

Nel caso a 3-spin, vicino a $m = 0$, la forza è nulla al primo ordine (la funzione è estremamente piatta). Il sistema, trovandosi in $m = 0$, non percepisce alcuna spinta verso $m = 1$. Anche se lo stato ordinato esiste ed è energeticamente favorevole, il sistema rimane bloccato in $m = 0$ a causa della barriera entropica: non sa in che direzione muoversi perché il paesaggio è localmente piatto.

7.1.3 Modello di Potts

Il modello di Potts è una generalizzazione del modello di Ising in cui ogni spin S_i può assumere q valori discreti (chiamati spesso "colori"): $S_i \in \{1, 2, \dots, q\}$. L'Hamiltoniana è definita come:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \delta_{S_i, S_j} \quad (7.3)$$

dove δ è la delta di Kronecker (l'energia diminuisce se due spin vicini hanno lo stesso colore).

L'ordine della transizione di fase nel modello di Potts dipende dal numero di stati q :

- Per $q = 2$: Il modello è isomorfo al modello di Ising. La transizione è del **secondo ordine** (continua).
- Per $q > 2$: La transizione diventa del **primo ordine** (discontinua).

Consideriamo il caso $q = 3$ (o superiore). Analizzando l'energia libera in funzione del parametro d'ordine m (che misura quanto un colore prevale sugli altri), si osserva un fenomeno di coesistenza di fasi. Esistono due temperature critiche "locali" chiamate **punti spinodali**, oltre alla temperatura di transizione termodinamica T_c :

1. **Spinodale Paramagnetica** (T_{sp}^+): Raffreddando il sistema, a questa temperatura appare per la prima volta un minimo locale (metastabile) corrispondente alla fase ordinata (ferromagnetica), mentre il minimo globale è ancora quello disordinato ($m = 0$).
2. **Spinodale Ferromagnetica** (T_{sp}^-): Riscaldando il sistema, a questa temperatura il minimo ferromagnetico diventa instabile e scompare.

Tra queste due temperature, il sistema mostra **isteresi** e metastabilità. La transizione avviene "a salto" quando l'energia libera dei due minimi si incrocia a T_c .

7.1.4 Nucleazione in Sistemi a Taglia Finita

Nei modelli di campo medio ($N \rightarrow \infty$), le barriere di energia libera tra stati metastabili e stabili scalano con N ($\Delta F \propto N$). Questo implica che il tempo di vita dello stato metastabile diverge ($\tau \sim e^N$), rendendo la metastabilità eterna: l'ergodicità è rotta rigorosamente.

Nei sistemi reali a dimensione finita d (Finite Size Systems), la barriera è finita e il sistema può "scappare" dallo stato metastabile tramite il meccanismo della **nucleazione**. Immaginiamo di formare una "goccia" (droplet) di raggio R della fase stabile all'interno della fase metastabile. La variazione di energia libera ha due contributi:

$$\Delta F(R) \sim \sigma R^{d-1} - \Delta f \cdot R^d \quad (7.4)$$

- **Termine di Superficie** ($+\sigma R^{d-1}$): Costo energetico dovuto alla tensione superficiale σ tra le due fasi. Sfavorisce la goccia.
- **Termine di Volume** ($-\Delta f \cdot R^d$): Guadagno energetico dovuto al fatto che la fase interna alla goccia è termodinamicamente più stabile. Favorisce la goccia.

Esiste un **raggio critico** R_c .

- Se $R < R_c$, il costo superficiale domina: la goccia tende a riassorbirsi.
- Se $R > R_c$, il guadagno di volume vince: la goccia cresce spontaneamente e invade tutto il sistema.

In dimensione finita, la barriera $\Delta F(R_c)$ è finita, quindi c'è sempre una probabilità non nulla che una fluttuazione termica crei una goccia critica. La metastabilità, in senso stretto, non esiste in sistemi a range finito (il sistema alla fine decade), ma i tempi possono essere astronomici.

7.2 Sistemi Disordinati

I sistemi disordinati sono caratterizzati da un'Hamiltoniana i cui parametri non sono costanti, ma variabili casuali estratte da una certa distribuzione di probabilità. L'Hamiltoniana generica è:

$$H(\vec{S}) = - \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} S_i S_j - \sum_i h_i S_i \quad (7.5)$$

Nei sistemi disordinati l'Hamiltoniana non è unica, ma esiste un ensemble di Hamiltoniane a causa delle variabili casuali.

Il disordine può manifestarsi in:

- **Disordine nei legami (J_{ij}):** È il caso dei **Vetri di Spin** (Spin Glasses). Le interazioni possono essere sia ferromagnetiche ($J > 0$) che antiferromagnetiche ($J < 0$) distribuite casualmente.
- **Disordine nei campi (h_i):** **Random Field Ising Model** (RFIM). Ogni spin sente un campo locale che tende a orientarlo in una direzione casuale.
- **Diluizione:** Alcuni legami sono semplicemente assenti ($J_{ij} = 0$ con probabilità $1 - p$).

7.2.1 La Frustrazione

La caratteristica cruciale introdotta dal disordine (in particolare nei segni di J_{ij}) è la **frustrazione**. Un sistema è frustrato quando è impossibile soddisfare contemporaneamente tutte le richieste energetiche locali (tutti i legami).

Esempio del triangolo: Consideriamo tre spin disposti a triangolo con interazioni antiferromagnetiche ($J < 0$).

- Lo spin 1 vuole essere opposto allo spin 2.
- Lo spin 2 vuole essere opposto allo spin 3.
- Lo spin 3 vuole essere opposto allo spin 1.

Non esiste una configurazione che soddisfi tutte e tre le condizioni (Up-Down-Up lascia il legame 1-3 insoddisfatto).

Frustrazione

La frustrazione si ha quando il prodotto lungo un circuito chiuso dei coupling è negativo:

$$\prod J < 0 \quad (7.6)$$

La frustrazione genera un paesaggio energetico estremamente rugoso (**rugged landscape**) con moltissimi minimi locali quasi degeneri, rendendo la dinamica lenta e complessa.

7.2.2 Media Annealed e Quenched

Per studiare questi sistemi, dobbiamo calcolare le medie delle grandezze termodinamiche sul disordine. Distinguiamo due approcci fondamentali.

Media Annealed

Si assume che le variabili di disordine (J_{ij}) evolvano sulla stessa scala temporale degli spin S_i . Il disordine è in equilibrio termico con il sistema. In questo caso, si media la funzione di partizione Z :

$$\bar{Z} = \int dJ P(J) Z_J \quad (7.7)$$

L'energia libera annealed è:

$$F_{ann} = -k_B T \ln(\bar{Z}) \quad (7.8)$$

Questo approccio è matematicamente semplice, ma spesso fisicamente errato per i sistemi che ci interessano.

Per comprendere perché la media annealed fallisce, consideriamo un semplice modello matematico che illustra il peso delle configurazioni rare. Supponiamo che la funzione di partizione Z_J , che dipende dalla realizzazione del disordine J , possa assumere due comportamenti nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$):

1. **Comportamento Tipico:** Si realizza con probabilità $1 - p \approx 1$. In questo caso la funzione di partizione vale:

$$Z_{typ} \sim e^{Nb} \quad (7.9)$$

2. **Comportamento Raro:** Si realizza con una probabilità esponenzialmente piccola $p \sim e^{-Nc}$ (con $c > 0$). In questo caso, però, la funzione di partizione assume un valore eccezionalmente alto:

$$Z_{raro} \sim e^{Na} \quad \text{con } a > b \quad (7.10)$$

Calcoliamo ora la media annealed $\bar{Z}$:

$$\bar{Z} = p \cdot Z_{raro} + (1 - p) \cdot Z_{typ} \approx e^{-Nc} \cdot e^{Na} + 1 \cdot e^{Nb} \quad (7.11)$$

$$\bar{Z} \approx e^{N(a-c)} + e^{Nb} \quad (7.12)$$

Confrontiamo i due termini all'esponente. Se la configurazione rara è sufficientemente energetica tale che $a - c > b$, allora nel limite $N \rightarrow \infty$ il primo termine dominerà la somma, nonostante la sua probabilità di accadimento sia quasi nulla. Calcolando l'energia libera annealed:

$$F_{ann} \propto -\ln \bar{Z} \sim -N(a - c) \quad (7.13)$$

Tuttavia, l'energia libera del sistema fisico "vero" (quella che misureremmo in laboratorio nel 99.9% dei campioni) è quella associata al comportamento tipico:

$$F_{typ} \propto -\ln Z_{typ} \sim -Nb \quad (7.14)$$

Poiché $a - c > b$, otteniamo che $F_{ann} \neq F_{typ}$. La media annealed è dominata da eventi statisticamente irrilevanti (fluttuazioni giganti di Z) e non descrive lo stato termodinamico del sistema fisico. Questo dimostra la necessità di calcolare la media del logaritmo (Quenched) e non il logaritmo della media.

Media Quenched

Si assume che il disordine sia fissato (congelato) su scale temporali molto più lunghe di quelle della dinamica degli spin. Per ogni realizzazione fissa del disordine, il sistema raggiunge l'equilibrio. La grandezza fisica che si media non è Z , ma l'energia libera F (o il logaritmo di Z), che è una grandezza estensiva e self-averaging:

$$F_{quenched} = -k_B T \overline{\ln Z} \quad (7.15)$$

Dalla disuguaglianza di Jensen ($\overline{\ln x} \leq \ln \bar{x}$), sappiamo che:

$$F_{quenched} \geq F_{ann} \quad (7.16)$$

La media annealed sottostima sempre l'energia libera vera, perché è dominata da realizzazioni rare del disordine che hanno una Z eccezionalmente grande.

Calcolare direttamente $\overline{\ln Z}$ è analiticamente molto difficile. Si ricorre a un potente artificio matematico chiamato **Replica Trick**. Sfruttiamo l'identità matematica:

$$\overline{\ln Z} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\overline{Z^n} - 1}{n} \quad (7.17)$$

L'idea è calcolare la media del momento n -esimo della funzione di partizione, $\overline{Z^n}$, assumendo inizialmente che n sia un numero intero positivo. Dopo aver calcolato questa quantità per n intero, si effettua una continuazione analitica per $n \rightarrow 0$.

Lezione 8

Data: 22/10/2025

8.1 Modelli Ferromagnetici Diluiti

Fino ad ora abbiamo trattato modelli "puri", definiti da reticoli perfetti e interazioni costanti. Tuttavia, i sistemi reali presentano spesso disordine. Un esempio classico in materia condensata è dato dalle leghe magnetiche, dove avviene una sostituzione casuale di atomi magnetici con atomi non magnetici (impurità). La domanda teorica fondamentale è se l'introduzione di questa perturbazione (il disordine) modifichi il comportamento critico del sistema (classe di universalità, esponenti critici) o se il sistema rimanga robusto.

Analizziamo due modelli principali di disordine geometrico:

- **Site Dilution:** Si rimuovono randomicamente alcuni siti dal reticolo.
- **Link Dilution:** Si rimuovono randomicamente alcuni legami tra gli spin.

Definizione delle Hamiltoniane

Nel modello di **Site Dilution**, introduciamo una variabile casuale ϵ_i associata ad ogni sito i :

$$\mathcal{H}(\vec{S}) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \epsilon_i S_i \epsilon_j S_j - h \sum_i \epsilon_i S_i \quad (8.1)$$

dove la variabile ϵ_i è definita come:

$$\epsilon_i = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } p \\ 0 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases} \quad (8.2)$$

Qui p rappresenta la concentrazione di siti magnetici attivi (densità). Se $\epsilon_i = 0$, il sito è vuoto e non interagisce.

Nel modello di **Link Dilution** (o Bond Dilution), i siti sono tutti presenti, ma il disordine è sui legami J_{ij} :

$$\mathcal{H}(\vec{S}) = - \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (8.3)$$

con la distribuzione:

$$J_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } p \\ 0 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases} \quad (8.4)$$

Sebbene microscopicamente diversi, questi modelli condividono molte proprietà a livello macroscopico e possono spesso essere trattati con le stesse tecniche di teoria di campo (analogia con la percolazione di sito e di legame). Convenzionalmente, $p = 1$ corrisponde al sistema puro (senza disordine).

8.1.1 Diagramma di Fase

Per studiare la possibile esistenza di una fase ferromagnetica, poniamo $h = 0$ per permettere la rottura spontanea della simmetria $\mathbb{Z}_2$. Costruiamo il diagramma di fase.




Figura 8.1: Diagramma di fase nel piano (p, T) per il modello di Ising diluito. La linea rossa è la temperatura critica $T_c(p)$ che separa la fase P da quella F. La linea tratteggiata è la temperatura critica del modello omogeneizzato $T_c^{homo}(p)$, che funge da limite superiore (bound) per la temperatura critica reale.

Possiamo fissare due punti chiave del diagramma:

1. **Limite Puro ($p = 1$):** Ritroviamo il modello di Ising puro. Esiste una temperatura critica ben definita $T_c(p = 1)$ che separa la fase paramagnetica (P) da quella ferromagnetica (F).
2. **Limite a $T = 0$ (Percolazione):** A temperatura nulla, il sistema cerca di ordinarsi localmente. Tuttavia, l'ordine a lungo raggio è possibile solo se esiste un cluster infinito di spin connessi. Esiste una soglia critica p_c (soglia di percolazione):
 - Per $p < p_c$: Il sistema è frammentato in cluster finiti. Non c'è ordine a lungo raggio. Fase Non Percolativa o Paramagnetica.
 - Per $p > p_c$: Esiste un cluster gigante che permette l'ordine ferromagnetico. Fase Percolativa o Ferromagnetica.

8.2 Disuguaglianze di Griffiths

Per analizzare analiticamente la regione della transizione, introduciamo le disuguaglianze di Griffiths. Queste si applicano a modelli ferromagnetici generalizzati con interazioni a più corpi, purché tutti i coefficienti di accoppiamento siano non negativi ($J, K, \dots \geq 0$).

L'Hamiltoniana generica è:

$$H = - \sum_i h_i S_i - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j - \sum_{i < j < k} K_{ijk} S_i S_j S_k - \dots \quad (8.5)$$

Le disuguaglianze fondamentali sono due:

1. Positività delle Correlazioni Totali:

$$\langle S_i \rangle \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, N\} \quad (8.6)$$

$$\langle S_i S_j \rangle \geq 0 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N\} \quad (8.7)$$

$$\langle S_i S_j S_k \rangle \geq 0 \quad \forall i, j, k \in \{1, \dots, N\} \quad (8.8)$$

...

Questa si dimostra facilmente espandendo la funzione di partizione (espansione di alta temperatura): essendo tutti i coefficienti positivi, ogni termine della somma è positivo.

2. Positività delle Correlazioni Connesse:

$$\langle S_i S_j \rangle_c = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \geq 0 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N\} \quad (8.9)$$

8.2.1 Dimostrazione della Prima Disuguaglianza

La dimostrazione si basa sull'espansione in serie ad alta temperatura, utilizzando l'identità per le variabili di Ising ($S = \pm 1$):

$$e^{\lambda S} = \cosh(\lambda) + S \sinh(\lambda) = \cosh(\lambda) [1 + S \tanh(\lambda)] \quad (8.10)$$

Applichiamo questa identità a ogni termine dell'Hamiltoniana

$H(\vec{S}) = - \sum_i h_i S_i - \sum_{i,j} J_{ij} S_i S_j - \dots$ all'interno della funzione di partizione:

$$e^{\beta h_i S_i} = \cosh(\beta h_i) [1 + S_i \tanh(\beta h_i)] \quad (8.11)$$

$$e^{\beta J_{ij} S_i S_j} = \cosh(\beta J_{ij}) [1 + S_i S_j \tanh(\beta J_{ij})] \quad (8.12)$$

$$e^{\beta K_{ijk} S_i S_j S_k} = \cosh(\beta K_{ijk}) [1 + S_i S_j S_k \tanh(\beta K_{ijk})] \quad (8.13)$$

La funzione di partizione (o il numeratore di una media) può essere scritta come il prodotto di questi termini sommato su tutte le configurazioni:

$$Z = \sum_{\{S\}} \prod_i \cosh(\beta h_i) [1 + S_i \tanh(\beta h_i)] \prod_{\langle ij \rangle} \cosh(\beta J_{ij}) [1 + S_i S_j \tanh(\beta J_{ij})] \dots \quad (8.14)$$

Osserviamo che:

- I termini $\cosh(\dots)$ sono costanti positive e possono essere portati fuori.
- Poiché stiamo considerando un sistema ferromagnetico, le costanti di accoppiamento sono non negative ($J \geq 0, h \geq 0$), quindi $\tanh(\beta J) \geq 0$.

Sviluppando il prodotto, otteniamo un **polinomio nelle variabili di spin con coefficienti tutti positivi**. Quando calcoliamo il valore di aspettazione $\langle S_i \rangle$, stiamo essenzialmente selezionando alcuni termini di questo polinomio e sommando su tutte le configurazioni $\{S\}$. Poiché la somma su $\{S\}$ di un qualsiasi monomio di spin $\prod S_k$ è:

$$\sum_{S=\pm 1} S_{k_1} S_{k_2} \dots = \begin{cases} 2^N & \text{se ogni spin appare una potenza pari (o zero)} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (8.15)$$

Il risultato è una somma di termini positivi (i coefficienti del polinomio) moltiplicati per 2^N o 0. Non c'è alcun termine negativo che possa rendere la media minore di zero.

$$\implies \langle S_i \rangle \geq 0 \quad (8.16)$$

8.2.2 Dimostrazione della Seconda Disuguaglianza: Positività delle Correlazioni Connesse

Vogliamo dimostrare che per un sistema ferromagnetico, le funzioni di correlazione connesse sono non negative:

$$\langle S_i S_j \rangle_c = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \geq 0 \quad (8.17)$$

Per dimostrarlo, utilizziamo il trucco del raddoppio del sistema. Consideriamo due copie indipendenti del sistema, descritte dalle variabili di spin S e T , entrambe soggette alla stessa Hamiltoniana H con coefficienti positivi ($J, K, \dots \geq 0$). Poiché le due copie sono indipendenti e identicamente distribuite, vale:

$$\langle S_i \rangle \langle S_j \rangle = \langle S_i \rangle \langle T_j \rangle = \langle S_i T_j \rangle_{S+T} \quad (8.18)$$

dove la media $\langle \cdot \rangle_{S+T}$ è fatta sull'Hamiltoniana totale $H_{tot} = H(S) + H(T)$. Possiamo quindi riscrivere la correlazione connessa come:

$$\langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i T_j \rangle = \langle S_i (S_j - T_j) \rangle \quad (8.19)$$

Introduciamo ora un cambio di variabili:

$$T_k = S_k \sigma_k \quad \text{con } \sigma_k \in \{+1, -1\} \quad (8.20)$$

Questa trasformazione è invertibile poiché $S_k^2 = 1$. L'Hamiltoniana totale del sistema combinato diventa:

$$H_{tot}(S, \sigma) = H(S) + H(S\sigma) \quad (8.21)$$

Analizziamo i termini dell'Hamiltoniana trasformata. Per un'interazione generica a p corpi con coefficiente $K_p \geq 0$:

$$-K_p S_{i_1} \dots S_{i_p} - K_p T_{i_1} \dots T_{i_p} = -K_p S_{i_1} \dots S_{i_p} (1 + \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_p}) \quad (8.22)$$

Il nuovo coefficiente efficace per l'interazione degli spin S è $K_p^{eff} = K_p(1 + \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_p})$. Poiché il prodotto delle σ vale ± 1 , il termine in parentesi vale 0 o 2. Dunque, per ogni configurazione fissata di σ , l'Hamiltoniana efficace per S ha coefficienti non negativi ($K^{eff} \geq 0$).

Possiamo ora valutare il numeratore della differenza delle medie:

$$\sum_{S,T} e^{-\beta(H(S)+H(T))} (S_i S_j - S_i T_j) = \sum_{S,\sigma} e^{-\beta(H(S)+H(S\sigma))} S_i S_j (1 - \sigma_j) \quad (8.23)$$

Riordinando la somma:

$$\sum_{\sigma} (1 - \sigma_j) \left[\sum_S S_i S_j e^{-\beta H_{eff}(S;\sigma)} \right] \quad (8.24)$$

Il termine tra parentesi quadre è proporzionale al valore di aspettazione $\langle S_i S_j \rangle$ calcolato con l'Hamiltoniana efficace H_{eff} . Poiché H_{eff} ha tutti i coefficienti positivi, per la prima disuguaglianza di Griffiths (correlazioni totali), questo valore è non negativo. Inoltre, il termine $(1 - \sigma_j)$ è sempre non negativo (vale 0 o 2). Pertanto, l'intera somma è una somma di termini non negativi.

$$\Rightarrow \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \geq 0 \quad (8.25)$$

8.3 Bound sulla Temperatura Critica

Usiamo le disuguaglianze di Griffiths per confrontare il modello disordinato con un modello "omogeneizzato" (tipo campo medio o annealed), dove ogni accoppiamento J_{ij} è sostituito dal suo valor medio:

$$J_{homo} = \overline{J_{ij}} = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p \quad (8.26)$$

La temperatura critica di questo modello omogeneo è semplicemente un riscaldamento di quella del modello puro ($p = 1$):

$$T_c^{homo}(p) = J_{homo} \cdot T_c(p = 1) = p \cdot T_c(p = 1) \quad (8.27)$$

Questa relazione descrive la bisettrice nel piano (T, p) della Figura 8.2.

Teorema

La temperatura critica del modello disordinato è sempre inferiore o uguale a quella del modello omogeneizzato:

$$T_c(p) \leq T_c^{homo}(p) = p \cdot T_c(p = 1) \quad (8.28)$$

Classificazione del Disordine: Modello Puro, Annealed e Quenched

Per comprendere l'origine di questo bound, è fondamentale distinguere come il disordine viene trattato statisticamente all'interno della funzione di partizione del sistema:

- **Modello Puro** ($p = 1$): Rappresenta il sistema ideale, perfettamente ordinato e traslazionalmente invariante. Tutti gli accoppiamenti sono presenti con la massima intensità ($J_{ij} = 1$). Le uniche fluttuazioni presenti nel sistema sono quelle di natura esclusivamente termica.

- **Modello Quenched (Disordine Congelato):** Descrive il sistema fisico reale diluito. Le variabili di disordine $\{J_{ij}\}$ sono variabili casuali fisse nel tempo, i cui tempi di rilassamento sono infinitamente più lunghi di quelli degli spin. La media statistica viene effettuata sull'energia libera (ovvero sul logaritmo della funzione di partizione): $\overline{F} = -k_B T \ln \overline{Z(\{J_{ij}\})}$. Questo approccio preserva l'identità geometrica di ogni singola configurazione del disordine, mantenendo intatte le fluttuazioni spaziali.
- **Modello Annealed (Omogeneizzato):** È un'approssimazione in cui si assume che le variabili di disordine $\{J_{ij}\}$ fluttuino liberamente sui medesimi tempi scala degli spin, adattandosi termodinamicamente ad essi. La media viene eseguita direttamente sulla funzione di partizione: $F_{ann} = -k_B T \ln \overline{Z(\{J_{ij}\})}$. Ciò equivale a trascurare ogni vincolo geometrico locale, riducendo microscopicamente il sistema a un modello omogeneo con accoppiamenti indeboliti ma uniformi, pari al valore medio $J_{homo} = p$.

Interpretazione Fisica e Geometrica del Bound

La disuguaglianza $T_c(p) \leq T_c^{homo}(p)$ mostra che l'approssimazione omogenea (annealed) sovrastima sistematicamente la stabilità della fase ordinata.

Nel modello omogeneizzato, la rimozione delle fluttuazioni spaziali fa sì che il reticolo rimanga perfettamente connesso a qualsiasi valore di $p > 0$: le interazioni sono semplicemente indebolite uniformemente, consentendo la propagazione dell'ordine a lungo raggio fino a temperature positive, con una transizione lineare $T_c^{homo} \propto p$.

Nel modello reale (quenched), invece, la diluizione casuale introduce una forte disomogeneità spaziale. Si formano inevitabilmente regioni isolate ad alta densità di legami ("isole" ferromagnetiche) separate da ampi vuoti geometrici che agiscono come veri e propri colli di bottiglia termodinamici. Al diminuire di p , queste fluttuazioni geometriche frammentano il reticolo fino a raggiungere la soglia di percolazione p_c , al di sotto della quale la connettività globale svanisce e la temperatura critica crolla bruscamente a zero ($T_c = 0$ per $p < p_c$).

Le disomogeneità spaziali del disordine quenched offrono quindi alle fluttuazioni termiche delle "linee di frattura" preferenziali lungo cui rompere l'ordine globale, abbassando drasticamente la temperatura critica reale $T_c(p)$ rispetto al limite omogeneo. Dal punto di vista formale, la seconda disuguaglianza di Griffiths ($\partial \langle \sigma_i \sigma_j \rangle / \partial J_{kl} \geq 0$) garantisce matematicamente che qualsiasi fluttuazione locale che indebolisce o rimuove un legame non può che ridurre le correlazioni globali degli spin, traducendosi rigorosamente nel limite superiore espresso dal teorema.

8.3.1 Dimostrazione:

Vogliamo dimostrare che la magnetizzazione del modello disordinato è limitata superiormente da quella del modello omogeneo. Innanzitutto, definiamo rigorosamente cosa intendiamo per magnetizzazione m nel contesto di un sistema disordinato. Questa grandezza coinvolge due livelli di media:

1. La **media termica** $\langle \cdot \rangle$, che è il valore di aspettazione calcolato sulla distribuzione di Boltzmann-Gibbs per una specifica configurazione congelata (quenched) del disordine $\{J_{ij}\}$.

2. La **media sul disordine** $\overline{\langle S_0 \rangle}$ (o $\mathbb{E}_J[\dots]$), che è il valore di aspettazione calcolato sulla distribuzione di probabilità $P(J_{ij})$ dei coupling.

La magnetizzazione media del sistema è quindi definita come la media sul disordine della media termica di uno spin generico (ad esempio S_0):

$$m = \overline{\langle S_0 \rangle} \quad (8.29)$$

Tuttavia, c'è una sottigliezza fondamentale: in assenza di campo esterno ($h = 0$), l'Hamiltoniana è invariante per l'inversione globale di tutti gli spin ($S_i \rightarrow -S_i$). Di conseguenza, la media termica $\langle S_0 \rangle$ calcolata sull'ensemble canonico completo sarebbe identicamente nulla ($m = 0$) per simmetria, sia nella fase paramagnetica che in quella ferromagnetica. Per definire un parametro d'ordine non nullo nella fase a simmetria rotta, dobbiamo restringere la media a uno dei due stati puri (ad esempio quello positivo). Operativamente, questo si ottiene applicando un piccolo campo esterno h e prendendo il limite $h \rightarrow 0^+$:

$$\langle S_0 \rangle^+ = \lim_{h \rightarrow 0^+} \langle S_0 \rangle_h \quad (8.30)$$

La disuguaglianza che vogliamo dimostrare confronta quindi la magnetizzazione media nello stato positivo del sistema disordinato con quella del sistema omogeneo :

$$m = \overline{\langle S_0 \rangle^+} \leq m^{homo} = \langle S_0 \rangle_{homo}^+ \quad (8.31)$$

dove $\langle S_0 \rangle_{homo}^+$ è calcolata nel sistema in cui tutti i coupling sono sostituiti dal loro valor medio $\overline{J_{ij}} = p$.

Per dimostrare questa relazione, utilizziamo la **disuguaglianza di Jensen**. Dobbiamo mostrare che la funzione $\langle S_0 \rangle^+(\{J_{ij}\})$ è una **funzione concava** rispetto a ogni variabile di accoppiamento J_{ij} . Calcoliamo le derivate rispetto a un generico J_{ij} (assorbendo β nella derivazione per semplicità):

1. **Derivata Prima:** Derivando la media termica, scende un fattore $S_i S_j$ dalla misura di Boltzmann. Si ottiene la funzione di correlazione connessa:

$$\frac{\partial \langle S_0 \rangle^+}{\partial J_{ij}} = \langle S_0 S_i S_j \rangle^+ - \langle S_0 \rangle^+ \langle S_i S_j \rangle^+ \geq 0 \quad (8.32)$$

Per la seconda disuguaglianza di Griffiths, le correlazioni connesse sono non negative. Dunque la derivata prima è positiva, indicando che la magnetizzazione cresce all'aumentare dell'interazione.

2. **Derivata Seconda:** Deriviamo nuovamente l'espressione precedente rispetto a J_{ij} . Dobbiamo derivare un prodotto di termini. Ricordando che per spin di Ising $S_i^2 = 1$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \langle S_0 \rangle^+}{\partial J_{ij}^2} &= \frac{\partial}{\partial J_{ij}} \left(\langle S_0 S_i S_j \rangle^+ - \langle S_0 \rangle^+ \langle S_i S_j \rangle^+ \right) \\ &= \left[\langle S_0 (S_i S_j)^2 \rangle - \langle S_0 S_i S_j \rangle \langle S_i S_j \rangle \right] \\ &\quad - \left[(\langle S_0 S_i S_j \rangle - \langle S_0 \rangle \langle S_i S_j \rangle) \langle S_i S_j \rangle + \langle S_0 \rangle \left(\langle (S_i S_j)^2 \rangle - \langle S_i S_j \rangle^2 \right) \right] \end{aligned} \quad (8.33)$$

Sostituendo $(S_i S_j)^2 = S_i^2 S_j^2 = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \langle S_0 \rangle}{\partial J_{ij}^2} &= [\langle S_0 \rangle - \langle S_0 S_i S_j \rangle \langle S_i S_j \rangle] \\ &\quad - [\langle S_0 S_i S_j \rangle \langle S_i S_j \rangle - \langle S_0 \rangle \langle S_i S_j \rangle^2 + \langle S_0 \rangle - \langle S_0 \rangle \langle S_i S_j \rangle^2] \end{aligned} \quad (8.34)$$

Semplificando i termini simili ($\langle S_0 \rangle$ si cancella) e raccogliendo $-2\langle S_i S_j \rangle^+$, rimane:

$$\frac{\partial^2 \langle S_0 \rangle^+}{\partial J_{ij}^2} = -2\langle S_i S_j \rangle^+ [\langle S_0 S_i S_j \rangle^+ - \langle S_0 \rangle^+ \langle S_i S_j \rangle^+] \quad (8.35)$$

Analizziamo il segno di questa espressione:

- $\langle S_i S_j \rangle^+ \geq 0$ per la prima disuguaglianza di Griffiths.
- Il termine in parentesi quadre è la correlazione connessa $\langle S_0 S_i S_j \rangle_c^+$, che è ≥ 0 per la seconda disuguaglianza di Griffiths.
- C'è un segno meno davanti a tutto.

Concludiamo che la derivata seconda è non positiva (≤ 0), quindi la funzione è **concava**.

Esito della dimostrazione

Poiché $\langle S_0 \rangle^+$ è una funzione concava delle variabili $\{J_{ij}\}$, possiamo applicare la disuguaglianza di Jensen:

$$\mathbb{E}_J [\langle S_0 \rangle^+ (\{J_{ij}\})] \leq \langle S_0 \rangle^+ (\{\mathbb{E}_J [J_{ij}]\}) \quad (8.36)$$

Ovvero:

$$\overline{\langle S_0 \rangle^+} \leq \langle S_0 \rangle_{\text{homo}}^+ \quad (8.37)$$

Questo dimostra che, a parità di temperatura, l'ordine nel sistema disordinato è sempre inferiore a quello del sistema omogeneo medio. Di conseguenza, la temperatura critica del modello disordinato deve essere più bassa: $T_c(p) \leq T_c^{\text{homo}}(p) = p T_c(p=1)$




Figura 8.2: Confronto tra le magnetizzazioni in funzione della temperatura per $p_c < p < 1$.

8.4 Criterio di Harris Generalizzato

Il Criterio di Harris ci permette di capire se la presenza di un piccolo disordine (vicino al punto critico del sistema puro, $p \approx 1$) modifichi la classe di universalità della transizione, ovvero se gli esponenti critici cambino rispetto al caso puro. Se il punto fisso del sistema puro è stabile rispetto al disordine, allora il sistema disordinato su grande scala si comporta come quello puro. Se invece è instabile, il flusso del gruppo di rinormalizzazione si sposta verso un nuovo punto fisso (ad esempio un "Random Fixed Point"), implicando nuovi esponenti critici.

Per applicare questo criterio al modello diluito, dobbiamo mappare il disordine geometrico in una fluttuazione di un parametro termodinamico locale. Nel modello di Link Dilution, le quantità fisiche dipendono dal prodotto βJ_{ij} . Invece di considerare la temperatura inversa β costante e gli accoppiamenti J_{ij} come variabili casuali (0 o 1), possiamo cambiare punto di vista: fissiamo l'interazione costante $J = 1$ e consideriamo una **temperatura inversa locale** β_{ij} che fluttua spazialmente:

$$\beta_{ij} = \begin{cases} \beta & \text{con probabilità } p \\ 0 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases} \quad (8.38)$$

Questo approccio ci permette di interpretare il **disordine come una fluttuazione locale della temperatura critica** $T_c(\vec{x})$. Ogni regione dello spazio $\vec{x}$ avrà una sua temperatura critica locale che dipende dalla densità locale di legami attivi (o equivalentemente dal valore medio locale di β_{ij}).

Assumiamo che le fluttuazioni della temperatura critica locale siano correlate spazialmente secondo una funzione $g(\vec{r})$:

$$g(\vec{x} - \vec{y}) = \overline{T_c(\vec{x})T_c(\vec{y})} - \overline{T_c}^2 \sim |\vec{x} - \vec{y}|^{-a} \quad \text{per } |\vec{x} - \vec{y}| \gg 1 \quad (8.39)$$

Dove l'esponente a caratterizza il tipo di correlazione del disordine:

- a grande ($a \geq D$): disordine a corto raggio (uncorrelated).
- a piccolo ($a < D$): disordine a lungo raggio (long-range correlated).

Introduciamo la temperatura ridotta locale $t(\vec{x})$, normalizzata rispetto alla temperatura critica media $\overline{T_c}$ (che nel regime perturbativo $p \approx 1$ è molto vicina a quella del sistema puro):

$$t(\vec{x}) = \frac{T - T_c(\vec{x})}{\overline{T_c}} \quad (8.40)$$

Sappiamo che in un sistema puro, la lunghezza di correlazione ξ diverge come una potenza della temperatura ridotta:

$$\xi \sim t^{-\nu} \implies t \sim \xi^{-1/\nu} \quad (8.41)$$

Vogliamo capire se le fluttuazioni locali della temperatura ridotta sono rilevanti su una scala di lunghezza ξ . Per farlo, consideriamo un volume di correlazione $V \sim \xi^D$ e calcoliamo la media spaziale della temperatura ridotta in questo volume (**coarse graining**):

$$t_V = \frac{1}{V} \int_V d^D x t(\vec{x}) \quad (8.42)$$

Ci interessa confrontare il valor medio di questa quantità (che guida la transizione) con la sua varianza (fluttuazione) dovuta al disordine. Calcoliamo la fluttuazione quadratica media Δ^2 su tutto il sistema:

$$\Delta^2 = \overline{t_V^2} - \overline{t_V}^2 = \frac{1}{V^2} \int_V d^D \vec{x} \int_V d^D \vec{y} (\overline{t(\vec{x})t(\vec{y})} - \overline{t(\vec{x})} \overline{t(\vec{y})}) \quad (8.43)$$

Il termine tra parentesi è proporzionale alla funzione di correlazione connessa $g(\vec{x} - \vec{y})$. Sostituendo l'andamento asintotico $g(r) \sim r^{-a}$ e integrando:

$$\Delta^2 \propto \frac{1}{V} \int_V d^D r g(r) \sim \xi^{-D} \int_0^\xi dr r^{D-1} r^{-a} = \xi^{-D} \int_0^\xi dr r^{D-1-a} \quad (8.44)$$

L'integrale si comporta diversamente a seconda del valore di a rispetto alla dimensione spaziale D , determinando se le fluttuazioni mediano a zero o divergono:

1. **Caso $a > D$ (Decadimento veloce/Corto raggio):** L'integrale $\int_0^\xi r^{D-1-a} dr$ converge per grandi ξ (il contributo dominante viene da r piccoli). L'integrale è asintoticamente una costante indipendente da ξ .

$$\Delta^2 \sim \xi^{-D} \quad (8.45)$$

2. **Caso $a < D$ (Decadimento lento/Lungo raggio):** L'integrale diverge per grandi ξ e il suo valore è dominato dal limite superiore di integrazione.

$$\int_0^\xi dr r^{D-1-a} \sim \xi^{D-a} \quad (8.46)$$

Sostituendo nell'espressione per la varianza:

$$\Delta^2 \sim \xi^{-D} \cdot \xi^{D-a} = \xi^{-a} \quad (8.47)$$

3. **Caso $a = D$ (Marginale):** L'integrale dà un contributo logaritmico:

$$\Delta^2 \sim \xi^{-D} \log \xi \quad (8.48)$$

Riassumendo, la fluttuazione del disordine Δ scala come:

Fluttuazione del Disordine

$$\Delta \sim \begin{cases} \xi^{-D/2} & \text{se } a > D \\ \xi^{-D/2} \sqrt{\log \xi} & \text{se } a = D \\ \xi^{-a/2} & \text{se } a < D \end{cases} \quad (8.49)$$

Ora applichiamo il criterio di stabilità. Il disordine è una perturbazione **irrilevante** se, avvicinandosi al punto critico ($\xi \rightarrow \infty$), le fluttuazioni del disordine Δ diventano trascurabili rispetto alla distanza media dal punto critico t . Ovvero il "segnale" termico deve vincere sul "rumore" del disordine. Ricordando che $t \sim \xi^{-1/\nu}$, la condizione di stabilità è:

$$\frac{\Delta}{t} \rightarrow 0 \quad \text{per } \xi \rightarrow \infty \quad (8.50)$$

Ovvero, l'esponente con cui decade Δ deve essere maggiore di $1/\nu$.

- Per $a > D$ (Criterio di Harris Standard): Richiediamo $D/2 > 1/\nu \implies D\nu > 2$. Usando la relazione di hyperscaling $\alpha = 2 - D\nu$, questa condizione equivale a richiedere $\alpha < 0$. Se il calore specifico del sistema puro non diverge (o diverge molto debolmente), il disordine è irrilevante.
- Per $a < D$ (Criterio di Weinrib-Halperin): Richiediamo $a/2 > 1/\nu \implies a\nu > 2$. In questo caso, la correlazione a lungo raggio del disordine rende più difficile soddisfare la condizione di stabilità, poiché le fluttuazioni decadono più lentamente.

Se queste disuguaglianze sono violate, il disordine è rilevante: il punto fisso puro diventa instabile e il sistema fluisce verso un nuovo punto fisso disordinato con nuovi esponenti critici.

github . com / elisabettagnello

Lezione 9

Data: 23/10/2025

9.1 Generalizzazione del Criterio di Harris

Riprendiamo la discussione sul Criterio di Harris iniziata nella lezione precedente. Stiamo analizzando la stabilità del punto fisso di un sistema puro rispetto all'introduzione di disordine (diluizione), modellizzato come fluttuazioni locali della temperatura critica $T_c(\vec{x})$. Definiamo la temperatura ridotta locale $t(\vec{x})$, che misura la distanza dalla criticità in un punto $\vec{x}$:

$$t(\vec{x}) \propto T - T_c(\vec{x}) \quad (9.1)$$

Assumiamo che le fluttuazioni del disordine siano correlate spazialmente. La funzione di correlazione connessa del campo di temperatura ridotta è data da:

$$\overline{t(\vec{x})t(\vec{y})}^c \propto |\vec{x} - \vec{y}|^{-a} \quad (9.2)$$

dove l'esponente a caratterizza il raggio delle correlazioni del disordine. Consideriamo un volume di correlazione $V \sim \xi^D$. La media spaziale della temperatura ridotta su questo volume è:

$$t_V = \frac{1}{V} \int_V d^D \vec{x} t(\vec{x}) \quad (9.3)$$

Il valore medio atteso di questa quantità è semplicemente la temperatura ridotta macroscopica del sistema, $t = \overline{t_V}$. Tuttavia, a causa del disordine, ogni regione avrà un valore leggermente diverso. Ci interessa calcolare la varianza di queste fluttuazioni su scala ξ :

$$\Delta^2 = \overline{t_V^2} - t^2 \quad (9.4)$$

Dall'analisi dell'integrale della funzione di correlazione sul volume V , otteniamo tre comportamenti distinti per la fluttuazione Δ in funzione della lunghezza di correlazione ξ , a seconda del rapporto tra l'esponente di decadimento a e la dimensione spaziale D :

$$\Delta^2 = \overline{t_V^2} - t^2 \propto \begin{cases} \xi^{-D} & a > D \quad (\text{Disordine a corto raggio/uncorrelated}) \\ \xi^{-D} \log \xi & a = D \quad (\text{Caso marginale}) \\ \xi^{-a} & a < D \quad (\text{Disordine a lungo raggio/correlated}) \end{cases} \quad (9.5)$$

9.1.1 Analisi della Stabilità

Per determinare se il disordine è rilevante, dobbiamo confrontare l'ampiezza delle fluttuazioni del disordine (Δ) con la distanza media dal punto critico (t). Avvicinandosi alla transizione ($\xi \rightarrow \infty, t \rightarrow 0$), il disordine è irrilevante se le fluttuazioni diventano trascurabili rispetto alla media, ovvero se il rapporto Δ^2/t^2 tende a zero.

Ricordando la relazione di scaling $\xi \sim t^{-\nu}$, analizziamo il rapporto Δ^2/t^2 :

$$\frac{\Delta^2}{t^2} \propto \begin{cases} t^{\nu D-2} & , a > D \\ t^{\nu D-2} \log t & , a = D \\ t^{\nu a-2} & , a < D \end{cases} \quad (9.6)$$

Possiamo riscrivere gli esponenti usando la relazione di hyperscaling $\alpha = 2 - D\nu$:

- **Caso $a > D$ (Harris Standard):** L'esponente diventa $\frac{2-D\nu}{\nu} = \frac{\alpha}{\nu}$. Il disordine è **irrilevante** se $\Delta^2/t^2 \rightarrow 0$, ovvero se l'esponente è negativo. Questo implica $\alpha < 0$.
- **Caso $a < D$ (Weinrib-Halperin):** L'esponente è $\frac{2}{\nu} - a$. La condizione di stabilità richiede $a > 2/\nu$, ovvero $a\nu > 2$.

Conclusione sulla Rilevanza

Il disordine è **irrilevante** se il calore specifico del sistema puro non diverge (o diverge debolmente).

- Se $\alpha < 0$, il disordine è **irrilevante**. Il sistema mantiene gli esponenti critici del caso puro.
- Se $\alpha > 0$, il disordine è **rilevante**. Il punto fisso puro è instabile.

Casi Fisici Notevoli

Analizziamo alcuni casi specifici del modello di Ising:

- **Ising 2D:** Sappiamo che $\alpha = 0$ (divergenza logaritmica, $\alpha_{2D} = 0_{\log}$). Questo è un caso marginale.
- **Ising 3D:** Si ha $\alpha > 0$ ($\alpha \approx 0.11$). In tre dimensioni, il punto fisso puro è instabile rispetto all'introduzione di disordine (anche a corto raggio).

La Figura 9.1 mostra come (nel caso 3D) il punto fisso puro, situato al limite di assenza di disordine ($p = 1$), sia instabile a causa della rilevanza del disordine ($\alpha > 0$). Le traiettorie del flusso RG si allontanano da esso. Tuttavia, non si dirigono verso il punto fisso di percolazione a $T = 0$ (che è a sua volta instabile lungo la linea critica), ma convergono verso un nuovo punto fisso stabile situato a temperatura finita, detto *Random Fixed Point*. Questo punto fisso controlla il comportamento critico lungo l'intera linea di transizione di fase per $p_c < p < 1$, imponendo una nuova classe di universalità caratterizzata da esponenti critici diversi sia da quelli del modello puro che da quelli della percolazione.




Figura 9.1: Diagramma schematico dei punti fissi nel piano (p, T) . La curva rappresenta la linea critica. Il punto fisso stabile (Random Fixed Point) si trova lungo la curva, intermedio tra i due punti fissi instabili del modello puro ($p = 1$) e della percolazione (p_c).

9.2 Fase di Griffiths e Zeri di Lee-Yang

Consideriamo la regione del diagramma di fase sotto la temperatura critica del modello puro ($T < T_c^{pure}$), ma sopra la temperatura critica del sistema diluito ($T > T_c(p)$). Questa regione è chiamata **Fase di Griffiths**. In questa fase non c'è ordine magnetico a lungo raggio ($m = 0$), ma la dinamica e le proprietà analitiche sono peculiari.




Figura 9.2: Diagramma di fase schematico. La Fase di Griffiths in azzurro è la regione in cui la temperatura è inferiore alla temperatura critica del sistema puro ($T < T_c^{pure}$) ma superiore alla temperatura critica effettiva del sistema diluito ($T > T_c(p)$). Qui il sistema è globalmente paramagnetico ma contiene cluster localmente ordinati.

9.2.1 Zeri di Lee-Yang

Per comprendere la natura matematica delle transizioni di fase, Lee e Yang proposero di analizzare gli zeri della funzione di partizione nel piano complesso. Consideriamo il modello di Ising con N spin. L'Hamiltoniana generica è:

$$H(\vec{S}) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (9.7)$$

La funzione di partizione è $\mathcal{Z} = \sum_{\vec{S}} e^{-\beta H(\vec{S})}$. Definendo le variabili $X = \exp(-2\beta J)$ e $z = \exp(-2\beta h)$ (**fugacità**), possiamo riscrivere il termine di campo:

$$e^{\beta h S_i} = e^{\beta h} \cdot \begin{cases} z & \text{se } S_i = -1 \\ 1 & \text{se } S_i = +1 \end{cases} \quad (9.8)$$

Raggruppando le configurazioni in base al numero n di spin orientati verso il basso ($S_i = -1$), l'intera funzione di partizione assume la forma esplicita:

$$\mathcal{Z}(X, z) = e^{\beta h N + \beta J N_B} \sum_{n=0}^N c_n(X) z^n \quad (9.9)$$

dove N_B è il numero totale di interazioni nel reticolo. I coefficienti $c_n(X)$ sono a loro volta polinomi in X (con esponenti positivi) che tengono conto della configurazione spaziale dei legami. A meno del prefattore esponenziale, $\mathcal{Z}$ diventa quindi un puro polinomio nella variabile complessa z di grado N .

Secondo il teorema di Lee-Yang, le radici della funzione di partizione $\mathcal{Z}$ nel piano complesso della fugacità z godono di due proprietà fondamentali:

1. Non risiedono mai sull'asse reale positivo. Questo garantisce l'analiticità delle grandezze termodinamiche e l'assenza di transizioni di fase per valori fisici (reali e non nulli) del campo magnetico.
2. Giacciono rigorosamente sulla circonferenza unitaria ($|z| = 1$), condizione che corrisponde a un campo magnetico esterno h puramente immaginario.

Teorema del Cerchio (Lee-Yang)

Per il modello di Ising ferromagnetico, tutti gli zeri della funzione di partizione giacciono sul cerchio unitario nel piano complesso della fugacità:

$$|z| = 1 \implies \text{Re}(h) = 0, \quad \text{Im}(h) \neq 0 \implies h \text{ immaginario puro} \quad (9.10)$$

Per un sistema finito, gli zeri non toccano mai l'asse reale positivo ($z = 1 \iff h = 0$), quindi la funzione di partizione è analitica e non ci sono transizioni di fase. Nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$):

- Se $T > T_c$: Gli zeri rimangono staccati dall'asse reale. Esiste un gap che permette lo sviluppo analitico in serie di h attorno a $h = 0$.
- Se $T < T_c$: Gli zeri si accumulano e "pizzicano" l'asse reale in $z = 1$. Questo crea una barriera di non-analiticità che separa la fase $h > 0$ da quella $h < 0$, impedendo la continuazione analitica e generando la **discontinuità** tipica della transizione del primo ordine (rottura spontanea di simmetria).




Figura 9.3: Distribuzione degli zeri di Lee-Yang nel piano complesso della fugacità z . Nel limite termodinamico e per $T < T_c$, gli zeri si addensano verso il punto $z = 1$ (asse reale positivo), "pizzicando" l'asse reale e impedendo il prolungamento analitico.

9.2.2 Singularità di Griffiths

Per comprendere la natura matematica della Fase di Griffiths, analizziamo come si comporta la magnetizzazione del sistema scomponendolo in cluster indipendenti. Nella fase paramagnetica (o di Griffiths), possiamo immaginare il sistema composto da cluster finiti c di spin connessi. Sia $P_{\lambda,c}$ la probabilità di trovare un cluster c all'interno di un volume macroscopico λ . La densità di magnetizzazione del sistema nel volume λ è la media pesata delle magnetizzazioni dei singoli cluster:

$$m_\lambda = \frac{1}{|\lambda|} \sum_c P_{\lambda,c} |c| m_c \quad (9.11)$$

Per ogni cluster finito c , possiamo scrivere la funzione di partizione $\mathcal{Z}_c$ utilizzando il teorema di Lee-Yang. Introdotta la variabile fugacità $y = e^{-2\beta h}$, $\mathcal{Z}_c$ è un polinomio in y di grado $|c|$ (numero di spin nel cluster):

$$\mathcal{Z}_c(y) \propto y^{-|c|/2} \prod_{a=1}^{|c|} (y - \zeta_a(c)) \quad (9.12)$$

dove $\zeta_a(c)$ sono gli zeri della funzione di partizione del cluster c , che giacciono tutti sul cerchio unitario nel piano complesso ($|\zeta_a| = 1$).

L'energia libera per spin del cluster c è data da:

$$f_c = -\frac{1}{\beta|c|} \log \mathcal{Z}_c = \frac{\log y}{2\beta} - \frac{1}{\beta|c|} \sum_{a=1}^{|c|} \log(y - \zeta_a(c)) \quad (9.13)$$

La magnetizzazione del singolo cluster m_c si ottiene derivando l'energia libera rispetto al campo (ricordando che $\frac{\partial}{\partial h} = -2\beta y \frac{\partial}{\partial y}$):

$$m_c = -\frac{\partial f_c}{\partial h} = 1 - \frac{2y}{|c|} \sum_{a=1}^{|c|} \frac{1}{y - \zeta_a(c)} \quad (9.14)$$

Sostituendo questa espressione nella formula della magnetizzazione totale m_λ :

$$m_\lambda = p - \frac{2y}{|\lambda|} \sum_c P_{\lambda,c} \sum_{a=1}^{|c|} \frac{1}{y - \zeta_a(c)} \quad (9.15)$$

dove $p = \frac{1}{|\lambda|} \sum_c P_{\lambda,c} |c|$ è il numero medio di spin sul reticolo.

A questo punto, notiamo che cluster diversi possono avere zeri nella stessa posizione. Possiamo raggruppare i termini sommando sugli N_λ zeri *distinti* possibili nel sistema. Definiamo un "peso" o densità spettrale degli zeri $\eta_a(\lambda)$:

$$m_\lambda = p - 2y \sum_{a=1}^{N_\lambda} \frac{\eta_a(\lambda)}{y - \zeta_a} \quad (9.16)$$

dove il coefficiente $\eta_a(\lambda)$ raccoglie i contributi di tutti i cluster che possiedono uno zero in posizione ζ_a , pesati dalla loro probabilità di occorrenza e dalla molteplicità $\mu_a(c)$ dello zero nel cluster:

$$\eta_a(\lambda) = \frac{1}{|\lambda|} \sum_{c: \zeta_a(c)=\zeta_a} \mu_a(c) P_{\lambda,c} > 0 \quad (9.17)$$

Vale inoltre la regola di somma (poiché la somma delle probabilità deve essere normalizzata rispetto alla densità dei siti attivi):

$$p = \sum_a \eta_a(\lambda) \quad (9.18)$$

Analisi della Singolarità

L'espressione finale per m_λ mostra che **la magnetizzazione è una somma di poli nel piano complesso della fugacità.**

- Se $|y| \neq 1$, i denominatori non si annullano e la funzione è analitica (somma di termini regolari).
- I problemi sorgono per $y \rightarrow 1$ (limite di campo magnetico esterno nullo, $h \rightarrow 0$), dove gli zeri minacciano di far divergere la funzione.

La distanza (il gap) tra lo zero più vicino all'asse reale e il punto critico $y = 1$ è inversamente proporzionale alla taglia del cluster. Consideriamo un'isola "pura" (ovvero priva di legami mancanti) molto grande e compatta, costituita da $n \gg 1$ spin: i suoi zeri disteranno dall'asse reale di un fattore $\sim 1/n$. Tuttavia, in un sistema diluito, la probabilità $P_{\lambda,c}$ di trovare una tale fluttuazione crolla in modo esponenziale al crescere della sua dimensione:

$$P_{\lambda,c} \propto p^{|c|} = p^{bn} = e^{-dn} \quad \text{con } d = b \log(1/p) \quad (9.19)$$

Nell'avvicinarsi a $h = 0$, si innesca quindi una competizione matematica: da un lato il denominatore del polo tende a zero ($\sim 1/n$, spingendo per una divergenza algebrica), dall'altro il numeratore (il residuo η_a , proporzionale a $P_{\lambda,c}$) tende a zero in modo esponenzialmente veloce (e^{-dn}).

Poiché lo smorzamento esponenziale domina su qualsiasi divergenza, il contributo di queste fluttuazioni viene violentemente soppresso. La magnetizzazione non diverge e tutte le sue derivate rimangono finite, rendendo la funzione C^∞ (completamente liscia) sull'asse reale. Ciononostante, la presenza di infiniti zeri spinti arbitrariamente vicini all'asse reale distrugge il raggio di convergenza della serie di Taylor. La funzione risulta perciò **liscia ma non analitica.**

Queste deboli non-analiticità prendono il nome di **Singularità di Griffiths**. Nel concreto, esse rappresentano l'impronta termodinamica di configurazioni spaziali rare ma statisticamente inevitabili nel limite termodinamico.

Nella *Fase di Griffiths* il reticolo globale è termicamente disordinato (paramagnetico). Tuttavia, queste rare isole giganti si trovano localmente al di sotto della loro temperatura critica. Pur essendo troppo rare e disconnesse per innescare un ordine a lungo raggio (motivo per cui la funzione resta C^∞ e non c'è una vera transizione di fase), esse si comportano localmente come enormi momenti magnetici dotati di un'inerzia colossale.

Il ruolo delle singularità di Griffiths è proprio quello di governare la termodinamica e la dinamica in questa regione del diagramma di fase: esse dominano la suscettività a bassi campi e causano un rallentamento anomalo della dinamica di rilassamento del sistema, "ricordando" matematicamente l'esistenza della fase ordinata del modello puro.

9.2.3 Dinamica dei Sistemi Disordinati

L'effetto più evidente della Fase di Griffiths non è nella termodinamica statica, ma nella **dinamica**. Le regioni rare e dense (i cluster ferromagnetici locali) agiscono come trappole dinamiche, rallentando enormemente il rilassamento del sistema. Per studiare l'evoluzione temporale, introduciamo la **Dinamica di Glauber** (o equivalentemente un algoritmo Monte Carlo tipo Metropolis).

Consideriamo l'Hamiltoniana di Ising:

$$H(\vec{S}) = - \sum_{i,j} J_{ij} S_i S_j - \sum_i h_i S_i \quad (9.20)$$

Definiamo il **campo locale** $b_i(t)$ che agisce sullo spin i -esimo al tempo t :

$$b_i(t) = \sum_j J_{ij} S_j(t) + h_i \quad (9.21)$$

La regola di aggiornamento stocastico per lo spin S_i al tempo $t+1$ è data dalle probabilità di transizione:

$$S_i(t+1) = \begin{cases} +1 & \text{con probabilità } \frac{1+\tanh(\beta b_i(t))}{2} \\ -1 & \text{con probabilità } \frac{1-\tanh(\beta b_i(t))}{2} \end{cases} \quad (9.22)$$

Il valore di aspettazione dello spin al passo successivo è quindi determinato interamente dal campo locale:

$$\langle S_i(t+1) \rangle = \tanh(\beta b_i(t)) \quad (9.23)$$

Osservabili Dinamiche

Per caratterizzare l'evoluzione del sistema verso l'equilibrio (o il suo mancato raggiungimento), monitoriamo due quantità principali.

1. Autocorrelazione Temporale: Misura la memoria del sistema rispetto a una configurazione precedente (o quella iniziale):

$$C(t, t') = \frac{1}{N} \sum_i \langle S_i(t) S_i(t') \rangle \quad (9.24)$$

Questa quantità ci dice "quanto il sistema ricorda la sua storia". È una variabile random che va mediata sulla dinamica di Glauber (realizzazioni del rumore termico).

2. Correlazione Spaziale a tempi uguali: Misura la formazione di domini ordinati al tempo t :

$$G(r, t) = \frac{1}{N} \sum_{|i-j|=r} \langle S_i(t) S_j(t) \rangle \quad (9.25)$$

Tipicamente ci aspettiamo un decadimento esponenziale che definisce la lunghezza di correlazione dinamica $\xi(t)$:

$$G(r, t) \propto e^{-r/\xi(t)} \quad (9.26)$$

L'evoluzione temporale di $\xi(t)$ segue leggi di scala diverse a seconda della fase in cui ci troviamo. In un processo di ordinamento standard (coarsening), ci aspettiamo una crescita a legge di potenza:

$$\xi(t) \sim t^{1/2} \quad (\text{diffusiva}) \quad (9.27)$$

A tempi lunghi, $\xi(t)$ satura al valore di equilibrio termodinamico ξ_{eq} (se finito) o alla taglia del sistema L (se siamo in fase critica o ordinata).

$$\xi(t) \rightarrow \xi_{eq} \implies G_{eq}(r) = \frac{1}{N_r} \sum_{|i-j|=r} \langle S_i S_j \rangle_{\text{Gibbs-Boltzmann}} \quad (9.28)$$




Figura 9.4: Crescita della lunghezza di correlazione dinamica $\xi(t)$ in scala log-log. Inizialmente segue una legge di potenza (diffusiva, $\xi \sim t^{1/2}$). A tempi lunghi satura: o al valore di equilibrio termodinamico ξ_{eq} (se siamo nella fase paramagnetica/Griffiths) o alla taglia del sistema L (se siamo nella fase ordinata o critica).

Nella fase di Griffiths, la dinamica diventa estremamente lenta ("slow dynamics"). Sebbene ξ_{eq} sia finita, il tempo per raggiungerla può essere enorme a causa delle barriere di energia libera introdotte dai cluster rari.

Lezione 10

Data: 24/10/2025

Nelle lezioni precedenti ci siamo concentrati sulle proprietà statiche dei sistemi. Introduciamo ora la **dinamica**, un passo fondamentale per due motivi principali:

1. **Campionamento algoritmico:** Per studiare numericamente un sistema (es. Monte Carlo), è necessario definire una regola di evoluzione temporale che permetta di visitare lo spazio delle configurazioni e raggiungere l'equilibrio termodinamico (termalizzazione).
2. **Fisica del non-equilibrio:** Vogliamo comprendere come un sistema evolve fisicamente quando viene preparato in uno stato iniziale lontano dall'equilibrio (ad esempio, un *quench* da temperatura infinita a $T < T_c$).

La grandezza fisica centrale in questo studio è la **lunghezza di correlazione dipendente dal tempo**, $\xi(t)$.

10.1 Lunghezza di Correlazione

La dinamica nei modelli ordinati evolve e fa crescere la lunghezza di correlazione $\xi(t)$ in funzione del tempo. Nei modelli ordinati, se la lunghezza di correlazione iniziale è piccola, essa tenderà a crescere indefinitamente finché non subentra un fattore limitante (come la termalizzazione o la taglia del sistema). In generale, il raggio di correlazione cresce nel tempo come una legge di potenza:

$$\xi(t) \sim t^{1/z} \quad (10.1)$$

dove z è noto come **esponente critico dinamico**. Il valore più comune e "classico" che si osserva in teorie gaussiane o nel modello di Ising 1D è $z = 2$. Per sistemi disordinati come gli *Spin Glasses*, la dinamica è molto più lenta ("sluggish") a causa della frustrazione. Al punto critico, l'esponente dinamico assume valori molto elevati, $z \approx 6 \div 7$, indicando un rilassamento estremamente lento.

Dinamica all'Equilibrio vs Fuori dall'Equilibrio

- **Dinamica all'equilibrio:** Si parte da condizioni iniziali distribuite secondo la misura di Gibbs-Boltzmann. Il sistema si evolve, ma macroscopicamente e statisticamente rimane all'equilibrio. La funzione di correlazione a due tempi dipende solo dalla differenza temporale $c(t, t') = \tilde{c}(t - t')$ in virtù dell'invarianza per traslazioni temporali. Il decadimento è descritto da un unico tempo caratteristico $\tau_{eq} \sim \xi_{eq}^z$.
- **Dinamica fuori dall'equilibrio:** Si parte da una configurazione iniziale generica (spesso random e uniforme). La lunghezza di correlazione dinamica $\xi(t)$ cresce progressivamente fino a raggiungere l'equilibrio ξ_{eq} se la temperatura $T > 0$, o prosegue se $T = 0$.

10.1.1 Effetti di Taglia Finita

L'evoluzione temporale della lunghezza di correlazione è limitata da due scale spaziali fondamentali: la taglia del sistema L e la lunghezza di correlazione di equilibrio $\xi_{eq}(T)$. Possiamo distinguere tre regimi, illustrati schematicamente nel grafico log-log (Fig. 10.1).




Figura 10.1: Diagramma schematico (Log-Log) dell'evoluzione della lunghezza di correlazione $\xi(t)$. La crescita iniziale segue la legge di potenza $t^{1/z}$ (con $z = 2$ per Ising 1D) fino a quando non intercetta la scala temporale dettata dalla lunghezza di equilibrio ξ_{eq} o dalla taglia del sistema L .

Il tempo necessario a **decorrelare** o **termalizzare** segue una legge di scaling che dipende dal rapporto tra L e ξ_{eq} :

$$\tau(L, T) = L^z f\left(\frac{\xi_{eq}(T)}{L}\right) \approx \begin{cases} L^z & \text{se } L \ll \xi_{eq} \quad (\text{Regime di Taglia Finita}) \\ \xi_{eq}^z & \text{se } L \gg \xi_{eq} \quad (\text{Regime Termodinamico}) \end{cases} \quad (10.2)$$

τ subisce un "cutoff" se il sistema ha dimensione lineare finita L .

Quando $L \gg \xi_{eq}$, dopo un tempo τ_{eq} , il sistema entra nel regime di equilibrio. Qui, le osservabili non evolvono più in media, ma fluttuano. La dinamica è descritta dalla funzione di autocorrelazione temporale:

$$C(t, t') \sim e^{-(t-t')/\tau_{eq}} \quad (10.3)$$

10.2 Dinamica di Glauber per Ising 1D

Analizziamo esplicitamente la dinamica di Glauber nel modello di Ising unidimensionale in assenza di campo magnetico esterno ($h = 0$).

L'Hamiltoniana è ($J = 1$):

$$H = - \sum_i S_i S_{i+1} \quad (10.4)$$

Definiamo il **campo locale** h_i agente sullo spin i :

$$h_i = S_{i-1} + S_{i+1} \quad (10.5)$$

La probabilità di transizione per lo spin i di assumere valore S al tempo $t + 1$ è data da:

$$\mathbb{P}(S_i(t+1) = S) = \frac{1 + S \tanh(\beta h_i)}{2} \quad (10.6)$$

L'evoluzione della probabilità $P(\vec{s}, t)$ della configurazione totale al tempo t è data dalla **Master Equation**:

$$\frac{dP(\vec{s}, t)}{dt} = \sum_i P(\vec{s}^{(i)}, t) \frac{1 + s_i \tanh(\beta h_i)}{2} - P(\vec{s}, t) \sum_i \frac{1 - s_i \tanh(\beta h_i)}{2} \quad (10.7)$$

dove $\vec{s}^{(i)} = (s_1, \dots, -s_i, \dots, s_N)$ indica la configurazione che differisce da $\vec{s}$ esclusivamente per il ribaltamento dell' i -esimo spin.

Il primo termine rappresenta il flusso di probabilità in entrata nello stato $\vec{s}$ (partendo dagli stati adiacenti), mentre il secondo termine rappresenta il flusso in uscita verso altri stati.

La Master Equation mantiene conservata la probabilità totale.

10.2.1 Dinamica della Correlazione Spaziale

Poiché la risoluzione esatta della Master Equation per l'intera distribuzione di probabilità $P(\vec{s}, t)$ in un sistema macroscopico risulta impraticabile, è conveniente proiettare l'evoluzione dinamica su un'osservabile scalare. Una scelta fisicamente rilevante è la funzione di correlazione spaziale a due punti:

$$C_{ij}(t) = \sum_{\vec{s}} P(\vec{s}, t) S_i S_j \quad (10.8)$$

Assumendo l'invarianza per traslazioni spaziali, questa quantità dipende unicamente dalla distanza relativa $r = |i - j|$. Fissando un sito di riferimento nell'origine, definiamo l'osservabile di interesse come:

$$G(r, t) = \langle C_{0r}(t) \rangle = \sum_{\vec{s}} P(\vec{s}, t) S_0 S_r \quad (10.9)$$

La media è sulle traiettorie e sulla condizione iniziale. Si parte da una condizione iniziale disordinata $G(r, 0) = \delta_{r,0}$.

Per derivare l'equazione di evoluzione di $G(r, t)$, moltiplichiamo la Master Equation per $S_0 S_r$ e sommiamo su tutte le configurazioni:

$$\frac{d}{dt} G(r, t) = \sum_{\vec{s}} S_0 S_r \left[\sum_i P(\vec{s}^{(i)}, t) \frac{1 + S_i \tanh(\beta h_i)}{2} - P(\vec{s}, t) \sum_i \frac{1 - S_i \tanh(\beta h_i)}{2} \right] \quad (10.10)$$

dove $\vec{s}^{(i)}$ indica la configurazione in cui lo spin i -esimo è stato invertito.

La sommatoria su tutti i siti i può essere semplificata analizzando le proprietà dell'osservabile $S_0 S_r$. Considerando il primo termine in parentesi (che rappresenta la probabilità di transizione in "entrata") ed effettuando il cambio di variabili $\vec{\tau} = \vec{s}^{(i)}$, si valuta formalmente l'effetto del flip del singolo spin nel sito i -esimo.

Si distinguono due casi per l'indice di sommatoria:

- **Se $i \neq 0$ e $i \neq r$:** il flip avviene in un sito non coinvolto nell'osservabile. Di conseguenza, gli spin S_0 e S_r non vengono alterati dalla trasformazione e il loro prodotto rimane invariato. In queste condizioni, il termine di entrata e il termine di uscita assumono lo stesso valore assoluto ma segno opposto, elidendosi esattamente.
- **Se $i = 0$ o $i = r$:** il flip coinvolge direttamente uno degli spin dell'osservabile, invertendone il segno. Questo cambio di segno fa sì che i termini di entrata e uscita non si cancellino.

La sommatoria spaziale su tutti gli N siti del reticolo si riduce quindi ai soli due contributi non nulli nei siti $i = 0$ e $i = r$. Poiché il modello in assenza di campo esterno è invariante per traslazioni spaziali, l'effetto statistico del flip nel sito 0 è equivalente a quello nel sito r . Sfruttando questa simmetria, è sufficiente calcolare il termine per $i = r$ e moltiplicarlo per 2, ottenendo:

$$\frac{d}{dt}G(r, t) = - \sum_{\vec{s}} S_0 S_r P(\vec{s}, t) (1 - S_r \tanh(\beta h_r)) \quad (10.11)$$

Nel modello di Ising unidimensionale, il campo locale $h_r = S_{r-1} + S_{r+1}$ assume solo i valori $0, \pm 2$. Questa peculiarità permette di linearizzare esattamente la tangente iperbolica sul reticolo:

$$\tanh(\beta(S_{r-1} + S_{r+1})) = \frac{S_{r-1} + S_{r+1}}{2} \tanh(2\beta) \quad (10.12)$$

Sostituendo tale espressione e ricordando che $S_r^2 = 1$, l'equazione diventa:

$$\frac{d}{dt}G(r, t) = - \sum_{\vec{s}} P(\vec{s}, t) S_0 S_r + \frac{\tanh(2\beta)}{2} \left[\sum_{\vec{s}} P(\vec{s}, t) S_0 S_{r-1} + \sum_{\vec{s}} P(\vec{s}, t) S_0 S_{r+1} \right] \quad (10.13)$$

Riconoscendo le definizioni delle funzioni di correlazione e riordinando i termini in modo da evidenziare la struttura alle differenze finite spaziali, giungiamo all'equazione esatta sul reticolo:

$$\frac{dG(r, t)}{dt} = -(1 - \tanh(2\beta))G(r, t) + \frac{\tanh(2\beta)}{2} [G(r-1, t) - 2G(r, t) + G(r+1, t)] \quad (10.14)$$

Nel limite del continuo (per distanze r sufficientemente grandi), il termine in parentesi quadra corrisponde alla derivata seconda spaziale $\frac{\partial^2 G(r, t)}{\partial r^2}$.

Limiti Fisici e Scaling di Porod

Possiamo estrarre informazioni cruciali studiando i limiti asintotici di questa equazione:

1. **Regime stazionario all'equilibrio** ($t \rightarrow \infty, T > 0$):

Il sistema stazionarizza e la derivata temporale si annulla ($\frac{\partial G}{\partial t} = 0$). Sostituendo nella versione continua, si ottiene:

$$(1 - \tanh(2\beta))G_{eq}(r) = \frac{\tanh(2\beta)}{2} \frac{\partial^2 G_{eq}}{\partial r^2} \quad (10.15)$$

Dall'analisi dimensionale di questa equazione differenziale ricaviamo la lunghezza di correlazione all'equilibrio ξ_{eq} :

$$\xi_{eq}^2 \propto \frac{\tanh(2\beta)}{1 - \tanh(2\beta)} \sim e^{4\beta} \quad \text{per } T \ll 1 \quad (10.16)$$

Questo risultato coincide perfettamente con la divergenza nota della lunghezza di correlazione per il modello di Ising unidimensionale, confermando l'esattezza dell'approccio.

2. **Dinamica fuori dall'equilibrio** ($T = 0$):

A temperatura nulla il sistema non raggiunge mai l'equilibrio perché $\xi_{eq} \rightarrow \infty$. Sostituendo $\tanh(2\beta) = 1$, il termine di decadimento lineare si annulla e ci ritroviamo con una pura **equazione della diffusione**:

$$\frac{dG(r, t)}{dt} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G(r, t)}{\partial r^2} \quad (10.17)$$

Dimensionalmente, affinché r^2 scali come t , dobbiamo avere un andamento per la lunghezza di correlazione $\xi(t) \sim t^{1/2}$. Questo identifica l'esponente critico dinamico $z = 2$. Inserendo una forma di scaling $\tilde{G}(r/t^{1/2})$ nell'equazione, la soluzione analitica esatta restituisce la **Legge di Porod**:

$$G(r, t) = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{r}{2\sqrt{t}}\right) \implies \tilde{G}(z) = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{z}{2}\right) \quad (10.18)$$

Sviluppando in serie di Taylor la funzione di errore per argomenti piccoli, la funzione di correlazione esibisce una dipendenza strettamente lineare: $G(r, t) \approx 1 - \frac{r}{\sqrt{\pi t}}$

Di conseguenza, la derivata spaziale all'origine è finita e **non nulla**: $\left.\frac{\partial G}{\partial r}\right|_{r \rightarrow 0} \neq 0$

Graficamente, questo andamento si traduce in una **cuspide** in $r = 0$.

- **Modelli continui (es. teoria di Ginzburg-Landau):** Il parametro d'ordine varia nello spazio in modo differenziabile ("liscio"). La correlazione all'origine ha un andamento parabolico, il che impone una derivata rigorosamente nulla in $r = 0$.
- **Modello di Ising (discreto):** Le variabili di spin sono rigorosamente discrete ($S_i = \pm 1$). Il passaggio tra domini di spin opposti è istantaneo (avviene in un singolo passo reticolare) e genera un'**interfaccia netta** (*sharp interface*) priva di spessore, che costituisce fisicamente il **Domain Wall**.

Consideriamo due spin separati da una distanza piccolissima r . Essendo molto vicini, è altamente probabile che si trovino nello stesso dominio, fornendo un contributo

alla correlazione pari a 1. L'unico caso in cui i due spin risultano opposti (contributo pari a -1) si verifica se un *Domain Wall* cade esattamente nello spazio che li separa.

Poiché nel modello di Ising le interfacce non hanno spessore, la probabilità di “catturare” un *Domain Wall* in un piccolo intervallo è **direttamente proporzionale alla lunghezza dell'intervallo** r . È proprio questa probabilità a generare la dipendenza lineare $G(r) \approx 1 - cr$ ($c > 0$), spiegando fisicamente la derivata non nulla e la presenza della cuspidè all'origine.


10.3 Dinamica dei Difetti (Domain Walls)

Un modo complementare, e fisicamente più illuminante, per studiare la **dinamica di coarsening** (**crescita dei domini ordinati** e coesistenza tra essi) è spostare il focus dalla configurazione degli spin all'evoluzione dei difetti di energia, chiamati **Domain Walls (DW)**. Un DW si trova ovunque vi sia un'interazione violata (due spin adiacenti antiparalleli). Esiste una mappatura "quasi" biunivoca (c'è una degenerazione Z_2) tra le configurazioni degli spin e quelle dei DW.

Riprendendo le regole di Glauber in termini di probabilità termiche, identifichiamo tre processi stocastici per i DW, controllati da una scala di tempo universale associata a un rate di transizione globale Γ :


- **Annichilazione:** Due DW adiacenti convergono e si distruggono. Probabilità dominata dalla forte preferenza termica di allineamento:

$$\text{Rate} \propto \Gamma[1 + \tanh(2\beta)]$$




- **Creazione:** Fluttuazione termica che spezza un dominio creando due DW. Estremamente improbabile a basse temperature:

$$\text{Rate} \propto \Gamma[1 - \tanh(2\beta)]$$



- **Spostamento:** Un DW compie un salto reticolare verso un sito adiacente neutro. È un puro **random walk** non ostacolato termicamente:

$$\text{Rate} \propto \Gamma$$



A $T = 0$, la probabilità di creazione si annulla. I difetti seguono quindi una cinematica governata unicamente dallo spostamento e dall'annichilazione. Due difetti separati da una distanza tipica $\xi(t)$ diffonderanno (random walk) e si annichileranno in un tempo proporzionale al quadrato della loro distanza, $t \sim \xi^2(t)$, riotteniamo quindi l'esponente dinamico $z = 2$.

10.3.1 Fallimento del Campo Medio e Pseudo-gap

Definita $n(t)$ la densità spaziale dei DW, l'energia media del sistema risulta

$$\mathcal{E}(t) = -1 + 2n(t) \quad (10.19)$$

Se cerchiamo di descrivere l'evoluzione di $n(t)$ applicando l'approssimazione del **caos molecolare** (fattorizzando la probabilità di trovare due DW vicini come $n(t)^2$), otteniamo:

$$\frac{1}{\Gamma} \frac{dn(t)}{dt} = [1 - \tanh(2\beta)](1 - n(t))^2 - [1 + \tanh(2\beta)]n(t)^2 \quad (10.20)$$

Analisi del limite stazionario ($t \rightarrow \infty$)

Verifichiamo la validità dell'equazione all'equilibrio termodinamico annullando la derivata temporale ($\frac{dn(t)}{dt} = 0$):

$$[1 - \tanh(2\beta)](1 - n_{eq})^2 = [1 + \tanh(2\beta)]n_{eq}^2 \quad (10.21)$$

Dividendo entrambi i membri per n_{eq}^2 e per il termine $[1 - \tanh(2\beta)]$, si ottiene:

$$\frac{(1 - n_{eq})^2}{n_{eq}^2} = \frac{1 + \tanh(2\beta)}{1 - \tanh(2\beta)} \quad (10.22)$$

Estraendo la radice quadrata di ambo i membri (essendo $n_{eq} \geq 0$ e $1 - n_{eq} \geq 0$):

$$\frac{1 - n_{eq}}{n_{eq}} = \sqrt{\frac{1 + \tanh(2\beta)}{1 - \tanh(2\beta)}} \implies \frac{1}{n_{eq}} - 1 = \sqrt{\frac{1 + \tanh(2\beta)}{1 - \tanh(2\beta)}} \quad (10.23)$$

Risolvendo rispetto a n_{eq} si ricava la formula esatta per la densità di equilibrio:

$$n_{eq} = \left(1 + \sqrt{\frac{1 + \tanh(2\beta)}{1 - \tanh(2\beta)}} \right)^{-1} \quad (10.24)$$

Esplicitando la tangente iperbolica e semplificando:

$$n_{eq} = \left(1 + \sqrt{e^{4\beta}} \right)^{-1} = \frac{1}{1 + e^{2\beta}} \sim e^{-2\beta} \sim \frac{1}{\xi_{eq}} \quad (10.25)$$

Poiché a basse temperature la lunghezza di correlazione all'equilibrio si comporta come $\xi_{eq} \sim e^{2\beta}$, l'approssimazione di campo medio restituisce lo scaling termodinamico corretto per la densità dei difetti.

Analisi della dinamica fuori dall'equilibrio a $T = 0$

A temperatura zero ($T = 0$, ovvero $\beta \rightarrow \infty$), la creazione di difetti è impossibile e si ha $\tanh(2\beta) = 1$. Assorbendo le costanti, l'equazione cinetica assume la forma:

$$\frac{dn(t)}{dt} = -2\Gamma n(t)^2 \quad (10.26)$$

Per tempi lunghi si ottiene il decadimento:

$$n(t) \sim \frac{1}{t} \quad (10.27)$$

Questo andamento temporale entra in palese contraddizione con lo scaling spaziale corretto, per il quale la densità dei difetti deve decrescere come l'inverso della lunghezza di correlazione dinamica:

$$n(t) \propto \frac{1}{\xi(t)} \sim \frac{1}{t^{1/2}} \quad (10.28)$$

L'errore fondamentale che genera questa discrepanza risiede nell'ipotesi del caos molecolare. Il processo di annichilazione elimina sistematicamente i difetti adiacenti, creando forti correlazioni spaziali a corto raggio. La dinamica dei DW non è descritta da cammini casuali indipendenti, ma si comporta come un **Random Walk in presenza di una Parete Assorbente** (che simula l'annichilazione istantanea all'incontro).

Mentre in un cammino casuale libero la densità di probabilità all'origine $P(0)$ assume un valore finito, la presenza della condizione assorbente schiaccia linearmente a zero la probabilità a corte distanze. Si genera così uno **pseudo-gap**. Questa riduzione locale di probabilità rende gli incontri tra i difetti meno frequenti. Di conseguenza, la probabilità che due DW si trovino vicini per annichilirsi non scala come $n(t)^2$, ma subisce una soppressione che la fa variare come $n(t)^3$. L'equazione cinetica assume quindi una forma cubica, da cui segue:

$$n(t) \sim \frac{1}{t^{1/2}} \quad (10.29)$$

Questo risultato teorico ristabilisce la piena coerenza fisica con la legge di accrescimento diffusivo dei domini $\xi(t) \sim t^{1/2}$, confermando l'esponente dinamico $z = 2$.




Figura 10.2: Distribuzione spaziale per modelli di Random Walk. Nel RW libero la probabilità di prossimità è massima all'origine. Nel caso dei Domain Walls, l'annichilazione agisce come parete assorbente, generando uno pseudo-gap lineare che sopprime fortemente la probabilità di incontro a distanze brevi.

10.4 Modello di Ginzburg-Landau Dipendente dal Tempo (TDGL)

Nei modelli di Ising unidimensionali l'analisi reticolare esatta è fattibile, ma estenderla a $D > 1$ (sistemi bidimensionali o tridimensionali) diviene analiticamente impossibile fuori dall'equilibrio. Per catturare la fisica universale di questi sistemi, si passa a un approccio di teoria dei campi, definendo un'equazione stocastica differenziale per il parametro d'ordine continuo (o campo) $\Phi(\vec{x}, t)$, nota come **Equazione di Ginzburg-Landau dipendente dal tempo (TDGL)**:

$$\frac{1}{\Gamma} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\delta F[\Phi]}{\delta \Phi(\vec{x}, t)} + \eta(\vec{x}, t) \quad (10.30)$$

Il termine $-\frac{\delta F}{\delta \Phi}$ spinge il campo a minimizzare l'energia libera per rilassare verso l'equilibrio termodinamico, mentre $\eta(\vec{x}, t)$ è un rumore termico bianco (delta-correlato sia in spazio che in tempo) che descrive le fluttuazioni stocastiche introdotte dalla temperatura.

Prendiamo in esame un funzionale di Landau per una **teoria gaussiana**, ovvero il propagatore libero senza termini quartici di rottura di simmetria:

$$F[\Phi] = \int d^D \vec{x} \left(\frac{1}{2} |\nabla \Phi|^2 + \frac{m^2}{2} \Phi^2 \right) - h \Phi \quad (10.31)$$

L'equazione differenziale risultante per il punto di sella è rigorosamente lineare nel campo. Possiamo diagonalizzarla introducendo la trasformata di Fourier nello spazio reciproco dei momenti $\vec{k}$ e delle frequenze ω ($\Phi(\vec{x}, t) \rightarrow \hat{\Phi}(\vec{k}, \omega)$):

$$\left(-\frac{i\omega}{\Gamma} + k^2 + m^2 \right) \hat{\Phi}(\vec{k}, \omega) = \hat{h} + \hat{\eta} \quad (10.32)$$

Da questa relazione strutturale estraiamo la **suscettività generalizzata** mediando rispetto al campo ausiliario $\hat{h}$:

$$\frac{\partial \langle \hat{\Phi} \rangle}{\partial \hat{h}} = \frac{\Gamma}{-i\omega + \Gamma(k^2 + m^2)} \quad (10.33)$$

Per evidenziare le proprietà universali di invarianza di scala, riorganizziamo i termini fattorizzando il vettore d'onda k^2 al denominatore e assorbendo le costanti. La suscettività (o equivalentemente il suo inverso χ^{-1}) può essere riformulata come una funzione di puro scaling:

$$\chi^{-1} \propto k^2 f\left(\frac{m}{k}, \frac{\omega}{k^2}\right) \quad (10.34)$$

Affinché gli argomenti della funzione f siano quantitativamente adimensionali, la frequenza ω deve necessariamente scalare con il quadrato del vettore d'onda k . Questo dimostra in modo universale, indipendente dalla dimensionalità del sistema, che per modelli ordinati analizzabili in campo medio (teoria gaussiana) l'esponente critico dinamico è rigidamente $z = 2$.

In sistemi reali al punto critico, l'integrazione delle fluttuazioni (gruppo di rinormalizzazione) induce lievi correzioni all'esponente (es. $z \approx 2.15$ in 3D). Tali dinamiche si distinguono in modo diametrico dalla classe di universalità dei sistemi disordinati (*Spin Glasses*), nei quali la frustrazione topologica del panorama energetico eleva l'esponente dinamico a scale di gran lunga superiori ($z \approx 6 \div 7$), rallentando drasticamente il rilassamento del sistema.

github . com / elisabettagnello

Lezione 11

Data: 29/10/2025

11.1 Coarsening e Aging

Iniziamo tracciando una netta distinzione tra due concetti spesso confusi: **coarsening** e **aging**. Il termine *coarsening* (o crescita dei domini) si riferisce al processo in cui un sistema ordinato (come un ferromagnete puro) parte da una configurazione disordinata e, abbassando la temperatura, crea domini magnetici sempre più grandi e "morbidi". Nei sistemi ordinati, questa dinamica è tipicamente molto veloce, tanto che sperimentalmente il sistema raggiunge l'equilibrio termodinamico quasi istantaneamente e non si ha il tempo di osservare la transizione su scale umane.

L'*aging* (invecchiamento), invece, indica che le proprietà fisiche del sistema dipendono dal tempo trascorso (la sua "età") dacché è stato preparato. Questo termine è storicamente riservato ai **sistemi disordinati** (come i vetri di spin), in cui i tempi di rilassamento sono talmente lunghi da superare la scala temporale dell'osservatore. In questi sistemi, la lunghezza di correlazione cresce in modo lentissimo, ad esempio come $t^{1/10}$ (anziché $t^{1/2}$), e il sistema non termalizza praticamente mai.

11.2 Modello $O(N)$ e Dinamica di Rilassamento

Per studiare analiticamente il limite al di sotto della temperatura critica ($T < T_c$), in cui vi è rottura spontanea di simmetria, possiamo introdurre il **Modello $O(N)$** . In questo modello, le variabili di spin $\vec{s}_i$ sono vettori a N componenti: $\vec{s}_i \in \mathbb{R}^N$ con il vincolo $|\vec{s}_i|^2 = N$. L'Hamiltoniana ferromagnetica è:

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{s}_i \cdot \vec{s}_j \quad (11.1)$$

Passando al limite del continuo, sostituiamo le variabili discrete $\vec{s}_i$ con un campo vettoriale continuo $\vec{\phi}(\vec{x}, t)$. Per favorire la rottura di simmetria ($T < T_c$) passiamo da un vincolo *hard* (imposto a forza) a un vincolo *soft* tramite un potenziale quartico:

$$V(\vec{\phi}) = \frac{1}{4N} (N - |\vec{\phi}|^2)^2 \quad (11.2)$$

Questo potenziale ha una forma a "sombbrero" in N dimensioni, con i minimi per $|\vec{\phi}|^2 = N$.




Figura 11.1: Sezione monodimensionale del potenziale a "sombbrero". Il vincolo soft favorisce le configurazioni che risiedono nei minimi degeneri $|\vec{\phi}|^2 = N$.

L'evoluzione temporale del sistema è descritta da un'equazione di Langevin-Ginzburg non lineare:

$$\frac{\partial \vec{\phi}}{\partial t} = \nabla^2 \vec{\phi} + \vec{\phi} - \left(\frac{1}{N} |\vec{\phi}|^2 \right) \vec{\phi} \quad (11.3)$$

In questa equazione distinguiamo:

- $\nabla^2 \vec{\phi}$: Termine diffusivo, tende a omogeneizzare il campo.
- $+\vec{\phi}$: Termine che destabilizza il paramagnete e favorisce l'allontanamento dallo zero.
- $-(|\vec{\phi}|^2/N)\vec{\phi}$: Termine non lineare che limita la crescita esplosiva, confinando il sistema attorno al minimo del potenziale.

Nel limite in cui il numero di componenti diverga ($N \rightarrow \infty$), il termine $|\vec{\phi}|^2/N$ si concentra fortemente sul suo valore atteso grazie alla legge dei grandi numeri:

$$\frac{1}{N} \sum_{a=1}^N \phi_a^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \langle |\vec{\phi}|^2 \rangle_t \quad (11.4)$$

L'equazione diventa così formalmente lineare, ma con un parametro autoconsistente dipendente dal tempo, permettendone la soluzione esatta in ogni dimensione d .

11.2.1 Funzioni di Correlazione e Lunghezza Dinamica

Sotto questa approssimazione, la funzione di correlazione a due tempi e nello spazio $G(r, t, t') = \langle \vec{\phi}(\vec{x}, t) \vec{\phi}(\vec{x} + \vec{r}, t') \rangle$ risulta:

$$G(r, t, t') \propto \left(\frac{4tt'}{(t+t')^2} \right)^{d/4} \exp \left\{ -\frac{r^2}{4(t+t')} \right\} \quad (11.5)$$

- Per analizzare le proprietà spaziali, poniamo $t = t'$:

$$G(r, t) \propto \exp \left\{ -\frac{r^2}{8t} \right\} = \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{r}{L(t)} \right)^2 \right\} \quad (11.6)$$

Questo definisce chiaramente una lunghezza di correlazione (o scala dei domini) che cresce in modo puramente diffusivo:

$$L(t) = 2\sqrt{2t} \propto t^{1/2} \implies z = 2 \quad (11.7)$$

Notiamo che la dipendenza spaziale è gaussiana. Vicino all'origine ($r = 0$) la funzione parte orizzontalmente (con derivata nulla), in netto contrasto con la legge di Porod tipica del modello di Ising puro (dove la rottura netta ai bordi di dominio genera una pendenza iniziale). Questo è l'effetto dell'aver reso le pareti del dominio "sparpagliate" tramite il vincolo soft.




Figura 11.2: Correlazione spaziale gaussiana a tempo fissato. Si nota l'andamento iniziale a pendenza nulla dovuto al vincolo soft.

- Per analizzare il rilassamento temporale, guardiamo l'autocorrelazione nello stesso punto ($r = 0$). Selezioniamo un tempo di attesa t' fissato e guardiamo a tempi successivi $t \gg t'$:

$$C(t, t') \propto \left(\frac{4tt'}{(t+t')^2} \right)^{d/4} \xrightarrow{t \gg t'} \left(\frac{t}{t'} \right)^{-d/4} \quad (11.8)$$

Il decadimento segue una legge a potenza il cui tempo di scala è controllato da t' stesso. Se il sistema ha aspettato tanto (età t' grande), decadrà sempre più lentamente. Questa è l'essenza dell'aging.




Figura 11.3: Comportamento di aging: al crescere dell'età t' , il sistema rilassa progressivamente più tardi nel tempo.

Richiami di Teoria dello Scaling

La fisica dell'aging può essere riscritta manipolando la funzione di correlazione in forma di scaling. Data $L(t) \propto t^{1/z}$ e sapendo che una quantità cresce come una funzione $f(x)$, possiamo riscrivere:

$$L(t) = t^{1/z} f\left(\frac{t}{\xi^z}\right) = t^{1/z} g\left(\frac{\xi^z}{t}\right) = Lh\left(\frac{L}{t^{1/z}}\right) \quad (11.9)$$

Sapendo derivare i regimi asintotici per argomento piccolo e argomento grande ($x \ll 1$ e $x \gg 1$), determiniamo analiticamente quando domina la variabile tempo rispetto alla variabile spaziale fissa e viceversa.

In base alle definizioni, gli andamenti asintotici di queste funzioni sono esplicitati come:

$$f(x) = \begin{cases} x & , x \ll 1 \\ \text{cost.} & , x \gg 1 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x^{1/z} & , x \ll 1 \\ \text{cost.} & , x \gg 1 \end{cases} \quad (11.10)$$

$$h(x) = \frac{f(x)}{x} \quad (11.11)$$




Figura 11.4: Andamento asintotico della funzione di scaling $f(x)$. Si nota il comportamento lineare per $x \ll 1$ e la saturazione a un valore costante per $x \gg 1$.

11.3 Dinamica nel Ferromagnete Diluito

Abbandoniamo il sistema puro e torniamo al nostro modello di riferimento: il **Modello di Ising diluito**. Tracciamo prima il diagramma di fase:




Figura 11.5: Diagramma di Fase del ferromagnete diluito ($h = 0$). Sopra $T_c(p = 1)$ si estende la fase paramagnetica classica. Sotto $T_c(p = 1)$, delimitata dalla curva critica e dalla zona di percolazione, emerge la Fase di Griffiths.

Per semplificare l'analisi, ci posizioniamo a sinistra della soglia di percolazione ($p < p_c$), dove il sistema è interamente formato da cluster disconnessi e finiti. La dinamica totale del sistema sarà la somma delle dinamiche *indipendenti* dei singoli cluster. Ogni cluster è descritto da due parametri principali: la taglia L e la densità locale p' . Ogni cluster rilassa indipendentemente con una costante di tempo caratteristica $\tau(L, p')$. Sotto queste assunzioni, il rilassamento del sistema è:

$$C(t) = \sum_{L, p'} P(L, p') \exp\left(-\frac{t}{\tau(L, p')}\right) \quad (11.12)$$

Essendo cluster finiti senza rottura di ergodicità termodinamica intrinseca, a tempi asintotici decadono in forma esponenziale in base a una catena di Markov su spazio finito di stati. Tuttavia, vedremo che la somma pesata di esponenziali genera andamenti macroscopici che *non* sono esponenziali semplici.

11.3.1 Fase Paramagnetica ($T > T_c(p = 1)$)

A temperature molto alte (sopra il T_c del sistema puro), ci aspettiamo che i cluster più lenti a rilassare siano quelli completamente densi ($p' \simeq 1$), seppur molto rari. Fissando perciò $p' = 1$, la probabilità di trovare una regione di raggio L senza alcun buco è esponenzialmente soppressa:

$$P(L, 1) = p^{L^d} = e^{-cL^d} \quad \text{dove} \quad c = \log(1/p) \quad (11.13)$$

Il tempo di rilassamento per questi cluster pseudo-puri è governato dalla lunghezza di correlazione dinamica del sistema puro ξ , che non diverge:

$$\tau(L, 1) = \xi^z f\left(\frac{L}{\xi}\right) = \begin{cases} L^z & \text{se } \xi \gg L \\ \xi^z & \text{se } \xi \ll L \end{cases} \quad (11.14)$$

Per studiare il comportamento asintotico di $C(t)$, sostituiamo nell'integrale (sommatrice):

$$C(t) = \sum_L \exp\left(-cL^d - \frac{t}{\tau(L, 1)}\right) = \sum_L \exp\left(-cL^d - t\xi^{-z} f\left(\frac{L}{\xi}\right)\right) \quad (11.15)$$

Questa espressione è dominata da un singolo valore di picco, calcolabile minimizzando l'esponente rispetto a L (ponendo la derivata a zero):

$$-cdL^{d-1} - t\xi^{-z-1} f'\left(\frac{L}{\xi}\right) = 0 \quad (11.16)$$

Riorganizzando i termini e isolando la parte dipendente da L/ξ :

$$t \frac{\xi^{-z-1}}{L^{d-1}} f'\left(\frac{L}{\xi}\right) = \text{cost.} \implies t \xi^{-z-1+d} f'\left(\frac{L}{\xi}\right) = \text{cost.} \quad (11.17)$$

Invertendo questa espressione, otteniamo per il cluster dominante L^* una funzione in forma di scaling dipendente da t/ξ^{z+d} :

$$L^* = \xi f\left(\frac{t}{\xi^{z+d}}\right) = \begin{cases} t^{\frac{1}{z+d}} & , t \ll \xi^{z+d} \\ \xi & , t \gg \xi^{z+d} \end{cases} \quad (11.18)$$

Inserendo l'ottimo di L di nuovo nell'equazione, otteniamo i due regimi per il logaritmo della correlazione:

$$-\log C(t) \propto \begin{cases} t^{\frac{d}{d+z}} & , t \ll \xi^{z+d} \\ \frac{t}{\xi^z} & , t \gg \xi^{z+d} \end{cases} \quad (11.19)$$

In fase paramagnetica, anche un sistema disordinato decade esponenzialmente per $t \gg \xi^{z+d}$. Tuttavia, questo regime è visibile solo a tempi enormi, quando $C(t)$ è già diventata minuscola e dominata dal rumore numerico. Il regime che domina l'osservazione a tempi intermedi è il primo, dove la correlazione decade secondo una legge **Stretched Exponential** (esponenziale allungato), tipica nei sistemi disordinati:

$$C(t) \propto \exp(-at^b) \quad \text{con } b = \frac{d}{d+z} < 1 \quad (11.20)$$

Se ci troviamo esattamente alla criticità del sistema puro, $T = T_c(p = 1)$, si ha sempre un decadimento stretched che obbedisce alla forma:

$$-\log C(t) = t^{\frac{d}{d+z}} f\left(\frac{t}{\xi^{d+z}}\right) \quad (11.21)$$

11.3.2 Fase di Griffiths ($T < T_c(p = 1)$)

Mettiamoci ora al di sotto della temperatura critica del sistema puro. Gli unici cluster che dominano la fisica a tempi lunghi sono ancora quelli densi ($p' \simeq 1$), ma questa volta hanno rotto spontaneamente la simmetria. Rilassare una configurazione ordinata costa uno sforzo proporzionale all'area della barriera energetica da superare (tensione superficiale σ). Seguiamo quindi una legge di attivazione termica tipo Arrhenius:

$$\tau(L, 1) \sim \tau_0 \exp(\sigma L^{d-1}) \quad (11.22)$$

dove τ_0 è il tempo microscopico e σ la tensione superficiale. Avvicinandosi alla temperatura critica del sistema puro, le due quantità scalano come:

$$T \rightarrow T_c(p = 1) : \quad \sigma \sim \xi^{-(d-1)} \quad \tau_0 \sim \xi^z \quad (11.23)$$

Andiamo a inserire il nuovo tempo di rilassamento τ nella funzione $C(t)$:

$$C(t) = \sum_L \exp\left(-cL^d - \frac{t}{\tau_0} \exp(-\sigma L^{d-1})\right) \quad (11.24)$$

Ottimizzando l'esponente rispetto a L (derivata uguale a zero) si giunge all'equazione:

$$-cdL^{d-1} + \frac{t}{\tau_0} e^{-\sigma L^{d-1}} \sigma (d-1) L^{d-2} = 0 \quad (11.25)$$

Applicando il logaritmo per isolare l'esponente σL^{d-1} , si ottiene:

$$\sigma L^{d-1} = \log\left(\frac{(d-1)\sigma t}{cd\tau_0}\right) - \log L \quad (11.26)$$

In prima approssimazione, ignorando il termine debole $\log L$ rispetto alla potenza, possiamo risolvere per L :

$$L = \left(\frac{1}{\sigma} \log\left(\frac{(d-1)\sigma t}{cd\tau_0}\right)\right)^{\frac{1}{d-1}} \propto \log(t)^{\frac{1}{d-1}} \quad (11.27)$$

La taglia del cluster che sta dominando il rilassamento cresce con il tempo a velocità enormemente ridotta come potenza del logaritmo. Sostituendo questo valore di L nell'espressione dell'esponente originario, ricaviamo il comportamento finale della funzione di correlazione in Fase di Griffiths:

$$-\log C(t) \propto \log(t)^{\frac{d}{d-1}} \quad (11.28)$$

Infine, calcolando il limite per l'avvicinamento al punto critico da sotto, la funzione assume un'espressione di scaling completa, mostrando che la dipendenza spaziale e temporale diverge ma la forma di scaling rimane invariata:

$$T \rightarrow T_c^-(p = 1) : \quad -\log C(t) = \xi^d \left[\log\left(\frac{t}{\xi^{d+z}}\right) \right]^{\frac{d}{d-1}} \quad (11.29)$$