

BIC Insulina: Preparación: 100 UI insulina corriente en 100 ml SF = 1UI/ml

- 1) Objetivo: mantener glucemias entre 100-150 mg/dl
- 2) Bolo y dosis inicial:

Goteo de Dextrosa 5%: inicia cuando las glucemias son menores a 200 mg/dl

Controles: HORARIOS hasta valores estables entre 100-150 mg/dl por mas de 4 hs, luego controles cada 2 hs.

Glucemia	Bolo IV	Bomba (ml/h)
<150	0	0
151-180	0	1
181-220	2	2
221-260	3	2,5
261-300	4	3
>300	6	3,5

AJUSTES SEGÚN LA TABLA ↓

PREVIA →	<60	61-79	80-99	100-120	121-150	151-160	161-180	181-200	201-220	221-240	241-260	261-280	281-300	301-320	321-340	341-360	>360
ACTUAL ↓																	
<60	SUSPENDER INFUSIÓN. TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA: HIPERTONICO GLUCOSADO 25% 1 AMP C/ 15 MIN HASTA GLUCEMIA >60																
61-79	SUSPENDER INFUSIÓN. CONTROL EN 30 MIN.																
80-99	DISMINUIR DOSIS A LA MITAD																
100-120	SUSPENDER INFUSION	SIN CAMBIOS			↓0,3	↓0,5	DISMINUIR DOSIS A LA MITAD										
121-150		SIN CAMBIOS				↓0,3	↓0,5	DISMINUIR DOSIS A LA MITAD									
151-160	AUMENTAR INFUSIÓN 0,5 ML/H					SIN CAMBIOS		↓ 1 ML/H		DISMINUIR DOSIS A LA MITAD							
161-180	AUMENTAR INFUSIÓN 0,5 ML/H							SIN CAMBIOS				↓ 1 ML/H					
181-200	AUMENTAR INFUSIÓN 1 ML/H									SIN CAMBIOS				↓ 1 ML/H			
201-220	AUMENTAR INFUSIÓN 2 ML/H						AUMENTAR 1 ML/H				SIN CAMBIOS			↓ 1 ML/H			
221-240							AUMENTAR 1 ML/H						SIN CAMBIOS			↓ 1 ML/H	
241-260							AUMENTAR 1 ML/H						SIN CAMBIOS			↓ 1 ML/H	
261-280							AUMENTAR 1 ML/H						SIN CAMBIOS			↓ 1 ML/H	
281-300	AUMENTAR INFUSIÓN +2,5 ML/H													SIN CAMBIOS		↓ 1 ML/H	
301-320	BOLO DE 5 UI + AUMENTAR INFUSIÓN +2,5 ML/H															SIN CAMBIOS	
321-340	BOLO DE 5 UI + AUMENTAR INFUSIÓN +3 ML/H																
341-360	BOLO DE 5 UI + AUMENTAR INFUSIÓN +3ML/H																
>360	BOLO DE 6 UI + AUMENTAR INFUSIÓN +4 ML/H																