



Métodos Matemáticos para la Física II (LFIS 311)

Licenciatura en Física

Profesor: Graeme Candlish Semestre I 2024

Tarea 1

1. Mostrar que el producto punto es invariante bajo una rotación de los vectores.
2. Demostrar la siguiente identidad (f y g son escalares):

$$\nabla^2(fg) = f\nabla^2g + g\nabla^2f + 2(\nabla f) \cdot (\nabla g)$$

3. Mostrar que un vector de desplazamiento que es ortogonal al gradiente de ϕ es tangente a una superficie de $\phi = \text{constante}$ (a veces llamado *superficie equipotencial*).
4. Utilizando el resultado anterior, encontrar el vector unitario normal a la superficie equipotencial dada por $\phi(x, y, z) = 2x^2 + y + 4z^2 = 6$.
5. Calcular $\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{A})$ donde $\mathbf{A} = (y^2, x^2, 0)$.
6. Calcular el trabajo realizado contra una fuerza dada por

$$\mathbf{F} = \frac{\hat{\mathbf{e}}_x x}{x^2 + y^2} + \frac{\hat{\mathbf{e}}_y y}{x^2 + y^2}$$

A lo largo del círculo unitario en el plano xy desde $\theta = 0$ (que es el punto $(1, 0)$) hasta $\theta = \pi/2$ (el punto $(0, 1)$).

7. Dado un vector $\mathbf{t} = -\hat{\mathbf{e}}_x y + \hat{\mathbf{e}}_y x$, mostrar, con la ayuda del teorema de Stokes, que

$$\frac{1}{2} \oint_C \mathbf{t} \cdot d\lambda = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx) = A$$

donde el camino C es un camino continuo y cerrado, y A es el área encerrada por la curva.

8. Una esfera de radio a está cargada uniformemente en todo su volumen. Encontrar el potencial electrostático $\varphi(r)$ para $0 \leq r < \infty$, donde

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

y ρ es la densidad de carga.

9. Un alambre largo y recto que lleva una corriente I es fuente de un campo de inducción magnética \mathbf{B} dado por

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(-\frac{y}{(x^2 + y^2)}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

Encontrar un potencial magnético \mathbf{A} .