


Un ejemplo para estudiantes de física

El problema de los dos osciladores




Consideremos dos objetos de masas m_1 y m_2 como muestra la figura vinculados por tres resortes de igual dureza k .

x e y miden los desplazamientos de las masas desde sus posiciones de equilibrio.

Queremos hallar las frecuencias de los modos de oscilación normal de las masas. Esto es las frecuencias a las cuales las dos masas oscilan con igual frecuencia.

Planteamos el diagrama de cuerpo libre para cada oscilador.



Las ecuaciones de movimiento serán:

$$\begin{cases} m_1 \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx + k(y - x) \\ m_2 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = -k(y - x) - ky \end{cases}$$

Supongamos ahora soluciones sinusoidales de la misma frecuencia y amplitud para m_1 y m_2 .

$$x = A \cdot \cos \omega t$$

$$\dot{x} = -\omega \cdot A \cdot \text{sen } \omega t$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 \cdot A \cdot \cos \omega t$$

Lo mismo para y.

Reemplazando ...

$$\begin{cases} m_1(-\omega^2 x) = -2kx + ky \\ m_2(-\omega^2 y) = kx - 2ky \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\omega^2 x = \frac{-2kx}{m_1} + \frac{ky}{m_1} \\ -\omega^2 y = \frac{kx}{m_2} - \frac{2ky}{m_2} \end{cases}$$

Formemos ahora una ecuación matricial:

$$\begin{pmatrix} -\omega^2 & 0 \\ 0 & -\omega^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-2k}{m_1} & \frac{k}{m_1} \\ \frac{k}{m_2} & \frac{-2k}{m_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} \frac{2k}{m_1} & -\frac{k}{m_1} \\ -\frac{k}{m_2} & \frac{2k}{m_2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \omega^2 & 0 \\ 0 & \omega^2 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

La última ecuación es muy similar a ésta (si consideramos $\lambda = \omega^2$):

$$A \cdot \vec{v} - \lambda \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

Finalmente, busquemos los valores propios de la matriz, planteando que:

$$\det(A - \lambda \cdot I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \frac{2k}{m_1} - \omega^2 & -\frac{k}{m_1} \\ -\frac{k}{m_2} & \frac{2k}{m_2} - \omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

Para simplificar, consideremos a las dos masas iguales. Obtenemos los siguientes valores propios:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad y \quad \omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

Ahora reemplazamos esos valores propios tal como hacíamos antes para obtener los vectores propios:

$$\text{Si } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-k}{m} & \frac{k}{m} \\ \frac{k}{m} & \frac{-k}{m} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El vector propio es $\overrightarrow{v_{p1}} = \langle 1, 1 \rangle$

$$\text{Si } \omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{k}{m} & \frac{k}{m} \\ \frac{k}{m} & \frac{k}{m} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El vector propio es $\overrightarrow{v_{p2}} = \langle 1, -1 \rangle$

¿Cómo interpretamos esos vectores?

Observen que en el primer caso $y = x$, las dos masas oscilan con la misma frecuencia en simultáneo a izquierda y derecha. En el segundo caso $y = -x$, por tanto las dos masas se desplazan en simultáneo hacia adentro y hacia afuera.