

Segon Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Desembre 2025

Un objecte de massa m es troba subjecte entre dues molles de constant k i longitud natural l . La distància entre les parets és $2l$ (com es mostra a la figura 1) i la partícula només es pot moure unidimensionalment. El Hamiltonià de la partícula és

$$H = \frac{p^2}{2m} + kx^2. \quad (1)$$




Figura 1: Sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el nombre de microstats de la partícula en funció de la seva energia E .

Per tal de calcular el nombre de microstats tenim que

$$\Omega(E, V, N) = \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{3N}} \delta(E - H(\vec{q}, \vec{p})). \quad (2)$$

Aquesta integral és molt complicada de resoldre i, per això, definirem una nova funció que representi el volum contingut dins de la hipersuperfície de l'espai de fases

$$\Gamma(E, V, N) = \int_0^E \Omega(E', V, N) dE'. \quad (3)$$

Amb aquesta nova relació, el càlcul del nombre de microstats se'ns simplifica i ve donat per

$$\Omega(E, V, N) = \left(\frac{\partial \Gamma(E, V, N)}{\partial E} \right)_{V, N}. \quad (4)$$

Troblem doncs primer la funció $\Gamma(E, V, N)$ amb l'expressió (3).

Notem que el nostre problema té una sola dimensió i que només tenim una massa. Per això, l' h del denominador queda elevada a 1. Per aquest mateix motiu, la posició només dependrà de x i el moment només tindrà aquesta mateixa component.

La condició que s'ha de complir és

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E \Rightarrow \frac{p^2}{2mE} + \frac{k}{E}x^2 \leq 1.$$

Per tal de resoldre la integral hem de fer un parell de canvis de variable

$$Z_1^2 = \frac{p^2}{2mE} \Rightarrow dZ_1 = \frac{dp}{\sqrt{2mE}},$$

$$Z_2^2 = \frac{k}{E}x^2 \Rightarrow dZ_2 = \sqrt{\frac{k}{E}}dx.$$

La condició, doncs, ara és $Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1$. Aplicant aquests canvis a l'equació (3) tenim

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} \sqrt{2mE} \cdot \sqrt{\frac{E}{k}} dZ_1 dZ_2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} E \cdot \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} dZ_1 dZ_2. \quad (5)$$

Hem d'utilitzar el volum de la hipersfera següent

$$\int_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2} dx_1 \dots dx_n = \frac{\sqrt{\pi^n}}{\left(\frac{n}{2}\right)!} R^n. \quad (6)$$

Per tant, podem continuar l'expressió que teníem a (5)

$$\Gamma(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \cdot \frac{\sqrt{\pi^2}}{\left(\frac{2}{2}\right)!} \cdot 1^2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \pi. \quad (7)$$

Tal i com hem raonat anteriorment a (4), ara només ens queda derivar aquest volum respecte l'energia E per trobar el nombre de microestats.

Fent la derivada obtenim que

$$\Omega(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{\pi}{h}. \quad (8)$$

Hi ha una manera alternativa per trobar l'hipervolum Γ que exposarem a continuació.

Tenint la condició

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E,$$

podem aïllar el moment en funció de la posició, és a dir

$$p(x) = \pm \sqrt{2m(E - kx^2)}, \quad (9)$$

on hem escollit $H = E$, és a dir, hem escollit la hipersuperfície que delimita l'hipervolum de l'espai de fases. Si representem aquesta funció tenim el següent:




Figura 2: Representació gràfica del moment en funció de la posició.

Mirant la figura 2 veiem que tenim una el·lipse en una dimensió. L'hipervolum Γ que estem buscant és justament el volum comprès a l'interior d'aquesta el·lipse i, aprofitant que és una forma geomètrica coneguda, podem utilitzar la fórmula següent

$$\text{Àrea d'una el·lipse} = \pi \cdot a \cdot b, \quad (10)$$

on a i b són els radis major i menor que clarament són

$$a = \sqrt{\frac{E}{k}}$$

$$b = \sqrt{2mE}.$$

Amb l'equació (10) trobem la mateixa expressió que hem obtingut anteriorment (7). Per tant, derivant l'expressió en funció de l'energia acabem trobant la mateixa equació (8)¹.

Apartat b)

Si tot el sistema es troba dins d'un bany tèrmic a temperatura T la partícula estarà sotmesa a un soroll tèrmic. Calculeu la funció de partició de la partícula i el valor mig de l'energia de la partícula $\langle E \rangle$. Establiu els límits d'altres i baixes temperatures i trobeu $\langle E \rangle$ en aquests límits. Raoneu físicament els resultats. Calculeu el valor mig de la posició de la partícula i la varianza de la posició i analitzeu i raoneu els límits d'altres i baixes temperatures.

1. Càlcul de la funció de partició.

La funció de partició que hem de calcular és la funció de partició canònica Z (tenim el sistema en un bany tèrmic a temperatura T). Per calcular-la podem usar la seva definició (que vam veure a teoria) aplicada a aquest cas en què tenim una única partícula sotmesa al hamiltonià de (1). Així doncs, tenim que

$$Z = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta H(x,p)} = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta p^2/2m} e^{-\beta kx^2} = \frac{1}{h} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp. \quad (11)$$

Calculem ara per separat les dues integrals anteriors. La segona és una integral Gaussiana estàndard que es pot calcular si recordem que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (12)$$

de manera que tenim que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (13)$$

Per altra banda, la primera integral és també una Gaussiana però amb els límits d'integració diferents de $\pm\infty$ i, per tant, la podem deixar en termes de la *error function* $\text{erf}(x)$. Recordem que aquesta funció és la següent

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt. \quad (14)$$

Si desenvolupem la primera integral de (11) tenim el següent

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx &= 2 \int_0^l e^{-\beta kx^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{\beta k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}), \end{aligned} \quad (15)$$

on al primer pas hem fet usat que la $e^{-\beta kx^2}$ és una funció simètrica respecte del 0 i, al segon pas, hem fet el següent canvi de variable

$$\begin{aligned} \sqrt{\beta k}x &= t, \\ \sqrt{\beta k}dx &= dt. \end{aligned}$$

Així doncs, si usem els resultats (13) i (15) sobre (11), trobem la funció de partició canònica pel sistema que estem estudiant

$$Z(\beta) = \frac{\pi}{h\beta} \sqrt{\frac{2m}{k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}). \quad (16)$$

¹Llevat del factor $\frac{1}{h}$, que hauríem d'afegir a posteriori.

Una forma alternativa de calcular aquesta funció de partició és usant que Z és la transformada de Laplace de Ω , és a dir

$$Z = \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \Omega(E, V, N), \quad (17)$$

aprofitant que, a l'apartat anterior, hem calculat el nombre de microestats Ω .

2. Càlcul de $\langle E \rangle$ i límits d'altres i baixes temperatures. Per calcular $\langle E \rangle$ (que es correspondria amb l'energia interna U un cop prenguéssim el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$), usem que, tal i com es va demostrar a les classes teòriques

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (18)$$

Si prenem el logaritme neperià de $Z(\beta)$ (equació (16)), tenim que

$$\ln Z = \ln \left(\frac{1}{\beta} \right) + \ln \left(\frac{\pi}{h} \cdot \sqrt{\frac{2m}{k}} \right) + \ln \left(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right), \quad (19)$$

de manera que

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{1/\beta} \cdot \left(-\frac{1}{\beta^2} \right) + \frac{d}{d\beta} \left[\ln \left(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right) \right] = -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d}{d\beta} \left[\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right].$$

Per fer la darrera derivada, apliquem la regla de la cadena

$$\frac{d}{d\beta} \left[\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right] = \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d(l\sqrt{\beta k})}{d\beta} = \frac{l\sqrt{k}\beta^{-1/2}}{2} \cdot \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} = \dots$$

usant la definició de la *error function* donada a (14), obtenim

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[\int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt \right] = \dots$$

i ara, recordant la *regla de Barrow*, arribem a que

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) - F(0) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} e^{-l^2\beta k}.$$

Així doncs, si agrupem tot això

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{\beta} + \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (20)$$

Per tant, el valor esperat de l'energia de la partícula serà

$$\boxed{\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}}. \quad (21)$$

Estudiem ara els límits d'altres i baixes temperatures. Per fer això, hem de comparar l'energia tèrmica del sistema $k_B T \equiv \frac{1}{\beta}$ amb l'energia potencial elàstica kl^2 deguda a la presència de les molles. És a dir, hem d'estudiar el comportament del factor

$$x \equiv \frac{kl^2}{k_B T} = l^2 \beta k \quad (22)$$

(a) **Comportament de $\langle E \rangle$ a altres temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$ i, aleshores

$$k_B T \gg kl^2 \Rightarrow 1 \gg \frac{kl^2}{k_B T} \Rightarrow 1 \gg l^2 \beta k$$

Per veure el comportament de la *error function* quan la variable $l^2 k \beta$ tendeix a 0 usem la seva expansió en sèrie de Taylor (treballant fins a primer ordre)²

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} - \frac{z^7}{42} + \dots \right) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} z. \quad (23)$$

Això, en el nostre cas, es tradueix en què

$$\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \approx 2\sqrt{\frac{l^2 \beta k}{\pi}}. \quad (24)$$

Per altra banda, per $1 \gg l^2 \beta k$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 1. \quad (25)$$

Si substituïm les aproximacions per altes temperatures (24) i (25) sobre (23), trobem que

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{\beta} - \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2\beta} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \boxed{\langle E \rangle_{T \rightarrow \infty} \approx \frac{1}{2} k_B T} \end{aligned} \quad (26)$$

RAONAR FÍSICAMENT A PARTIR DEL TEOREMA D'EQUIPARTICIÓ

(b) Comportament de $\langle E \rangle$ a baixes temperatures.

En aquest cas tenim que $T \rightarrow 0$ i, aleshores

$$kl^2 \gg k_B T \Rightarrow \frac{kl^2}{k_B T} \gg 1 \Rightarrow l^2 \beta k \gg 1$$

Sabem (no se si voleu explicar pq dona 1 o citem algun lloc q ho digui) que la funció d'error, $\operatorname{erf}(x)$, és igual a 1 quan $x \rightarrow \infty$.

Per altra banda, per $l^2 \beta k \gg 1$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 0 \quad (27)$$

Substituint les aproximacions per a baixes temperatures (REF) sobre (REF), trobem que

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{\beta} - 0 = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \boxed{\langle E \rangle_{T \rightarrow 0} \approx k_B T} \end{aligned} \quad (28)$$

(c) *Discussió dels resultats obtinguts*

L'evolució de l'energia mitjana s'explica mitjançant el teorema d'equipartició, el qual estableix que, en equilibri tèrmic, cada grau de llibertat que contribueix de forma quadràtica al Hamiltonià aporta exactament $k_B T/2$ a l'energia total del sistema.

Al límit de baixes temperatures, la partícula es comporta com un oscil·lador harmònic pur perquè no té prou energia per arribar a les parets, presentant dos termes quadràtics, el de l'energia cinètica, $p^2/2m$, i el del potencial, kx^2 , que ens dona un resultat de $k_B T$. En canvi, en el límit d'altres temperatures, l'energia tèrmica domina sobre la potencial elàstica, fent que el sistema es comporti com una partícula en una caixa, és a dir, el terme potencial deixa de ser quadràtic (no se com explicar això, tipo, q AAAAAAAA), i per tant, només el grau de llibertat cinètic es manté rellevant segons el teorema, resultant en una energia mitjana de $k_B T/2$.

²Aquest resultat es pot trobar desenvolupant e^{-z^2} en sèrie de Taylor i integrant terme a terme. Veure https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function.

3. Càlcul de $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$ i $(\Delta x)^2$ i límits d'altres i baixes temperatures.

Per determinar el valor esperat de la posició $\langle x \rangle$, utilitzem l'expressió del valor mitjà

$$\langle x \rangle = \int \frac{dx dp}{h} x \rho(x, p) \quad (29)$$

on $\rho(x, p)$ representa la densitat de probabilitat en l'espai de fases, definida com

$$\rho(x, p) = \frac{e^{-\beta H(x, p)}}{Z} \quad (30)$$

Substituint el Hamiltonià $H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + kx^2$ i la funció de partició Z obtinguda anteriorment (REF), l'expressió es pot factoritzar en dues integrals independents sobre el moment i la posició, quedant

$$\langle x \rangle = \frac{1}{Zh} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} dp \int_{-l}^l x e^{-\beta k x^2} dx = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} dp \int_{-l}^l x e^{-\beta k x^2} dx \quad (31)$$

On hem definit la constant de normalització $A = (Zh)^{-1}$.

Aplicant els següents canvis de variable

$$u_1 = p \sqrt{\frac{\beta}{2m}} \Rightarrow dp = \sqrt{\frac{2m}{\beta}} du_1 \quad (32)$$

$$u_2 = x \sqrt{\beta k} \Rightarrow dx = \frac{1}{\sqrt{\beta k}} du_2 \quad (33)$$

L'expressió esdevé

$$\langle x \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\beta k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u_1^2} du_1 \int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} u_2 e^{-u_2^2} du_2 \quad (34)$$

Observem que la integral respecte a u_2 es pot resoldre de forma directa

$$\int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} u_2 e^{-u_2^2} du_2 = \left[-\frac{1}{2} e^{-u_2^2} \right]_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} = -\frac{1}{2} (e^{-l^2 \beta k} - e^{-l^2 \beta k}) = 0 \quad (35)$$

Que al ser una funció imparella, i l'interval d'integració ser simètric, la integral s'anul·la. Per tant, el valor esperat de la posició és

$$\boxed{\langle x \rangle = 0} \quad (36)$$

Per trobar la varianza de la posició, cal trobar $\langle x^2 \rangle$, ja que $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$.

Seguim el mateix procediment fins ara, però tenint x^2 . Aplicant els mateixos canvis de variable, ens queda

$$\langle x^2 \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\sqrt{\beta k}} \frac{1}{\beta k} \int du_1 e^{-u_1^2} \int du_2 u_2^2 e^{-u_2^2} \quad (37)$$

Observem que afegint un terme $2/\sqrt{\pi}$ a l'integral del moment lineal, tenim una *error function*. Aquesta integra de $-\infty$ a ∞ . Sabent que $\text{erf}(\infty) = 1$ (REF de quan l'eric posi la demostració) i que és una funció imparella, ens queda que l'integral del moment és

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_{-\infty}^{\infty} du_1 \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u_1^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} [\text{erf}(u_1)]_{-\infty}^{\infty} = \sqrt{\pi} \quad (38)$$

Per l'integral de la posició, la integrem per parts

$$v = u_2 \quad dv = du_2 \quad (39)$$

$$dw = u_2 e^{-u_2^2} du_2 \quad w = -\frac{1}{2} e^{-u_2^2} \quad (40)$$

Que ens queda

$$-\frac{1}{2} \left[u_2 e^{-u_2^2} - \int e^{-u_2^2} du_2 \right] = -\frac{1}{2} \left[u_2 e^{-u_2^2} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u_2^2} du_2 \right] \quad (41)$$

Tornem a tenir una *error function*, aquest cop integrada de $-l$ a l , desfent el canvi de variable i aplicant els límits d'integració

$$-\frac{1}{2} \left[\sqrt{\beta k} x e^{-\beta k x^2} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} x) \right]_{-l}^l = -\frac{1}{2} \left[2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} - \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right] \quad (42)$$

Combinant els resultats trobats per a les integrals individualment amb les constants inicials fora l'integral, ens queda

$$\langle x^2 \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\sqrt{\beta k}} \frac{1}{\beta k} [\sqrt{\pi}] \left[-\frac{1}{2} \left(2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} - \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right] \quad (43)$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{A}{\beta^2 k} \sqrt{\frac{2m}{k}} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{2} \left(-2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} + \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right) \quad (44)$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\beta}{\pi \sqrt{\frac{2m}{k}} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \frac{1}{\beta^2 k} \sqrt{\frac{2m}{k}} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{2} \left(-2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} + \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right) \quad (45)$$

Simplificant, ens queda

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\beta k \sqrt{\pi} \operatorname{erf}} \left(\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) - 2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} \right) \quad (46)$$

$$\boxed{\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{e^{-\beta k l^2}}{\operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \right)} \quad (47)$$

Estudiarem ara els límits d'altres i baixes temperatures. Compararem l'energia tèrmica del sistema amb la potencial, que correspon al factor (22), com hem fet també per al valor mig de l'energia, $\langle E \rangle$.

- (a) **Comportament de $\langle x^2 \rangle$ a altes temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$. Com hem dit, el comportament del sistema ve determinat pel mateix factor (22) que s'ha analitzat en el càlcul de l'energia mitjana $\langle E \rangle$. També tenim d'aquest apartat, l'aproximació per la *error function* (24), i l'exponencial (25). D'aquesta manera, $\langle x^2 \rangle$ ens queda com

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{1}{2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}}} \right) = \frac{1}{2\beta k} (1 - 1) = 0 \quad (48)$$

Com que el terme principal s'anul·la, cal considerar termes d'ordre superior. Per simplificar els càlculs, ho deixem en funció de $z = \sqrt{\beta k} l$. Tenim

$$\operatorname{erf}(z) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} \right) \quad (49)$$

$$e^{-z^2} \approx 1 - z^2 \quad (50)$$

Substituint

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{1 - z^2}{\frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} \right)} \right) = \frac{1}{2\beta k} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} z \frac{1 - z^2}{z - \frac{z^3}{3}} \right) = \frac{1}{2\beta k} \left(1 - \frac{1 - z^2}{1 - \frac{z^2}{3}} \right) \quad (51)$$

Tenint en compte que per u petites, $\frac{1}{1-u} \approx 1 + u$, sent, en aquest cas, $u = \frac{z^2}{3}$, ens queda

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - (1 - z^2) \left(1 + \frac{z^2}{3} \right) \right) \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 1 + \frac{2}{3} z^2 \right) = \frac{1}{2\beta k} \frac{2}{3} \beta k l^2 \quad (52)$$

On només s'han conservat els termes fins a segon ordre, ja que $z \ll 1$. Per tant, per al límit de temperatures altes, ens queda

$$\boxed{\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{3} l^2} \quad (53)$$

- (b) **Comportament de $\langle x^2 \rangle$ a baixes temperatures.** Com ja hem comentat per al límit de temperatures altes, usarem les mateixes aproximacions trobades per al cas de l'energia. Tenint (REF erf(infinit)=1 eric) i (27), ens queda

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2 \sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{0}{1} \right) = \frac{1}{2\beta k} \quad (54)$$

Per tant, per al límit de temperatures baixes, obtenim

$$\boxed{\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k}} \quad (55)$$

(c) **Discussió dels resultats obtinguts**

Els resultats obtinguts per a $\langle x^2 \rangle$ en els límits d'altres i baixes temperatures del bany tèrmic son coherents amb els esperats. En el límit de baixes temperatures, on l'energia potencial elàstica domina sobre l'energia tèrmica, el sistema es comporta com un oscil·lador harmònic clàssic no confinat. La partícula realitza oscil·lacions al voltant del punt d'equilibri i la probabilitat que arribi a les parets és pràcticament nul·la, de manera que el valor aproximat obtingut és el terme predit pel teorema d'equipartició per a un potencial parabòlic, que actua com si les parets no existissin. Per al límit d'altres temperatures, l'energia tèrmica domina sobre l'energia potencial elàstica. En aquest límit, la massa té prou energia per moure's per tot l'espai disponible fins a xocar amb les parets, les quals passen a ser el factor determinant del moviment. El sistema passa a tenir el comportament d'una partícula lliure en una caixa de potencial infinit on la constant elàstica de les molles ja no influeix en el resultat i el valor de $\langle x^2 \rangle$ depèn exclusivament de la distància entre les parets.