

Primer Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Novembre 2025

L'equació fonamental per l'energia lliure de Gibbs d'un gas és

$$G = -nRT \ln \left(\frac{AT^c}{P} \right) = -Nk_B T \ln \left(\frac{AT^c}{P} \right), \quad (1)$$

on n és el nombre de mols, N el nombre de partícules, A és un paràmetre i c una constant positiva.

Apartat a)

Trobeu l'equació tèrmica d'estat i l'equació calòrica d'estat per l'energia interna. De quin tipus de gas es tracta?

Per tal de poder trobar l'equació tèrmica d'estat buscarem primer quina és l'equació de Gibbs per G . Per fer això, primer cal que trobem quina forma pren G . Els potencials termodinàmics (entre ells l'energia lliure de Gibbs) es poden obtenir fent la transformada de Legendre en $x_1, \dots, x_k$ (les variables que transformem) de l'equació fonamental del nostre sistema en la representació de l'energia interna. Tanmateix, recordem que

$$\mathcal{L}_{x_1, \dots, x_k}[y(x_1, \dots, x_n)] = y(p_1, \dots, p_k, x_{k+1}, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^k x_i p_i, \quad (2)$$

on hem definit $p_i = \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)_{x_j \neq i}$.

Així, usant (2), la transformada de Legendre de l'energia interna $U(S, V, N)$ en l'entropia S i el volum V ens dona l'energia lliure de Gibbs G en les seves variables naturals (T, P, N) . L'expressió per a aquesta transformada és

$$\mathcal{L}[U(S, V, N)]_{S, V} = G(T, P, N) = U - V \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} - S \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N}. \quad (3)$$

Per altra banda, sabem que l'equació de Gibbs per l'energia interna U per un fluid monocomponent és

$$dU = TdS - PdV + \mu dN. \quad (4)$$

D'aquesta última equació podem deduir les següents relacions:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} = -P \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} = T \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{V, S} = \mu$$

Recuperant l'expressió (3) i substituint aquestes correspondències trobem fàcilment que

$$G = U - ST + PV. \quad (5)$$

Si diferenciem aquesta expressió de l'energia de Gibbs, aplicant la regla de la cadena, trobem

$$dG = dU - TdS - SdT + PdV + VdP.$$

Aquí podem substituir el diferencial de l'energia interna per l'equació (4), de manera que s'eliminen molts termes i ens queda l'equació de Gibbs per l'energia lliure de Gibbs $G(T, P, N)$

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN. \quad (6)$$

Per altra banda, $G(T, P, N)$ també es pot diferenciar obtenint així que

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} dN. \quad (7)$$

Per comparació entre les expressions (6) i (7), veiem que $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = V$. Aquesta equació ens portarà fins a l'equació tèrmica d'estat pel sistema que estem estudiant.

Fem doncs la derivada de l'equació fonamental de l'energia de Gibbs que ens dona l'enunciat:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = -nRT \cdot \left(\frac{P}{AT^c} \cdot \left(-\frac{AcT^c}{P^2}\right)\right) = \frac{nRT}{P}.$$

Com que aquesta derivada és igual al volum V , acabem trobant l'equació tèrmica d'estat del sistema:

$$\boxed{P(T, V, N) = \frac{Nk_B T}{V}}. \quad (8)$$

Aquesta equació ens indica també que estem tractant amb un **gas ideal**.

Busquem ara l'equació calòrica pel sistema en la representació de l'energia interna. Ho podem fer de varies maneres, la més general és determinant prèviament l'equació fonamental del sistema en la representació de l'energia interna $U(S, V, N)$ i després, usant (4) per trobar les equacions calòriques d'estat. De (5) és immediat veure que

$$U = G + ST - PV, \quad (9)$$

i, si substituïm per (1), tenim que

$$U = -Nk_B T \ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + TS - PV.$$

Ara bé, per tal que aquesta equació sigui fonamental, l'hem d'expressar en termes de les variables naturals de U , això és S , V i N . Comencem buscant una expressió per l'entropia. Comparant (6) i (7), tenim que $S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N}$, per tant

$$S = \frac{\partial}{\partial T} \left[Nk_B T \ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) \right]_{P,N} = Nk_B \left(\ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + c \right),$$

i, usant l'equació tèrmica, obtenim

$$S = Nk_B \left(\ln\left(\frac{AVT^{c-1}}{Nk_B}\right) + c \right).$$

Finalment,

$$S(T, V, N) = Nk_B \left(\ln\left(\frac{AV}{Nk_B}\right) + (c-1) \ln T + c \right). \quad (10)$$

Ara usem (10) i l'equació tèrmica d'estat sobre (9):

$$\begin{aligned} U &= G + TS - PV = -Nk_B T \ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + Nk_B T \left(\ln\left(\frac{AV}{Nk_B}\right) + (c-1) \ln T + c \right) - Nk_B T \\ &= -Nk_B T \left[\ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + (c-1) \ln T - \frac{S}{Nk_B} + 1 \right] \\ &= Nk_B T(c-1). \end{aligned}$$

Aquesta darrera equació ja és l'equació calòrica que estàvem buscant per U . Així doncs,

$$\boxed{U(T, N) = Nk_B T(c-1)}. \quad (11)$$

Igual que en el cas de l'equació tèrmica d'estat, l'equació calòrica ens diu que tenim un gas ideal. En funció del valor que prengui la constant $c-1$, tindrem un tipus de gas ideal o un altre (monoatòmic, diatòmic, etc.). Ho discutim en el següent apartat.

Si volem arribar fins a l'equació fonamental en la representació de l'energia interna, només cal invertir $S(T, N, V)$ (10) i substituir a l'equació tèrmica (8). Si ho fem, tenim

$$T(S, V, N) = \exp\left[\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln\left(\frac{AV}{Nk_B}\right) - c \right)\right], \quad (12)$$

i, finalment,

$$U(S, V, N) = (c - 1)Nk_B \exp \left[\frac{1}{c - 1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} \right) - c \right) \right], \quad (13)$$

que també coincideix, llevat de la constant $c - 1$, amb l'equació fonamental en la representació de l'energia interna per un gas ideal. Partint d'aquesta equació fonamental, podríem tornar a derivar la mateixa equació calòrica (11) usant les derivades parcials de U (que hem vist al principi d'aquest apartat) respecte les seves variables naturals.

Apartat b)

Quina és la interpretació microscòpica de c ? Quant ha de valer c perquè el gas sigui un sistema termodinàmicament estable?

Estudiem primer per quins valors de c el gas és termodinàmicament estable. Recordem que, tal i com vam veure a teoria, el criteri d'estabilitat termodinàmic ve donat pel signe de les segones derivades respecte les variables naturals pels potencials termodinàmics. En particular, pels potencials termodinàmics F i H , aquestes condicions se simplifiquen molt:

- Estabilitat tèrmica $\Leftrightarrow F_{TT} < 0$ i $H_{SS} > 0$.
- Estabilitat mecànica $\Leftrightarrow F_{VV} > 0$ i $H_{PP} < 0$.
- Estabilitat material $\Leftrightarrow F_{NN} > 0$ i $H_{NN} > 0$.

Si tenim en compte les definicions dels coeficients termodinàmics

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(T, P, N)}{\partial P} \right)_{T, N}, \quad \kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(P, S, N)}{\partial P} \right)_{S, N}, \quad (14)$$

$$C_P = T \left(\frac{\partial S(T, P, N)}{\partial T} \right)_{P, N}, \quad C_V = T \left(\frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T} \right)_{V, N}, \quad (15)$$

podem acabar trobant que, un sistema serà termodinàmicament estable si, i només si, se satisfà que:

$$\boxed{C_P > C_V > 0, \quad \kappa_T > \kappa_S > 0} \quad (16)$$

Calculem, doncs, els coeficients termodinàmics C_P , C_V , κ_T i κ_P usant les equacions que hem trobat per $S(T, V, N)$ (10) i per $p(T, V, N)$ (8)

$$\begin{aligned} C_P &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(\frac{A}{P} \right) + c \ln(T) + c \right]_{P, N} = TNk_B c \frac{1}{T} = Nk_B c, \\ C_V &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V, N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(\frac{AVT^c}{Nk_B T} \right) + c \right]_{V, N} = TNk_B (c - 1) \frac{1}{T} = Nk_B (c - 1), \\ \kappa_T &= -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{T, N} = \frac{Nk_B T}{V} \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}, \\ \kappa_S &= -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{S, N} = -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B}{V} \exp \left(\frac{1}{c - 1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right) \right]_{S, N} = \frac{1}{V} \frac{Nk_B}{p^2} \alpha = \frac{\alpha}{p}, \end{aligned}$$

on, al penúltim pas, hem definit

$$\alpha \equiv \exp \left(\frac{1}{c - 1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right), \quad (17)$$

que és una constant respecte de P . De les anteriors equacions podem veure el següent:

- Els coeficients κ_S i κ_T són sempre positius, independentment del valor de c (ja que $P > 0$). No ens donen cap restricció associada als valors que pot prendre c .
- Els coeficients C_P i C_V només satisfan que $C_P > C_V > 0$ si

$$c > c - 1 > 0 \Rightarrow \boxed{c > 1}.$$

Aquesta és la condició que ha de satisfer c . Per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable és necessari que $c > 1$.

Pel que fa a la interpretació microscòpia de c , el teorema d'equipartició de l'energia **REFERENCIA** ens diu que, si considerem un gas ideal, s'ha de satisfer que **REESCRIURE AIXÒ MILLOR**

$$U = \frac{f}{2} N k_B T \quad (18)$$

on f són els graus de llibertat del sistema. Per exemple, per un gas ideal monoatòmic, tenim 3 graus de llibertat translacionals $\Rightarrow f = 3$,

$$U = \frac{3}{2} N k_B T, \quad (19)$$

per un gas ideal diatòmic (a temperatures no molt elevades), tenim 5 graus de llibertat (3 translacionals + 2 rotacionals),

$$U = \frac{5}{2} N k_B T, \quad (20)$$

i així successivament. Comparant (18) amb l'equació calòrica que hem trobat pel sistema **REFERENCIAR EQUACIÓ** podem veure que

$$c - 1 = \frac{f}{2} \Rightarrow \boxed{c = \frac{f}{2} + 1}, \quad (21)$$

és a dir, microscòpicament c està directament relacionada amb els graus de llibertat del gas que estiguem considerant.

Notem que això dóna sentit al fet que, per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable, c hagi de ser necessàriament major que 1; altrament podríem tenir 0 graus de llibertat pel nostre sistema, o fins i tot valors negatius, cosa que no tindria cap sentit físic.

Apartat c)

Una certa quantitat d'aquest gas es troba dins d'un recipient cilíndric de secció transversal A de parets adiabàtiques. El cilindre està obert per la part superior i en contacte amb l'atmosfera a pressió P_0 . Damunt del gas es col·loca un disc adiabàtic de massa menyspreable i un bloc de massa m (veure FIGURA). El disc i el bloc baixen fins a una altura h respecte del fons del cilindre. En aquesta situació el gas es troba en equilibri a temperatura T_0 .

1. Calculeu el nombre de mols de gas.
2. Ara traiem el bloc i el gas s'expandeix fins una altura h_f . Calculeu h_f i la temperatura final del gas.
3. Calculeu el canvi d'entropia del gas en treure el bloc.