

Mètodes Numèrics II

## Pràctica de simulació:

# Modelització del comportament d'una placa fotovoltaica

G01

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1666739: Franco Avilés, Eric

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Gener 2025



# Índex

1	Introducció i Objectius.....	1
2	Plantejament del problema del Sistema Solar.....	1
2.1	Modelització del Sistema Solar.....	1
2.2	Normalització de les equacions.....	2
2.3	Condicions inicials.....	2
2.4	Mètode numèric i avaluació de l'error.....	2
3	Plantejament del problema de la placa solar.....	2
3.1	Modelització del moviment del Sol sobre Mont-rós.....	2
3.2	Modelització de l'electricitat generada per la placa solar.....	3
3.3	Avaluació de l'error.....	3
4	Resultats i discussió.....	4
4.1	Sistema Solar.....	4
4.2	Moviment del Sol sobre Mont-rós.....	6
4.3	Energia subministrada per la placa solar.....	6
5	Conclusions.....	6
A	Repositori de <i>GitHub</i> .....	8
B	Simulació del Sistema Solar amb més cossos.....	8
C	Posicions i velocitats inicials dels cossos del Sistema Solar.....	8

# 1 Introducció i Objectius

Amb el pretext de poder calcular l'energia subministrada per una instal·lació elèctrica d'autoconsum, constituida per plaques fotovoltaïques d'unes característiques determinades i situada en un habitatge unifamiliar de Mont-rós (poble de la província de Lleida, Catalunya), en aquesta pràctica ens plantejem modelitzar el moviment del Sol sobre aquesta localitat en el transcurs de tot un any.

Per aconseguir això últim, proposem fer una simulació del Sistema Solar usant el mètode d'Euler per a diverses discretitzacions temporals, tenint en compte un seguit d'aproximacions fonamentals, entre les quals en destaquem la consideració que tots els planetes es mouen sobre el pla de l'eclíptica i que el Sistema Solar simulat està conformat pels 6 primer cossos del cas real. En els annexos, però, amplièm aquest estudi considerant un cas més pròxim a la realitat i adjuntant, a més a més, un seguit d'animacions que ens permetran visualitzar millor la dinàmica del sistema caracteritzat.

## 2 Plantejament del problema del Sistema Solar

### 2.1 Modelització del Sistema Solar

Per tal de modelitzar el Sistema Solar, partirem de la Segona Llei de Newton i la igualarem a la Llei de la Gravitació Universal, tot dividint per la massa del cos  $p$ ,  $M_p$ . Fent això ens queda que l'acceleració a la qual està sotmesa aquest cos  $p$  és:

$$\frac{d^2 \mathbf{r}^{(p)}}{dt^2} = -G \left[ \sum_{l \neq p} M_l \frac{(\mathbf{r}^{(p)} - \mathbf{r}^{(l)})}{|\mathbf{r}^{(p)} - \mathbf{r}^{(l)}|^3} \right], \quad p = 1, 2, \dots \quad (1)$$

En aquesta equació el vector  $\mathbf{r}^{(p)}$  és el vector posició (marquem els vectors en negreta) del cos  $p$  respecte del Sol (de manera que el nostre origen de coordenades serà la posició inicial del Sol),  $M_l$  la massa dels cossos diferents a  $p$  i  $\mathbf{r}^{(l)}$  les seves posicions respecte l'origen de coordenades. Fixem-nos, doncs, que segons aquesta equació, la força que actua sobre un planeta donat es correspon amb la suma de les forces exercides per tots els cossos del sistema solar sobre ell.

Simplificarem l'expressió definint  $\mathbf{d}_{lp} \equiv (\mathbf{r}^{(p)} - \mathbf{r}^{(l)})$ . Així, la darrera equació queda com

$$\frac{d^2 \mathbf{r}^{(p)}}{dt^2} = -G \left[ \sum_{l \neq p} M_l \frac{\mathbf{d}_{lp}}{|\mathbf{d}_{lp}|^3} \right], \quad p = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Per tal de facilitar-ne la resolució, podem transformar aquesta equació diferencial de segon ordre a la següent de primer ordre:

$$\frac{d\mathbf{v}^{(p)}}{dt} = -G \left[ \sum_{l \neq p} M_l \frac{\mathbf{d}_{lp}}{|\mathbf{d}_{lp}|^3} \right], \quad p = 1, 2, \dots \quad (3)$$

De forma que tenim ara un conjunt de  $n \times p$  (on  $n$  són les dimensions) equacions diferencials de primer ordre a resoldre. A la pràctica, com que tots els cossos del sistema solar del nostre model tenen orbites coplanàries (a excepció de Plutó, que no el considerarem), podem assumir que estem davant d'un problema bidimensional, de manera que tindrem  $2 \times p$  EDOs de primer ordre a resoldre.

Considerarem un model en què els únics cossos del Sistema Solar són Mercuri, Venus, la Terra, Mart i Júpiter (i, naturalment, el Sol), per tal de simplificar les gràfiques i els resultats. A més a més, el moviment d'aquests cossos serà sobre un pla conjunt; no considerarem moviments en l'eix  $z$ . Es podrà trobar una versió més complexa (amb la modelització de tots els planetes i les corresponents gràfiques per diferents temps finals) al repositori de *GitHub* (veure annex A). A l'annex B donem un breu resum d'això últim en forma de material extra.

## 2.2 Normalització de les equacions

Per tal de resoldre el problema minimitzant errors i temps de càlcul cal normalitzar (3). Definim unes quantitats característiques del sistema: escollim  $M_0 = M_s$  (la massa del Sol) i  $d_0 = UA$  (unitat astronòmica), ja que així podrem treballar amb valors propers a la unitat. D'aquí se'n deriva que

$$t_0 = \sqrt{\frac{d_0^3}{M_s \cdot G}}$$

Usant tot això, podem arribar fàcilment a

$$\frac{d^2 \tilde{\mathbf{r}}^{(p)}}{d\tilde{t}^2} = - \sum_{l \neq p} \frac{\mathbf{d}_{lp}}{|\mathbf{d}_{lp}|^3}, \quad p = 1, 2, \dots \quad (4)$$

d'on tenim que

$$\frac{d\tilde{v}_i^{(p)}}{d\tilde{t}} = - \sum_{l \neq p} M_l \frac{d_{lp,i}}{|\mathbf{d}_{lp}|^3} \quad p = 1, 2, \dots, \quad i = 1, 2 \quad (5)$$

## 2.3 Condicions inicials

Per tal de conèixer les condicions inicials de cadascun dels cossos del sistema solar modelitzat (això és,  $\mathbf{r}^{(p)}$  i  $\mathbf{v}^{(p)}$ ) hem usat la base de dades del *Horizons Ephemeris Service* de la NASA (veure [3]). Agafem com a punt inicial les posicions i les velocitats el dia 01-01-2025 a les 00:00 UTC (+01:00) de tots els cossos rellevants del sistema solar. Podeu consultar aquestes posicions i velocitats inicials a l'annex C.

## 2.4 Mètode numèric i avaluació de l'error

El mètode numèric utilitzat ha estat el mètode d'Euler (per sistemes EDOs)<sup>1</sup> aplicat a l'equació (5) per diferents discretitzacions temporals:  $dt = 1$  any,  $dt = 1$  mes i  $dt = 1$  dia.

Per tal d'avaluar l'error comés estudiarem l'evolució d'una de les quantitats conservades d'aquest sistema: L'energia total  $\varepsilon$ . Idealment, a cada cas d'iteració el valor de  $E$  ha de ser el mateix que a  $t_0$ ; les fluctuacions en aquestes quantitats ens permetran determinar l'error numèric comès segons:

$$E_{\varepsilon_i} = \left( \frac{\Delta \varepsilon_i}{\varepsilon_0} \right) = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_0}{\varepsilon_0} \quad (6)$$

On el valor de  $\varepsilon$  es pot treure a partir de les equacions fonamentals de la dinàmica.

# 3 Plantejament del problema de la placa solar

## 3.1 Modelització del moviment del Sol sobre Mont-rós

Per modelitzar el moviment del Sol des d'un sistema de referència situat en una teulada a Mont-rós, partim d'unes coordenades esfèriques on un angle  $\theta$  indica l'alçada del sol i un angle  $\phi$  indica la posició horitzontal del sol utilitzant el centre de la placa solar com a origen de coordenades.

Així doncs, partint d'aquests angles, realitzem una discretització de cada angle en funció de les hores de llum solar que té cada dia de l'any<sup>2</sup>. En aquesta discretització tenim en compte els angles  $\phi$  que limiten la regió on rebem incidència de llum solar i els angles  $\theta$  màxims als quals arriba el sol depenent de l'estació de l'any, aquests últims delimitats en un interval determinat per la latitud de Mont-rós  $\pm 15^\circ$ , el màxim i mínim del qual corresponen, respectivament, al dia de l'equinocci d'estiu i al dia de l'equinocci d'hivern.

Per determinar la posició del sol segons l'angle prèviament discretitzat usarem:

$$x = r \cos(\phi) \quad (7)$$

$$y = r \sin(\theta) \sin(\phi) \quad (8)$$

(falta imagen de las coordenadas utilizadas)

<sup>1</sup>Les corresponents equacions es poden consultar als apunts de l'assignatura.

<sup>2</sup>Informació que hem extret de [5].

### 3.2 Modelització de l'electricitat generada per la placa solar

D'entrada suposem que la instal·lació elèctrica d'autoconsum usada per l'habitatge unifamiliar a Mont-rós consta d'un panell fotovoltaic de silici de superfície igual a  $2 \text{ m}^2$ , que genera el seu màxim d'energia elèctrica ( $400 \text{ W}$  de potència), quan  $1000 \text{ W/m}^2$  d'irradiació solar incideixen perpendicularment sobre ell.

A partir del model del moviment solar, plantegem els mateixos angles  $\theta$  i  $\phi$  però escollint com a origen de coordenades el centre de la placa solar; d'aquesta manera podrem definir la incidència lumínica que reben en cada discretització temporal com  $W = W_{max} \cos(\theta) \cos(\phi)$ , on  $W_{max} = 1000 \text{ W/m}^2$ . Amb aquesta expressió ja podem calcular l'electricitat generada en tot l'any tenint en compte la variació horària i del moviment solar en les diferents estacions.

A més a més, en el plantejament d'aquest model, tindrem en compte que hem inclinat la placa solar en un angle de  $42.5^\circ$  respecte del terra; això és degut a que es tracta de l'angle òptim per aconseguir el màxim d'incidència solar al llarg de l'any, ja que es correspon amb la latitud de Mont-rós, i això permet que la pèrdua d'eficiència al llarg de l'any (conforme  $\theta$  va variant) sigui mínima.

Tot seguit presentem el seguit de consideracions extres de caràcter geogràfic i/o metereològic que tindrem en compte en el nostre model. L'estudi climàtic s'ha efectuat amb dades històriques extretes de la web de *Nasa Power* (veure [6]):

- Mont-rós és una localitat amb un horitzó no pla, ja que està envoltat de muntanyes que limiten les hores de llum diàries. Per tal de tenir present aquest fenomen cal introduir una variació en els angles  $\phi$  inicials i finals. Eliminem els angles  $\phi < -77^\circ$  i  $\phi > 82^\circ$ , en tant que no contribueixen de manera significativa a la irradiació efectiva de les plaques solar. Aquests valors els hem extret estudiant l'alçada relativa al poble de les muntanyes properes a aquestes usant *Google Maps*.
- Les precipitacions lleus no només afecten negativament el rendiment de les plaques fotovoltaïques, sinó que també poden ser beneficioses, netejant, per exemple, la seva superfície. En aquest context, hem considerat que (en promig):
  - Les pluges lleus no afecten el rendiment de les plaques.
  - Les pluges moderades ( $4\text{-}10 \text{ mm/h}$ ) redueixen el rendiment en un 15%.
  - Les pluges intenses ( $> 10 \text{ mm/h}$ ) redueixen el rendiment en un 25%.
- Pel que fa a les nevades, segons les dades històriques al poble neva, fonamentalment, entre gener i mitjans de març. Tot i que la neu pot arribar a ser altament perjudicial sobre les plaques (bloquejant completament la llum solar), la inclinació de les plaques (de  $42.5^\circ$ ) redueix considerablement aquest risc, així que es negligirà. A tot això cal afegir que les nevades a la zona són puntuals i de baixa intensitat, fet que facilita el desglaç i que la neu acumulada als voltants de la placa podria crear un efecte reflectant, incrementant així la captació solar. En cas necessari es pot instal·lar un sistema antidesglaç o una cobertura hidrofòbica, tot i que aquestes opcions consumirien part de l'energia generada. Tenint en compte tots els factors comentats s'ha aplicat un factor de reducció del 20% al rendiment durant el període de neu, com a estimació conservadora.
- Les plaques fotovoltaïques comencen a perdre, en general, eficiència a temperatures superiors a  $T = 25^\circ\text{C}$ , reduint-se el rendiment en un 0.3% inicialment. A Mont-rós les temperatures són generalment baixes, amb un clima fred a causa de la seva altitud. El problema de la temperatura només es presentaria, doncs, a l'estiu, quan les temperatures poden superar, segons els registres històrics, els  $25^\circ\text{C}$  entre les 12:00 i les 15:00 hores, arribant a màximes de  $31^\circ\text{C}$ , però en períodes breus. Per tot això, hem considerat que els efectes associats a la temperatura són negligibles sobre el rendiment de la placa fotovoltaica.

(estaria guay poner una imagen del sistema desde la placa, si se puede)

### 3.3 Avaluació de l'error

Per tal d'evaluar com d'exacte és el nostre model, els resultats obtinguts es compararan amb els del PVGIS [7]. Calcularem l'error relatiu associat a l'energia subministrada per la placa fotovoltaica com:

$$E_{placa} = \frac{|\varepsilon_{model} - \varepsilon_{teo}|}{\varepsilon_{teo}} \cdot 100 \quad (9)$$

on  $\varepsilon_{model}$  i  $\varepsilon_{teo}$  són les energies associades al nostre model i als resultats obtinguts del PVGIS, respectivament.


## 4 Resultats i discussió

### 4.1 Sistema Solar


Després d'implementar el mètode numèric s'han trobat les òrbites (per a cada valor de  $dt$ ) fins a  $t = 1$  any (terrestre) que es poden veure a les figures 1a, 2a i 3a. Més tard, a la figura 4, podem veure les òrbites per a  $t = 100$  anys per la discretització  $dt = 1$  dia amb el corresponent error.

A l'annex A podeu trobar les gràfiques corresponents a tot el Sistema Solar (amb els cossos no descrits aquí) i un seguit d'animacions per tal de visualitzar més clarament l'evolució temporal de tots els cossos fins a un  $t_{final} = 15$  anys.

Els errors relatius en l'energia associats als diferents planetes es poden veure a les figures 1b, 2b i 3b.




**Figura 1:** Òrbites del sistema solar (esquerra) i errors relatius associats a aquestes (dreta) per  $dt = 1$  dia fins a  $t_{final} = 1$  any.



**Figura 2:** Òrbites del sistema solar (esquerra) i errors relatius associats a aquestes (dreta) per  $dt = 1$  hora fins a  $t_{final} = 1$  any.

Tal i com podem veure a la figura 3b, la discretització amb un major error numèric és la corresponent a  $dt = 1$  mes, degut a que els grans salts en el temps fan que els errors associats al mètode d'Euler es disparin. En concret, podem veure com l'error associat a l'energia de Venus s'arriba a disparar fins a més d'un 80%. La Terra i Mercuri tenen també errors relatius grans, sobretot al principi, essent aquests propers al 20% (valor absolut).

De fet, si ens fixem en la figura 3a, podem veure que Mercuri surt disparat del Sistema Solar. Que això no




**Figura 3:** Òrbites del sistema solar (esquerra) i errors associats a aquestes (dreta) per  $dt = 1$  mes fins a  $t_{final} = 1$  any.

es vegi reflectit, aparentment, en l'error associat a l'energia de Mercuri (que es manté pràcticament constant en una desviació del 20%) pot ser degut a què les variacions en els termes en l'energia cinètica i l'energia potencial d'aquest cos es compensen conforme l'astre s'allunya de la seva posició inicial.

Tant a la discretització de  $dt = 1$  dia com a la de  $dt = 1$  hora (figures 1 i 2, respectivament) tenim errors associats als planetes més exteriors del sistema modelitzat similars, essent aquests lleugerament menors en el cas de la discretització per hores, a costa d'un temps de càlcul major. La principal diferència rau, però, en l'error associat a Mercuri: per a la discretització en dies presenta un error relatiu molt major al de la resta de cossos (exceptuant el Sol), assolint pics de fins a un 2.5%; per a la discretització en hores aquest efecte es disminueix significativament.

El cas del Sol és diferent; per a les tres discretitzacions presenta una evolució de l'error associat a l'energia molt similar. En tots els casos calculats té una clara tendència a desviar-se negativament. Podem explicar això si pensem en què el Sol és, dels 6 cossos modelitzats, el que ha de tenir posicions i velocitats menors, de forma que l'acumulació d'errors associats al mètode numèric pot fer que aquestes petites quantitats es vegin afectades de forma significativa.

Si fem un estudi de l'evolució del Sistema Solar fins a un  $t_{final}$  major, usant  $dt = 1$  dia, els resultats que s'obtenen són els que es poden veure a la figura 4.



**Figura 4:** Estudi de l'evolució del Sistema Solar a  $t_{final}$  major.

Ara es posa de manifest el caràcter oscil·latori de l'error relatiu per tots els cossos del Sistema Solar. Podem veure com l'error màxim obtingut és proper al 6.5% (valor absolut) en el cas del Sol, pels motius ja comentats


abans<sup>3</sup>. La resta de planetes, exceptuant el cas de Mercuri, no arriben en cap cas a errors superiors al 1%.

## 4.2 Moviment del Sol sobre Mont-rós


(això s'ha de fer, gràfiques i tal)

## 4.3 Energia subministrada per la placa solar

A les figures 5 i 6 es poden observar els histogrames corresponents a l'energia elèctrica generada cada mes al llarg d'un any de la nostra placa i la obtinguda a segons el model del PVGIS.



**Figura 5:** Histograma de l'energia generada durant un any extreta de PVGIS



**Figura 6:** Histograma de l'energia generada durant un any del nostre model

(algun comentari per aquí)

## 5 Conclusions

La motivació principal d'aquesta pràctica era el càlcul de l'energia generada per una placa solar de superfície igual a  $2 \text{ m}^2$  situada a Mont-rós. Per arribar a trobar aquests resultats s'ha efectuat prèviament una simulació quasi completa del Sistema Solar sota les condicions esmentades, amb el pretext de calcular quines eren les distàncies Terra-Sol en tot moment. D'això últim podem concloure que, a la vista dels resultats, tot i les limitacions ja explicades del mètode d'Euler, les òrbites resultants obtingudes són força bones, en especial si considerem la discretització  $dt = 1$  dia que, tot i presentar un error bastant major en el cas de Mercuri, no afecta de forma apreciable als resultats en les òrbites de la Terra, que són, al final del dia, les que ens interessen per fer la modelització de la placa solar. A tot això cal sumar-li el fet que la discretització per dies té un temps de càlcul associat molt menor si el comparem amb el de la discretització de  $dt = 1$  hora, cosa que justifica encara més la nostra elecció.

(conclusions moviment sol sobre terra + placa solar)

(conclusions globals)

<sup>3</sup>Per motius de qualitat, la gràfica associada a l'error per  $t_{final} = 100$  anys arriba només fins al 25 anys. Podeu trobar més informació a l'enllaç de l'annex A.



## Referències

- [1] Escartín, J.M. i Navau, C. *Mètodes Numèrics II*. Apunts de l'Assignatura (veure CV).
- [2] Aguilar, L. *Modelizando el Sistema Solar*. Consultat el: 11/12/2024. [https://www.astrosen.unam.mx/~aguilar/MySite/Teaching\\_files/BasicEqns-1.pdf](https://www.astrosen.unam.mx/~aguilar/MySite/Teaching_files/BasicEqns-1.pdf).
- [3] *Horizon Ephemeris*, NASA. Web de consulta de les posicions de tots els astres del sistema solar. Consultat el: 23/12/2024. <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/>.
- [4] Universidad de Granada. *El Sistema Solar y las Galaxias. Una Introducción a la Dinámica Molecular*. Consultat el: 11/12/2024. <https://ergodic.ugr.es/cphys/LECCIONES/ssolar/planetas-SLIDES.pdf>.
- [5] *MeteoGram*. Web per a consultar els horaris de les sortides i postes del Sol a tot el planeta. Consultat el: 05/01/2025. <https://meteogram.es/sol/espana/vielha/>.
- [6] *NASA Power*, NASA. Web per consultar la meteorologia de qualsevol lloc del món. Consultat el 07/01/2025. <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>.
- [7] *Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)*. Web oficial de la Comissió Europea per a consultar informació sobre la radiació solar i sobre el rendiment i l'energia generada per plaques fotovoltaiques a qualsevol lloc del planeta (a excepció del Pol Nord i el Pol Sud). Consultat el 08/01/2025. [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_en).


# Annexos

## A Repositori de *GitHub*

Podeu trobar els codis usats en *Fortran*, les representacions de les gràfiques usant *Gnuplot*, animacions de les simulacions del sistema solar i més al següent repositori (públic) de *GitHub*: [https://github.com/elitus7/PSimulacio\\_MN2](https://github.com/elitus7/PSimulacio_MN2).

## B Simulació del Sistema Solar amb més cossos

A mode d'extra, afegim en aquest annex els resultats de la simulació del Sistema Solar considerant també Saturn, Urà i Neptú (més enllà dels cossos del model del text principal) mantenint, però, la condició que el moviment es dona en un únic pla. A la figura 7 podeu veure les òrbites obtingudes usant una discretització de  $dt = 1$  dia, que com hem vist és la millor pel que fa a temps de càlcul i exactitud, i un  $t_{final} = 150$  anys.



**Figura 7:** Òrbites obtingudes amb el mètode d'Euler per a una simulació amb  $dt = 1$  any fins a  $t_{final} = 150$  anys per tots els cossos importants del Sistema Solar.

Al repositori de *GitHub* podreu veure una animació, a  $t_{final} = 15$  anys, en la que es poden veure les òrbites anteriors.

## C Posicions i velocitats inicials dels cossos del Sistema Solar

A continuació adjuntem les posicions i les velocitats dels diferents planetes del sistema solar (en les unitats indicades), prenent com a origen de coordenades el Sol, el dia 01/01/2025 a les 00:00 (UTC  $\pm$  00:00). Les dades han estat extretes del servei *Horizon Ephemeris* de la NASA (veure [3]).

**Taula 1:** Posicions i velocitats dels diferents planetes del Sistema Solar el dia 01/01/2025 a les 00:00 (UTC  $\pm$  00:00) segons l'*Horizon Ephemeris* de la NASA. Es pren com a origen de coordenades la posició inicial del Sol.

Planeta	$x$ (AU)	$y$ (AU)	$v_x$ (AU/día)	$v_y$ (AU/día)
Mercuri	-0.3873030085256687	-0.1617241946342014	0.005024430196457658	-0.02474345331076241
Venus	0.4534187654737982	0.5622160792960551	-0.01580627428004959	0.01261006264179427
Terra	-0.1786834409731047	0.9669827953774551	-0.01720473858166942	-0.003193533189307208
Mart	-0.5216858665681380	1.525234576802456	-0.01271183490340182	-0.003338839586392289
Júpiter	1.056033545576702	4.971452162023883	-0.007476272400979211	0.001924466075080766
Saturn	9.461067271500818	-1.764614720843175	0.0007093807804551229	0.005475097536527790
Urà	11.10363513617210	16.09448694134911	-0.003273722830755306	0.002053528375126505
Neptú	29.87992735576156	-0.6341879950443392	0.00003941595250081164	0.003160389775728832

Podeu trobar un manual d'instruccions sobre com usar el servei *Horizon Ephemeris* a la mateixa web de l'enllaç [3].