CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Alem (Al)

Descripción

Es un argiudol con poco desarrollo, profundo, con aptitud agrícola, situado en un relieve normal, en posición de loma, en la Subregión Pampa Arenosa, bien drenado, se ha desarrollado a partir de un sedimento de textura franco arenosa, no alcalino, no salino, con pendientes que no superan el 0-1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica (Soil Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud S 34° 30' 57'' y Longitud W 61° 29' 08''. Altitud 86 m.s.n.m. a 8 km. al oeste de la localidad y partido de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires.

Variabilidad de las características: Por su escasa difusión, no se reconocieron.

Fases: Por drenaje.

Series similares: O'Higgins

Suelos asociados: Junín, Teodelina, Bragado, La Albina, Ortiz de Rosas, Lincoln.

Distribución geográfica: Este del partido Leandro N. Alem y Norte del partido de Licoln, provincia de Buenos aires. Hoja I.G.M. 3560-7.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente rápida.

Uso y vegetación: Pastura implantada.

Capacidad de uso: II s


Limitaciones de uso: Baja retención de humedad, susceptibilidad a la erosión hídrica.

Índice de productividad según la región climática: 81,2 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte argílico (relación arcilla B/A 1,4).

Descripción del perfil típico:

16/971 C
Fecha de muestreo: 15 de Noviembre de 1979
Reconocedores: Jacyszyn - Díaz - Alio



A 0-29 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris oscuro (10 YR4/1) en seco; franco arenoso; bloques angulares medios, moderada y granular; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.

BAt 29-47 cm; pardo oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arenoso; bloques angulares medios moderados; firme; plástico y ligeramente adhesivo; barnices comunes; raíces comunes; galerías de lombrices; límite inferior claro, suave.

Bt 47-80 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; prismas finos débiles; firme; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; barnices comunes; raíces escasas; limite inferior claro y suave.

BCt 80-112 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares moderados a débiles; ligeramente duro; ligeramente plástico y no adhesivo; escasos barnices; escasas raíces; galerías de insectos, límite inferior claro y suave.

C 112-140 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; masiva; muy friable; no adhesivo.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	BAt	Bt	BCt	C
Profundidad (cm)	5-25	35-45	50-75	85-105	111-140
Mat. orgánica (%)	3,24	1,10	0,67	0,46	0,18
Carbono total (%)	1,88	0,64	0,39	0,27	0,11
Nitrógeno (%)	0,177	0,069	0,042	-	-
Relación C/N	10,6	9,3	9,3	-	-
Arcilla <2 µ (%)	12,7	19,0	19,6	14,9	12,0
Limo 2-20 µ (%)	19,6	10,3	9,3	9,9	8,3
Limo 2-50 µ (%)	33,8	25,2	23,2	24,7	25,6
AMF 50-75 µ (%)	17,4	22,6	17,2	23,1	20,2
AMF 75-100 µ (%)	23,5	21,7	25,0	26,1	29,8
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	12,6	11,0	14,4	8,7	12,0
AM 250-500 µ (%)	-	0,5	0,6	0,5	0,4
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	-
Eq.humedad (%)	18,4	18,2	18,0	17,6	12,6
Re. pasta Ohms	2280	7114	13680	8026	18240
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	6,1	6,1	6,5	6,6
pH H2O 1:2,5	6,1	6,5	6,5	7,0	7,3
pH KCL 1:2,5	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	8,5	8,2	7,7	6,6	6,0
Mg++ m.eq./100gr	3,2	3,0	3,2	4,1	3,5
Na+ m.eq./100gr	0,3	0,2	0,3	0,6	0,3
K+ m.eq./100gr	2,3	1,8	1,4	1,0	1,5
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-
% agua de saturación	57	47	44	43	41
Na (% de T)	1,7	1,2	1,9	4,0	2,3
V.S m.eq./100gr	14,3	13,2	12,6	12,3	11,3
H de Cambio	6,8	4,9	4,3	3,3	2,8
CIC m.eq./100gr	17,1	16,3	15,7	14,9	13,1
Sat. con bases (%)	83	81	80	82	86