CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Alta Vista (AVi)

Descripción

Es un suelo pardo oscuro, que se caracteriza por su escasa profundidad, se apoya sobre una costra calcárea (tosca) de extensión regional, es apto para la agricultura, y se encuentra en una planicie alta de la "Subregión Sierras y Pedemonte de Ventania", en posición de loma, con pendiente de 0 a 1 %, bien drenado, formado sobre sedimentos loéssicos pampeanos, no salino y sin alcalinidad.

Clasificación taxonómica: Haplustol petrocálcico, franca fina, mixta, somera, térmica (AD-INTA-ST.2010).
Haplustol lítico, franca fina, mixta, térmica (USDA - 7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 37º 38' 28.02". Longitud W 62º 52' 49.35". Altitud 233 msnm a 13.5 km al SSW de la localidad de Puán, partido de Puan, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3763-28-3, Puán.

Variabilidad de las características: EEl horizonte petrocálcico 2Ckkm, varía entre 80 a 100 cm. de profundidad en los paisajes suavemente ondulados con tosca, ondulaciones bien marcadas con pendientes cortas y con tosca aflorante en superficie y en las planicies suavemente onduladas.

Fases: Por profundidad, pendiente (1-3 %).

Series similares: Chasicó.

Suelos asociados: Formando complejos y asociaciones de series con Puan, Ea. Los Manantiales, Erize, Laguna Puan, Carhué y en forma de consociación con la serie Epecuén y Alta Vista.

Distribución geográfica: Partidos de Carlos Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Adolfo Alsina, Guaminí, Puan, Saavedra, Tornquist; en las hojas 3763-3, 9, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 34, 35; 3963-6.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento lento a medio, permeabilidad moderada.

Uso y vegetación: Agrícola. Cultivo de Avena (Avena sativa)

Capacidad de uso: IV sc


Limitaciones de uso: Poca profundidad útil del suelo (tosca a 35 cm.). Leves limitaciones climáticas (régimen ústico, deficiencia hídrica).

Índice de productividad según la región climática: 31,5 (E), 22,5 (F)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (Ap), régimen de humedad ústico, horizonte petrocálcico, (2Ckkm) horizonte cámbico (Bw), rel. % arc. <1.1, no textural.

Descripción del perfil típico:

23/1323 C
Fecha de muestreo: 3 de Diciembre de 1989
Reconocedores: Maldonado - Carboni



Ap 0-20 cm; pardo muy oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo arenoso; bloques subangulares medios, débiles; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro y suave.

Bw 20-35 cm; pardo oscuro (75YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso arenoso; bloques subangulares medios moderados que rompe a bloques menores; moderadamente duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices de "clay skins" escasos; raíces comunes; límite inferior claro y suave.

2Ckkm 35 cm a + ; tosca en plancha.

Observaciones: No se muestreó el horizonte 2Ckkm, por su extrema dureza.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Bw
Profundidad (cm)	0-20	20-35
Mat. orgánica (%)	2,10	2,00
Carbono total (%)	1,20	1,10
Nitrógeno (%)	0,148	0,126
Relación C/N	8,1	8,7
Arcilla <2 µ (%)	24,7	26,0
Limo 2-20 µ (%)	9,7	12,7
Limo 2-50 µ (%)	25,1	24,4
AMF 50-75 µ (%)	12,9	10,5
AMF 75-100 µ (%)	6,6	8,7
AMF 50-100 µ (%)	0	0
AF 100-250 µ (%)	22,5	22,1
AM 250-500 µ (%)	7,8	7,7
AG 500-1000 µ (%)	0,4	0,6
AMG 1-2 mm (%)	0	0
Calcáreo (%)	0	0
Eq.humedad (%)	18,1	19,0
Re. pasta Ohms	-	-
Cond. mmhos/cm	0,7	0,3
pH en pasta	6,3	6,6
pH H2O 1:2,5	6,8	7,2
pH KCL 1:2,5	5,8	6,0
Cationes de cambio		
Ca++ m.eq./100gr	11,3	13,5
Mg++ m.eq./100gr	4,5	5,5
Na+ m.eq./100gr	0,2	0,2
K+ m.eq./100gr	1,0	0,9
H+ m.eq./100gr	4,5	4,4
Na (% de T)	1,0	0,9
Suma de Bases	17,0	20,1
CIC m.eq./100gr	18,5	21,2
Sat. con bases (%)	92	95