CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Carhué (Cah)

Descripción

Es un suelo muy pesado, muy oscuro con alto contenido de arcillas expandibles, de aptitud ganadera, se encuentra en una planicie suavemente ondulada de la "Subregión Sierras y Pedemonte de La Ventania", en posición de bajo cóncavo, pobremente drenado, escurrimiento muy lento, desarrollado en sedimentos loéssicos muy finos, no alcalino, no salino, en pendientes de 0,0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Endoacuert típico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V. 2014). Argiacuol vértico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V. 1990).

Ubicación del perfil: Latitud S: 37° 11' 18.18''. Longitud W: 62º 58' 54.06''. Altitud: 135 m.s.n.m.; a 4 km al WSW de la Estancia Sanquilcó, partido de Adolfo Alsina, partido Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3763-22-3, Adolfo Alsina.

Variabilidad de las características: Alto contenido de arcillas en los horizontes Bt1 y Bt2, concentraciones de hierro manganeso, consistencia variada; duro a extremadamente duro en seco y muy plástico y muy adhesivo en húmedo.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Dolores, a nivel de familia fina.

Suelos asociados: Formando complejos y asociaciones de series con Alta Vista y Puán.

Distribución geográfica: Partido de Adolfo Alsina. Fotomosaico: 3763-22-3, Adolfo Alsina.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta, capa freática profunda.

Uso y vegetación: Ganadero. Pastura natural.

Capacidad de uso: V w


Limitaciones de uso: Drenaje. En períodos de lluvia riesgo de anegabilidad.

Índice de productividad según la región climática: 26,8 (A).

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, con fuertes rasgos de hidromorfismo, alto contenido de arcillas con 40 a 55 %, alta Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), alta Saturación de Bases (no se visualizaron grietas, pero se considera que el alto contenido de arcilla califican para clasificarlo como Endoacuert.

Descripción del perfil típico:

23/1297 C
Fecha de muestreo: 15 de Diciembre de 1990



Apn 0-23 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; arcillo limoso; bloques subangulares medios, moderados a fuertes; duro; firme; plástico, adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

Bt1n 23-44 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares medios, fuertes; muy duro; firme; muy plástico, muy adhesivo; escasas concreciones de hierro manganeso; barnices de "clayskins" muy abundantes; moteados abundantes, medios, precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

Bt2n 44-65 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares medios, finos, fuertes; muy duro; muy firme; muy plástico, muy adhesivo; barnices de "clayskins" abundantes; moteados escasos, finos, débiles; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

BCn 65-80 cm a +; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices de clayskins abundantes. No se muestreó.

Observaciones: El horizonte BCn no fue muestreado.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Apn	Bt1n	Bt2n
Profundidad (cm)	0-23	23-44	44-65
Mat. orgánica (%)	3,40	1,22	1,08
Carbono total (%)	1,90	0,71	0,62
Nitrógeno (%)	0,167	0,082	0,074
Relación C/N	11,4	8,6	8,4
Fósforo (PPM)	5,5	37,4	26,2
Arcilla <2 µ (%)	40,5	54,6	55,3
Limo 2-20 µ (%)	40,8	25,7	28,4
Limo 2-50 µ (%)	52,2	37,0	36,9
AMF 50-75 µ (%)	3,2	2,4	3,8
AMF 75-100 µ (%)	1,9	2,9	1,9
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	1,9	2,7	1,8
AM 250-500 µ (%)	0,3	0,4	0,3
AG 500-1000 µ (%)	-	0,1	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-
Eq.humedad (%)	38,0	50,2	45,3
Re. pasta Ohms	-	-	-
Cond. mmhos/cm	0,14	0,19	0,19
pH en pasta	5,7	6,6	7,0
pH H2O 1:2,5	5,7	7,0	7,3
pH KCL 1:2,5	5,0	5,6	5,9
Cationes de cambio			
Ca++ m.eq./100gr	16,4	20,5	19,8
Mg++ m.eq./100gr	5,8	7,0	9,1
Na+ m.eq./100gr	1,4	2,0	2,3
K+ m.eq./100gr	3,1	3,9	4,0
H+ m.eq./100gr	11,7	7,8	6,6
Na (% de T)	5,2	6,0	6,7
Suma de Bases	26,7	33,4	35,2
CIC m.eq./100gr	31,0	34,5	34,4
Sat. con bases (%)	86	97	100