CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Estela (Es)

Descripción

Estela es un perfil seleccionado para representar a un amplio grupo de suelos que ocupan sectores planos. El perfil representativo es un suelo moderadamente profundo, de buen desarrollo y de permeabilidad moderada.

Este perfil presenta un horizonte superficial A de 23 cm de espesor, franco a franco arcilloso y con buena provisión de materia orgánica. El horizonte Btk, que aparece a continuación, tiene una potencia de 17 cm y textura franco arcillosa. Desde los 40 hasta los 70 cm de profundidad se describe un horizonte transicional denominado BCk, que presenta fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa y abundantes concreciones. Inmediatamente por debajo del BCk, el perfil se interrumpe por la presencia de un horizonte petrocálcico (2Ckm).

Clasificación taxonómica: Paleustol petrocálcico, fina, moderadamente profunda, mixta, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 38º 5' 56.2". Longitud: W 62º 52' 1.4", se localiza a 4 km al ENE de la localidad de Estela.

Fases: Moderadamente somera.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado; escurrimiento lento a medio; permeabilidad moderada.


Uso y vegetación: Trigo.

Capacidad de uso: IV sc

Índice de productividad según la región climática: 31.5 (F).

Descripción del perfil típico:

Cal. 109
Fecha de muestreo: 1 de Septiembre de 1988
Reconocedores: Rubén Arteaga y Alberto Luters



A 0-23 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios; firme en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moderadamente alcalino; raíces abundantes; límite claro, suave.

Btk 23-40 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; estructura en bloques subangulares gruesos moderados que rompen a bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico, adhesivo; moderadamente alcalino; débil reacción de los carbonatos libres en la masa; barnices de arcilla abundantes; raíces comunes; límite claro, suave.

BCk 40-70 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en húmedo; franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moderadamente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; abundantes concreciones calcáreas; raíces escasas; límite abrupto.

2Ckm 70 a + cm; horizonte petrocálcico.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	Btk	BCk	
Nº de laboratorio	35235	35236	35237	
Profundidad (cm)	0-23	23-40	40-60	
Factor de Humedad	1.04	1.05	1.05	
Mat. orgánica (%)	2.60	1.70	0.96	
Carbono Orgánico (%)	1.50	1.00	0.56	
Nitrógeno (%)	0.171	0.117	0.083	
Relación C/N	9	9	7	
Fósforo asimilable (ppm)	9.8	-	-	
Arcilla <2 µ (%)	25.7	31.7	28.1	
Limo 2-20 µ (%)	15.6	14.7	12.7	
Limo 2-50 µ (%)	34.1	31.3	27.1	
AMF 50-74 µ (%)	17.3	16.8	7.9	
AMF 74-100 µ (%)	9.2	8.3	7.7	
AMF 50-100 µ (%)	26.5	25.1	15.6	
AF 100-250 µ (%)	11.9	11.2	10.1	
AM 250-500 µ (%)	0.3	0.2	0.3	
AG 500-1000 µ (%)	0.8	0.5	0.4	
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-
Calcáreo (%)	0.7	vest.	18.4	
Eq.humedad (%)	22.7	25.1	24.6	
C.E. (mS/cm)	0.4	0.4	0.4	
pH en pasta	7.6	7.6	8.1	
pH H2O 1:2,5	8.0	8.1	8.4	
pH KCL 1:2,5	7.1	7.0	7.4	
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	-	-	-	
Mg++ m.eq./100gr	-	-	-	
Na+ m.eq./100gr	0.4	0.3	0.5	
K+ m.eq./100gr	2.2	2.6	1.9	
H+ m.eq./100gr	-	-	-	
PSI (%)	2	1	2	
Agua de Saturación (%)	47	49	55	
Suma de bases [cmol (+)/kg] (S)	-	-	-	
CIC [cmol (+)/kg] (T)	25.6	31.9	28.5	
Saturación de bases % (S/T)	-	-	-	
Saturación % (S+H)	-	-	-	