CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Faro Querandí (FQ)

Descripción

Es un suelo somero, desarrollado a partir de sedimentos marinos, que se encuentra en un paisaje de albufera platense de Mar Chiquita, en un relieve cóncavo con pendientes de 0 a 0,5 %, en posición de bajo encharcable entre dunas. Es un suelo pobremente drenado, con peligro de anegamientos frecuentes a regulares, de permeabilidad lenta y escurrimiento muy lento. La napa se encuentra a 100 cm de profundidad. Es fuertemente alcalino sódico y posee moderada a fuerte salinidad. La vegetación es cirsium vulgare (cardo negro), centheus echinatus (roseta), distichlis sp. (pelo de chancho). Las limitantes para el uso se relacionan con el drenaje, la alcalinidad, la salinidad y el hidromorfismo.

Clasificación taxonómica: Hapludol tipico, limosa gruesa, mixta, termica.

Ubicación del perfil: Latitud S 37º 26' 11.73". Longitud W 57º 12' 29.43". Altitud 2 msnm, a 2.85 km al ESE del cruce entre Ruta Provincial 11 y Arroyo Las Gallinas, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3757-27-2.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Cirsium vulgare (cardo negro), Centheus echinatus (roseta), Distichlis sp. (pelo de chancho).


Capacidad de uso: VI es

Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad, salinidad, hidromorfismo.

Índice de productividad según la región climática:
10 (B), 10 (C)

Descripción del perfil típico:

8/1771 C
Fecha de muestreo: 27 de Marzo de 1972
Reconocedores: Viale - Sánchez - Fernández Coria



A 0-21 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcillosa; bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; raíces comunes.

Bt 21-35 cm; pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3.5/2) en húmedo; franco; prismas compuestos irregulares, medios, débiles; ligeramente firme en húmedo; barnices clayskins y clayshúmicos, comunes; moteados de hierro escasos, finos, débiles; raíces escasas; reacción de los carbonatos libres en la masa, común.

BC 35-45 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en húmedo; franco arenosa; firme en húmedo; barnices clayshúmicos escasos; abundante reacción de los carbonatos libres en la masa.

2C 45 a + cm; franco limoso; friable en húmedo; abundante reacción de los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	Bt	BC	2C
Profundidad (cm)	2-20	25-30	36-42	47-52
Materia Orgánica (%)	8.22	-	-	-
Carbono Orgánico (%)	4.77	0.78	0.36	0.27
Nitrógeno (%)	0.548	0.101	0.060	0.044
Relación C/N	9	8	6	6
Fósforo (ppm)	6.7	3.6	3.6	4.7
Arcilla <2 µ (%)	34.2	27.2	13.0	13.0
Limo 2-20 µ (%)	23.5	11.5	0.8	13.1
Limo 2-50 µ (%)	41.6	30.8	27.0	30.8
AMF 50-75 µ (%)	12.7	16.0	29.2	20.7
AMF 75-100 µ (%)	6.4	10.3	6.4	13.5
AMF 50-100 µ (%)	20.1	16.3	35.6	34.2
AF 100-250 µ (%)	5.1	8.2	9.2	11.8
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	7.5	15.2	10.2
Equivalente de Humedad (%)	41.1	31.1	25.2	27.0
Re. pasta. (Ohms/cm)	1173	291	235	226
Conductividad eléctrica (mS/cm)	1.8	11.5	13.3	9.1
pH en pasta de saturación	6.7	7.8	7.7	7.8
pH H2O (1:2.5)	7.0	8.5	8.4	8.4
pH KCL (1:2.5)	6.1	7.4	7.5	7.5
Cationes de Cambio				
Ca++ m.eq./100gr	19.5	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	10.1	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	2.5	7.3	13.4	13.9
K+ m.eq./100gr	2.4	2.3	1.8	2.0
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
PSI (%)	6	29	48	77
Agua de Saturación (%)	-	-	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	-	-	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	-	-	-	-
Saturación de bases (%) (S/T)	-	-	-	-
% de Saturación (S+H)	-	-	-	-