CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Fortín Tiburcio (FT)

Descripción

Es un suelo profundo, con aptitud agrícola, situado en las cercanías de los cauces y lagunas del partido de Junín, en posición de lomas, en la Subregión Pampa Ondulada alta, moderadamente bien drenado, desarrollado a partir de un sedimento relativamente liviano con texturas francas, levemente ácido en superficie y ligeramente alcalino en profundidad, no salino, con pendientes de 1 a 3 %.

Clasificación taxonómica: Hapludol típico, limosa fina, mixta, térmica (USDA- S. Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud S 34° 22' 43'' y Longitud W 60° 56' 20''. Altitud 72 m.s.n.m. a 14,3 km. al oeste sudoeste de la estación Rafael Obligado, partido de Rojas, provincia de Buenos Aires. Hoja IGN 3560-8-1 Rafael Obligado.

Variabilidad de las características: El A puede tener de 18 a 22 % de arcilla . El horizonte Bw puede tener entre 22 a 25 % de arcilla. Algunos perfiles no tienen sodio hasta los 150 cm. de profundidad.

Fases: Por pendiente y erosión.

Series similares: Delgado, Santa Isabel.

Suelos asociados: Las Nutrias.

Distribución geográfica: Norte del partido de Junín y Sudeste de General Arenales. Hojas I.G.M. 3560-1; 3560-7 y 1; 3560-8.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada a rápida, sin peligro de anegamiento.

Uso y vegetación: Pradera natural (Cynara cardunculus, Bromus uniloides), manzanilla silvestre.

Capacidad de uso: II e


Limitaciones de uso: Peligro de erosión hídrica.

Índice de productividad según la región climática: 81.23 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte Cámbico (relación arcilla del B/A 0,96).

Descripción del perfil típico:

12/788 C
Fecha de muestreo: 17 de Noviembre de 1966
Reconocedores: Jacyszyn - Giagnoni - Scoppa - Galazzi - Peter Meyer



Ap1 0-13 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco; bloques subangulares medios que rompe en granular fino; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

Ap2 13-29 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe en granular; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

Bw 29-58 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados y fuertes que rompe en bloques angulares finos; friable; plástico; adhesivo; escasos barnices húmicos arcillosos; límite inferior claro, suave.

BC 58-120 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo, franco; bloques angulares medios moderados a fuertes; ligeramente duro; friable; plástico; adhesivo; escasos barnices húmicos arcillosos, límite inferior gradual, suave.

Cc 120 a + 150 cm; pardo amarillento a pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; suelto; no plástico; no adhesivo; escasas concreciones finas de hierro-manganeso; moteados de hierro abundantes medios y precisos; escasos carbonatos en microconcreciones.

Observaciones: Importante actividad biológica (Lombriz=Annelida oligochaeta), en el Ap1 y Ap2.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap1	Ap2	Bw	BC	Cc
Profundidad (cm)	0-13	13-29	29-58	58-120	120-140
Mat. orgánica (%)	4,17	3,05	0,83	0,3	0,2
Carbono total (%)	2,42	1,77	0,48	0,21	0,09
Nitrógeno (%)	0,263	0,187	0,068	0,029	-
Relación C/N	9	9	7	7	-
Arcilla <2 µ (%)	19,8	19,4	22,1	15,8	7,0
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	48,4	49,0	39,6	41,1	54,1
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	29,8	28,7	35,8	39,6	35,2
AF 100-250 µ (%)	2,0	2,9	2,5	3,5	3,7
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,0	vest.	vest.
Eq.humedad (%)	28,1	26,9	26,6	21,7	17,5
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,3	5,5	5,7	6,2	8,4
pH H2O 1:2,5	5,5	5,7	6,2	6,5	8,7
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	13,4	12,5	9,1	7,6	5,0
Mg++ m.eq./100gr	2,3	2,2	2,7	3,5	4,0
Na+ m.eq./100gr	0,1	0,1	0,2	0,2	1,3
K+ m.eq./100gr	2,1	1,7	1,7	1,4	2,5
H+ m.eq./100gr	6,8	6,5	4,7	2,7	1,8
Na (% de T)	0,4	0,5	1,3	1,5	10,0
Suma bases	17,9	16,5	13,7	12,7	12,8
CIC m.eq./100gr	20,1	18,5	15,5	13,5	12,7
Sat. con bases (%)	89	89	88	94	100