CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Juncal (Jn)

## Descripción

Es un suelo profundo, moderadamente bien drenado formado en sedimentos loéssicos de textura franco limosa. Se encuentra en lomas casi planas de la Región Pampa Ondulada. El gradiente es 0,5 a 1 %.

**Clasificación taxonómica:** Argiudol típico, limosa fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2006).

**Ubicación del perfil:** En Latitud: S 33º 41' 0" y Longitud O 61º 02'15". Altitud 87,5 msnm a 4 km al norte de Estación Juncal (FCGSM), departamento Constitución, provincia de Santa Fe; hoja IGM 3360-31-2, Wheelwright.

**Variabilidad de las características:** La característica más variable es la presencia de moteados en el perfil que comúnmente aparecen a partir de los 100 cm, con concreciones de hierro-manganeso. En algunos perfiles estos rasgos están ausentes a pesar de verse afectados por las napas de agua. El espesor del A varía entre 24 y 28 cm. El horizonte Bt es franco arcillo limoso con 35 a 40 % de arcilla y su espesor varía entre 45 y 62 cm. El horizonte C es franco limoso con 15 a 25 % de arcilla y 65 a 80 % de limos.

**Fases:** Se reconocieron en diversos grados por pendiente y anegamiento y están descriptas en las unidades cartográficas de la hoja.

**Series similares:** Series Arroyo Dulce, Arrecifes, Pergamino, Capilla del Señor, Mercedes. Excepto Capilla del Señor todas estas series tienen el solum entre 140 y 160 cm. y son suelos muy profundos.

**Distribución geográfica:** Se encuentra en el paisaje de lomas extendidas casi planas en las cercanías de los bañados y canales Alcorta, arroyos Juncal y del Medio en la Región Pampa Ondulada. Se han desarrollado sobre sedimentos loéssicos franco limosos, en un relieve normal, se distribuye en las hojas 3360-25; 3360-31 y 3360-32.

**Drenaje y permeabilidad:** Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad: moderada. El nivel freático llega en épocas lluviosas a menos de 2 metros de la superficie.

**Uso y vegetación:** Agrícola. Campo arado.

**Capacidad de uso:** II w


**Limitaciones de uso:** Drenaje.

**Índice de productividad según la región climática:** 90 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Régimen de humedad Udico; Epipedón mólico incluye los horizontes A y BAt y Horizonte argílico entre los 26 y 78 cm. de profundidad (BAt, Bt).

## Descripción del perfil típico:

**11/1034 C**
**Fecha de muestreo: 21 de Abril de 1967**
**Reconocedores: Laya - D'Agostino - Musto**




**Ap1** 0-14 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco limoso; granular fina débil; friable; raíces abundantes; límite abrupto, suave.

**Ap2** 14-26 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco limoso, bloques subangulares medios moderados; friable; raíces comunes; límite claro, suave.

**BAt** 26-33 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios moderados; friable; raíces escasas; límite abrupto, suave.

**Bt1** 33-60 cm; pardo grisáceo (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios fuertes; firme; raíces escasas; barnices arcillo-húmicos abundantes; límite claro, suave.

**Bt2** 60-78 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios fuertes; firme; raíces escasas; barnices arcillo-húmicos escasos; límite gradual, suave.

**BC** 78-106 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios débiles; friable; límite difuso, suave.

**C** 106-140 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; moteados abundantes, medios, débiles.

**Observaciones:** El estado de humedad es fresco en todos los horizontes del perfil descripto.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Ap1 | Ap2 | BAt | Bt1 | Bt2 | BC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de laboratorio | 3397 | 3398 | 3399 | 3400 | 3401 | 3402 | 3403 |
| Profundidad (cm) | 0-14 | 14-26 | 26-33 | 33-60 | 60-78 | 78-106 | 106-140 |
| Factor de humedad | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,08 |
| Mat. orgánica ( %) | 3,8 | 3,0 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| Carbono total ( %) | 2,20 | 1,79 | 0,86 | 0,68 | 0,46 | 0,26 | 0,12 |
| Nitrógeno ( %) | 0,196 | 0,158 | 0,091 | 0,081 | 0,074 | 0,042 | 0,024 |
| Relación C/N | 11 | 11 | 9 | 8 | - | - | - |
| Arcilla <2 µ ( %) | 23,3 | 24,6 | 30,3 | 38,3 | 33,9 | 23,3 | 14,2 |
| Limo 2-20 µ ( %) | 27,0 | 24,9 | 21,2 | 20,6 | 21,7 | 25,3 | 22,3 |
| Limo 2-50 µ ( %) | 69,8 | 68,3 | 62,5 | 55,4 | 58,6 | 68,7 | 80,0 |
| AMF 50-75 µ ( %) | - | - | - | - | - | - | - |
| AMF 75-100 µ ( %) | - | - | - | - | - | - | - |
| AMF 50-100 µ ( %) | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 5,9 | 6,9 | 7,5 | 5,1 |
| AF 100-250 µ ( %) | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| AM 250-500 µ ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AG 500-1000 µ ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMG 1-2 mm ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calcáreo ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eq.humedad ( %) | 31,2 | 32,6 | 31,9 | 35,4 | 35,1 | 32,0 | 27,2 |
| Re. pasta.Ohms | 3076 | 3349 | 3135 | 2593 | 2516 | 2516 | 2864 |
| Cond. mmhos/cm | - | - | - | - | - | - | - |
| pH en pasta | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| pH H2O 1:2,5 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
| pH KCL 1:2,5 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| Cationes de cambio | | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 13,8 | 14,2 | 13,0 | 16,7 | 16,6 | 14,8 | 14,1 |
| Mg++ m.eq./100gr | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 3,9 |
| Na+ m.eq./100gr | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| K+ m.eq./100gr | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| H+ m.eq./100gr | 7,6 | 8,3 | 6,8 | 7,3 | 6,7 | 5,4 | 3,9 |
| Na ( % de T) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| V.S m.eq./100gr | 19,3 | 18,9 | 18,2 | 23,5 | 23,8 | 21,9 | 20,9 |
| CIC m.eq./100gr | 22,9 | 23,0 | 22,2 | 26,3 | 27,1 | 24,2 | 21,1 |
| Sat. con bases ( %) | 84 | 82 | 82 | 89 | 88 | 90 | 95 |