CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Juncalito (Jun)

Descripción

Es un suelo gris muy oscuro, con aptitud ganadera, se encuentra en áreas bajas de la cuenca del Arroyo Chelforó, en posición de bajos cercanos a lagunas de la "Subregión Pampa Deprimida sector Oriental", pobremente drenado, formado en sedimentos franco limosos finos, fuertemente textural, alcalino sódico a partir de los 14 cm, muy levemente salino, con pendientes de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf glósico, fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy 2010).

Ubicación del perfil: Latitud: S 36º 59' 07ᶻ Longitud: W 58º 11' 11". Altitud 36 m.s.n.m. a 8,45 km al SW de la localidad de Labardén, partido de Gral. Guido, provincia Buenos Aires. Mosaico 3757-13-4, Labardén.

Variabilidad de las características: Las variaciones principales se han detectado en los espesores de los horizontes (A) de 13 a 16 cm, (E) 14 a 22 cm., en el argílico con 95 cm., incluye la secuencia de los horizontes Btcn-Btkn1-Btkn2-BCckn. El porcentaje de arcilla en el Bt, puede variar entre 40 a 50 %, alcalinidad 25 a 35 % de sodio de intercambio. El "solum" de 90 a 100 cm. de profundidad.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Únicamente a nivel de Grandes Grupos, La Paulina, Los Mochos, Estación Doce de Octubre.

Suelos asociados: Forma complejos con las series Chelforó, Monsalvo, General Guido, Maipú, Las Armas, Rauch, Ayacucho.

Distribución geográfica: Partidos de General Guido, Maipú, Rauch, Ayacucho; hojas I.G.M. 3757-13, 19, 20 y 3760-12, 18, 24, 30.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta. Napa freática aproximadamente a 1,20 m. de profundidad.

Uso y vegetación: Pastos naturales con predominancia de Pelo de chancho (Distichlis spicata y Distichlis scoparia), Duraznillo blanco (Solanum glaucum) , Trébol blanco (Trifolium repens), Pasto mosquito (Eragrostis luggens).

Capacidad de uso: VII ws

Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, peligro de anegamiento por capa freática fluctuante.

Índice de productividad según la región climática: 12,5 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, régimen de humedad ácuico, horizonte argílico (rel. arc. B/A >1.6), nátrico y álbico (Value superior a 10YR 4/2) en húmedo. Alta saturación en bases. Lenguas en el horizonte nátrico.

Descripción del perfil típico:

21/199 C
Fecha de muestreo: 12 de Diciembre de 1969
Reconocodores: Musto - Rossi -Rosetti

Ap 0-14 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco; franco arcilloso; bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, adhesivo; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.

En 14-25 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris claro (10YR 7/1) en seco; franco limoso; laminar débil con tendencia a masivo; suelto; muy friable; no plástico; no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior abrupto, ondulado.

Btcn 25-54 cm; gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo; arcilloso; columnar, gruesa, fuerte; extremadamente duro; muy firme; muy plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso muy abundantes; escasas concreciones y micro-concreciones calcáreas; barnices "clayskins" muy abundantes; moteados comunes, finos, débiles; escasas raíces; formaciones especiales: lenguas de material álbico; límite inferior claro, ondulado.

Btkn1 54-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcilloso; prismas compuestos, medios irregulares, gruesos, fuertes; duro; firme; plástico; adhesivo; abundantes concreciones de hierro manganeso; concreciones de calcio abundantes; barnices "clayskins" abundantes; moteados abundantes gruesos y sobresalientes; escasas raíces; límite inferior gradual, suave.

Btkn2 70-90 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares gruesos, débiles con tendencia a masivo; duro; ligeramente firme; plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso muy abundantes; concreciones y micro-concreciones calcáreas muy abundantes; barnices "clayskins" abundantes; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; formaciones especiales; límite inferior claro, suave.

BCckn 90-120 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios, débiles que rompe a masivo; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso y de calcáreo abundantes; barnices "clayskins" escasos; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; reacción moderada a los carbonatos libres en la masa; límite inferior gradual, suave.

Ck 120 a + cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcilloso; masivo; friable; concreciones de hierro-manganeso escasas y micro-concreciones de calcio abundantes, fuerte reacción a los carbonatos libres en la masa.

Observaciones: Interdigitaciones (lenguas de horizonte álbico E) entremezclado con el horizonte Bt.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	En	Btcn	Btkn1	Btkn2	BCckn	Ck
Profundidad (cm)	0-14	14-25	25-54	54-70	70-90	90-120	120 a +
Mat. orgánica (%)	9,53	0,84	0,86	0,48	0,31	0,31	-
Carbono total (%)	5,53	0,49	0,50	0,28	0,18	0,18	0,06
Nitrógeno (%)	0,552	0,062	0,061	-	-	-	-
Relación C/N	10	8	8	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	27,5	10,7	45,5	47,6	41,3	38,4	29,2
Limo 2-20 µ (%)	27,0	25,5	13,9	14,3	18,3	16,2	18,5
Limo 2-50 µ (%)	46,3	53,3	34,5	31,9	33,3	31,9	28,9
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	25,4	34,5	19,3	19,6	25,0	27,5	32,5
AF 100-250 µ (%)	0,8	1,5	0,7	0,9	0,4	0,5	3,2
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	vest.	vest.	1,7	6,2
Eq.humedad (%)	43,4	19,1	66,1	73,3	70,2	48,3	36,0
Re. pasta Ohms	2737	3189	619	643	738	1095	1523
Cond. mmhos/cm	-	-	2,21	2,61	1,78	0,90	-
pH en pasta	6,4	7,9	7,8	8,0	7,9	8,1	8,2
pH H2O 1:2,5	6,9	8,2	8,5	8,7	8,8	9,1	9,2
pH KCL 1:2,5	5,8	6,7	6,9	7,2	7,1	7,4	7,5
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	31,1	4,2	13,8	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	6,4	3,2	6,3	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	2,3	2,0	7,1	10,0	10,0	7,4	4,4
K+ m.eq./100gr	1,6	0,6	1,8	2,0	2,0	2,2	1,9
H+ m.eq./100gr	7,0	-	-	-	-	-	-
Na (% de T)	8	25	25	33	32	21	16
Suma de Bases	23,4	10,0	29,0	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	27,5	8,2	27,9	30,0	30,2	34,0	27,0
Sat. con bases (%)	85	100	-	-	-	-	-