CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Alianza (LA)

Descripción

Es un suelo oscuro y somero, de aptitud agrícola, se halla en un paisaje de lomas y pendientes de áreas serranas, dentro de la Subregión Sierra y Pedemonte de Tandilia, bien drenado a algo excesivamente drenado, evolucionado sobre sedimentos loéssicos limosos finos, apoyado sobre una costra calcárea de extensión regional, no alcalino, no salino con pendiente 1-3 %.

Clasificación taxonómica: Hapludol petrocálcico, limosa fina, mixta, somera, térmica (AD-INTA-ST-2010). Hapludol lítico, limosa fina, mixta, somera, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud: S 37° 44' 10". Longitud: W 58° 29' 00". Altitud 146 m.s.n.m. a 25 km. al noroeste de la localidad de Balcarce (Estancia el Otoño), homónima del partido, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3757-31-1, Cinco Cerros.

Variabilidad de las características: Espesor del horizonte A, puede variar entre los 18 y 35 cm., en algunos casos incluye tosquilla (CO3Ca) dispersa, textura franco a franco arcilloso, límite con el material parental (2Ckk), abrupto-ondulado. Espesor del "solum" entre 22 - 35 cm. de profundidad.

Fases: Por pendiente en sus distintos grados, pedregosidad y rocosidad.

Series similares: No se reconocieron.

Suelos asociados: Azul, Balcarce, Cinco Cerros, La Delicia, La Escocia, La Loma, La Malacara, La Nueva Esperanza, Lobería, Mar del Plata, Mechongué, Napaleofú, Nechochea, Ochandio, Olavarría, Río Quequén, Santa Luisa, Semillero Buck, Sierra de Los Padres, Tandil.

Distribución geográfica: Partidos de Azul, Balcarce, Lobería, Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil. Hojas I.G.M. 3757-25, 31, 32, 33; 3760-14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 36; 3960-3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 16.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado a algo excesivamente drenado, escurrimiento rápido a moderadamente rápido, permeabilidad moderadamente lenta a moderada, capa freática profunda.

Uso y vegetación: Agrícola, intercalando leguminosas anuales. Malezas: Gramón (Cynodon dactylon), Cardo de Castilla (Cynara cardunculus), Stipa sp.

Capacidad de uso: IV es


Limitaciones de uso: Pendiente, profundidad, leve susceptibilidad a la erosión hídrica.

Índice de productividad según la región climática: 22,7 (B); 21,5 (C); 20,3 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte petrocálcico (2Ckkm), saturación de bases (90 %).

Descripción del perfil típico:

8/1351 C
Fecha de muestreo: Febrero de 1970
Reconocedores: López - Etcheverry



Ap 0-28 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; migajosa, fina, débil; duro; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.

2Ckkm 28 cm; "tosca en plancha".

Observaciones: Levemente susceptible a la erosión hídrica.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	2Ckkm
Profundidad (cm)	5-20	28-43 a +
Mat. orgánica (%)	10,28	-
Carbono total (%)	5,98	-
Nitrógeno (%)	0,532	-
Relación C/N	11	-
Arcilla <2 µ (%)	26,9	-
Limo 2-20 µ (%)	0	-
Limo 2-50 µ (%)	29,7	-
AMF 50-75 µ (%)	0	-
AMF 75-100 µ (%)	31,3	-
AMF 50-100 µ (%)	0	-
AF 100-250 µ (%)	4,2	-
AM 250-500 µ (%)	4,1	-
AG 500-1000 µ (%)	3,8	-
AMG 1-2 mm (%)	0	-
Calcáreo (%)	0	-
Eq.humedad (%)	31,7	-
Re. pasta Ohms	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-
pH en pasta	6,7	-
pH H2O 1:2,5	6,9	-
pH KCL 1:2,5	-	-
Cationes de cambio		
Ca++ m.eq./100gr	32,0	-
Mg++ m.eq./100gr	0,5	-
Na+ m.eq./100gr	0,4	-
K+ m.eq./100gr	2,4	-
H+ m.eq./100gr	7,3	-
Na (% de T)	-	-
Suma de Bases	35,3	-
CIC m.eq./100gr	39,2	-
Sat. con bases (%)	90	-