CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Limpia (LLi)

Descripción

Es un suelo somero, originado a partir de un material loessico sobre tosca. Se encuentra en un paisaje de cubetas dentro de planicies con relieve cóncavo y pendientes del 0 %. Es pobremente drenado, de permeabilidad y escurrimiento lentos y tiene peligro de anegamiento en épocas excepcionales. Las limitaciones de uso corresponden a la alcalinidad sódica, el drenaje impedido y la fertilidad.

Clasificación taxonómica: Natracualf típico, fina illitica, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 36º 9' 34.51". Longitud W 60º 24' 45.42". Altitud 73 msnm, a 38.2 km al OSO de la localidad de General Alvear, partido de General Alvear, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3760-3-1.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Pelo de chancho (Distichlis sp.), Stypa sp., Rumex sp.


Capacidad de uso: VII ws

Limitaciones de uso: Alcalinidad, drenaje impedido, fertilidad.

Índice de productividad según la región climática: 7 (B)

Descripción del perfil típico:

19/6 C
Fecha de muestreo: 28 de Noviembre de 1973



A 0-25 cm; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco y pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; bloques- subangulares, medios, debiles; blando en seco; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moteados escasos, gruesos y debiles; abundantes raíces; limite abrupto, suave.

2Bt 25-55 cm; pardo claro (7.5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; columnar gruesas, debiles que rompe a prismas gruesos y bloques subangulares; extremadamente duro en seco; firme en húmedo; plástico y adhesivo; moderada cantidad de concreciones de hierro manganeso y carbonato de calcio; abundantes clayskins y moderada cantidad de calyhumus; moteados abundantes, medios y precisos; moderada cantidad de raíces; chorreaduras de materia organica; limite claro y ondulado.

2BC 55-71 cm; pardo claro (7.5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; duro en seco; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; escasas concreciones de hierro- manganeso; escasos clayhumus; moteados abundantes, finos y precisos; escasas raíces; duripan discontínuo en forma laminar; limite claro y suave.

R 71 a + cm; duripán.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	2Bt	2BC
Profundidad (cm)	7-19	31-50	58-67
Materia Orgánica (%)	0.77	0.34	-
Carbono Orgánico (%)	0.45	0.20	-
Nitrógeno (%)	0.062	-	-
Relación C/N	7	-	-
Arcilla <2 µ (%)	12.8	37.3	-
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	26.0	14.2	26.8
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	27.7	22.6	30.1
AF 100-250 µ (%)	31.1	29.2	25.2
AM 250-500 µ (%)	2.4	1.5	1.7
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-
Calcáreo (%)	0.0	1.2	1.4
Equivalente de Humedad (%)	11.4	61.2	23.6
Re. pasta. Ohms	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	-	-	-
pH en pasta de saturación	6.9	8.6	8.8
pH H2O (1:2.5)	7.3	9.9	9.8
pH KCL (1:2.5)	-	-	-
Cationes de Cambio			
Ca++ m.eq./100gr	3.1	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2.4	-	-
Na+ m.eq./100gr	0.7	14.9	12.2
K+ m.eq./100gr	0.5	0.7	1.2
H+ m.eq./100gr	24	-	-
PSI (%)	10	59	61
Agua de Saturación (%)	-	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	67	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	6.7	25.2	20.0
Saturación de bases (%) (S/T)	100	-	-
% de Saturación (S+H)	-	-	-