CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# La Retranca (LRa)

## Descripción

Es un suelo de textura franco-arcillosa a arcillosa, poco profundo por la presencia de tosca a los 75 cm de profundidad. Se desarrollo a partir de sedimentos loessicos depositados sobre tosca. En un relieve normal y un paisaje plano se encuentra en lomas extendidas suavemente onduladas, con pendientes de 0 a 1 %. Es un suelo moderadamente bien drenado, de escurrimiento lento y permeabilidad media. Es no alcalino y no salino. La vegetación presente es un cultivo de trigo. Las limitaciones de uso refieren al texturas pesadas y profundidad efectiva.

**Clasificación taxonómica:** Argiudol vértico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica.

**Ubicación del perfil:** Latitud S 38º 26' 56.99". Longitud W 61º 8' 11.41". Altitud 213 msnm, a 1 km al E del casco de la Estancia Santa Rosa SA y a 25.7 km al SO de la localidad de Indio Rico, partido de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3960-7-2, La Aurora.

**Drenaje y permeabilidad:** Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad lenta.

**Uso y vegetación:** Trigo.


**Capacidad de uso:** III s

**Limitaciones de uso:** Texturas pesadas, profundidad efectiva.

**Índice de productividad según la región climática:** 44 (D), 39 (F)

## Descripción del perfil típico:

**25/10 C**
**Fecha de muestreo: 5 de Junio de 1985**




**Ap** 0-26 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios, moderados que rompen en bloques subangulares, finos y estos a granular; duro en seco, friable en húmedo, plástico, adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto, suave.

**Bt** 26-51 cm; pardo oscuro (7.5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas compuestos regulares, gruesos, fuertes, que rompen a prismas medios, y estos a bloques angulares regulares y fuertes; extremadamente duro en seco; firme en húmedo, muy plástico, muy adhesivo; barnices húmico-arcillosos abundantes; raíces comunes; límite claro, suave.

**Btk** 51-75 cm; pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; semicolumnas gruesas, moderadas a fuertes que rompen a prismas medios y estos a bloques angulares, irregulares, medios; extremadamente duro en seco; firme en húmedo, plástico, adhesivo; barnices arcillosos escasos; débil reacción de los carbonatos libres en la masa; límite abrupto, ondulado.

**2Ckm** 75 a + cm; tosca.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Ap | Bt | Btk |
|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-26 | 26-51 | 51-75 |
| Materia Orgánica ( %) | 3.57 | 1.52 | 0.90 |
| Carbono Orgánico ( %) | 2.07 | 0.88 | 0.52 |
| Nitrógeno ( %) | 0.213 | 0.093 | 0.073 |
| Relación C/N | 10 | 10 | 7 |
| Fósforo (ppm) | 7.9 | 0.7 | 1.5 |
| Arcilla <2 µ ( %) | 32.8 | 43.8 | 43.7 |
| Limo 2-20 µ ( %) | 26.0 | 18.7 | 11.9 |
| Limo 2-50 µ ( %) | 45.3 | 29.9 | 21.3 |
| AMF 50-75 µ ( %) | 9.7 | 11.7 | 15.0 |
| AMF 75-100 µ ( %) | 7.8 | 7.7 | 10.6 |
| AMF 50-100 µ ( %) | 17.5 | 19.4 | 25.6 |
| AF 100-250 µ ( %) | 4.4 | 6.8 | 9.4 |
| AM 250-500 µ ( %) | - | - | - |
| AG 500-1000 µ ( %) | - | - | - |
| AMG 1-2 mm ( %) | - | - | - |
| Calcáreo ( %) | - | - | - |
| Equivalente de Humedad ( %) | 30.4 | 32.6 | 32.1 |
| Re. pasta. (Ohms/cm) | 3326 | 2152 | 2446 |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | - | - | - |
| pH en pasta de saturación | 6.0 | 6.1 | 6.5 |
| pH H2O (1:2.5) | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
| pH KCL (1:2.5) | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
| Cationes de Cambio | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 15.7 | 18.6 | 20.4 |
| Mg++ m.eq./100gr | 3.1 | 4.6 | 9.0 |
| Na+ m.eq./100gr | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| K+ m.eq./100gr | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
| H+ m.eq./100gr | 7.8 | 6.6 | 5.3 |
| PSI ( %) | 1.99 | 2.03 | 2.15 |
| Agua de Saturación ( %) | - | - | - |
| Suma de bases [cmol(+)/kg] (S) | 21.1 | 25.1 | 31.3 |
| CIC [cmol(+)/kg] (T) | 25.1 | 29.5 | 32.5 |
| Saturación de bases ( %) (S/T) | 84 | 85 | 98 |
| % de Saturación (S+H) | - | - | - |