CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Tigra (LTi)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo con fuerte desarrollo, su aptitud es agrícolo ganadera, se encuentra enun paisaje de lomas extendidas, en posición de loma baja en la Subregión Pampa Interserrana, transicionalal sector Occidental de la Pampa Deprimida, algo pobremente drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos franco limosos, no salino, fuertemente alcalinodesde los 39 cm. con pendientes de 0.5-1 %.

Clasificación taxonómica: Natrudol típico, limosa fina, illítica, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2006). Hapludol tapto nátrico, limosa fina, illítica, térmica (ADA-INTA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 37° 22' 00 ". Longitud: W 60° 57' 00". Altitud 194 m.s.n.m. Fotomosaico, hoja I.G.M. 3760-26-1, Estancia La Tigra. A 24,3 km. al noroeste de la ciudad de Laprida, Estancia El Recuerdo, partido de Laprida, provincia de Buenos Aires.

Variabilidad de las características: AHay perfiles con horizontes superficiales (Ap-A) de espesores que varían entre 18 y 30 cm. El Bt puede ser franco arcilloso a franco arcillo arenoso, en columnas gruesas y fuertes. El BC, franco arcillo arenoso con carbonatos libres en la base del horizonte e incipiente cementación. El PSI puede variar de 25 % a 44 %. Pueden tener sales, sulfatos y cloruros entre 2 a 6 mmhos.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: General La Madrid y Monte.

Suelos asociados: Las Hermanas, La Loma, Coronel Bunge, San Gabriel, Pillahuincó y Laprida, entre otras.

Distribución geográfica: Partidos de General La Madrid, Coronel Pringles, Laprida, González Cháves, Tres Arroyos, Juárez, Coronel Suárez. Fotomosaicos 3760-19, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34; 3960-1, 2, 8; 3763-18, 24 y 30.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Agrícola ganadero. Rye grass (Lolium multiflorun), Stipa, (Sp). Malezas: Cardo negro (Cirsium vulgare), Abrepuño (Silybum marianum).

Capacidad de uso: IV ws


Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica.

Índice de productividad según la región climática: 38,2 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico; horizonte argílico (arcilla % relación B/A >1.2) y horizonte nátrico (15 % Na+).

Descripción del perfil típico:

80-C
Fecha de muestreo: 6 de Mayo de 1988



Ap1 0-28 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.

En 28-39 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco arenoso; masivo; muy friable; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite claro, suave.

2Btn 39-59 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; columnas gruesas y fuertes; firme; plástico; adhesivo; escasos barnices de "clayskins"; límite inferior claro, suave.

2BCkn 59-94 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo arenoso; bloques subangulares, medios fuertes; firme; plástico; adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; escasos barnices de "clayskins"; moderada reacción de carbonatos libres en la masa; límite claro, suave.

3Ckn1 94-117 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; débil reacción de carbonatos libres; límite gradual, suave.

3Ckn2 117-150 cm a +; pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; fuerte reacción de carbonatos libres.

Observaciones: La fotografía de la Serie La Tigra ilustra la portada del USDA- Keys To Soil Taxonomy Versión 2003. El Gran Grupo Natrudolls fue incorporado al Soil Taxonomy en su Versión 1998 propuesto por Argentina. Perfiles similares: C 83 (Mosaico 3760-25-2).



Figura 1: Fotos del perfil (izquierda) y del paisaje (derecha) de la Serie La Tigra

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	En	2Btn	2BCkn	3Ckn1	3Ck2
Profundidad (cm)	0-28	28-39	39-59	59-94	94-117	117-148
Mat. orgánica (%)	4,30	1,42	1,07	0,40	0,20	0,10
Carbono total (%)	2,50	0,82	0,62	0,23	0,12	0,08
Nitrógeno (%)	0,212	0,071	0,060	-	-	-
Relación C/N	11,8	11,5	10,3	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	20,1	14,1	29,3	22,6	16,1	18,7
Limo 2-20 µ (%)	11,2	10,4	8,8	10,5	11,4	11,0
Limo 2-50 µ (%)	30,7	27,5	26,3	27,1	31,1	22,2
AMF 50-75 µ (%)	24,9	29,7	28,6	26,1	26,9	29,9
AMF 75-100 µ (%)	22,5	19,9	8,3	17,9	16,4	22,1
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	1,8	0,8	7,5	6,3	5,5	7,7
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	vest.	4,0	9,4
Eq.humedad (%)	20,4	20,0	30,9	23,6	24,0	21,1
Re. pasta Ohms	4969	6414	1374	1374	1832	1832
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,1	7,4	7,7	8,5	8,9	8,9
pH H2O 1:2,5	6,5	8,3	8,5	9,3	9,7	9,6
pH KCL 1:2,5	5,2	5,7	6,0	6,6	7,1	7,3
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	10,8	5,5	8,9	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4,4	5,1	4,9	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,6	1,5	8,7	10,7	8,7	7,6
K+ m.eq./100gr	1,6	0,8	1,7	2,7	2,4	2,2
H+ m.eq./100gr	4,4	2,6	-	-	-	-
Na (% de T)	3	14	37	52	54	45
Suma de Bases	17,4	12,9	24,2	-	-	-
CIC m.eq./100gr	17,2	10,5	23,3	20,6	15,6	16,8
Sat. con bases (%)	100	100	100	-	-	-