CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Las Nutrias (LN)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, con aptitud ganadera-agrícola, se encuentra en pendientes largas en un paisaje de lomas arenosas, en posición de media loma alta, en la Subregión Pampa Ondulada alta, algo pobremente drenado, se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico en áreas pobremente drenadas en los sectores de General Arenales, Junín y Rojas, de textura franco, alcalino sódico, no salino, con pendientes que no superan el 0-1 %.

Clasificación taxonómica: Hapludol ácuico, limosa fina, mixta, térmica (USDA- S. Taxonomy V. 2006). Natracuol típico, limosa fina, mixta, térmica (7ª Aprox. Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 34° 21' 28'' y Longitud W 60° 51' 40''. Altitud 66 m.s.n.m. a 7 km. al oeste de la Estación Rafael Obligado, partido de Rojas, provincia de Buenos Aires; mosaico 3560-8-1.

Series similares: Membrillar.

Suelos asociados: En lomas arenosas, integrando consociaciones con Fortín Tiburcio, Delgado, Santa Isabel y Rancagua.

Distribución geográfica: Cuenca del Arroyo Saladillo de la Vuelta y alrededores de las lagunas de Gómez y Mar Chiquita. Oeste del partido de Colón. Hojas I.G.M. 3560-1, 3560-7 y 3560- 8 y 3.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento medio, permeabilidad lenta a moderadamente lenta, la capa freática fluctúa dentro del perfil.

Uso y vegetación: Al momento del reconocimiento, campo arado con labranza convencional, cultivo de Trigo (Triticum sativa).

Capacidad de uso: VI ws


Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica.

Índice de productividad según la región climática: 33,2 (A).

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, horizonte cámbico (sección de control relación arcilla B/A 1,1) con rasgos hidromórficos y capa freática fluctuante.

Descripción del perfil típico:

12/793 C
Fecha de muestreo: 18 de Noviembre de 1966
Reconocedores: Jacyszyn - Giagnoni - Scoppa - Meyer - Galazzi



Ap1 0-18 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares finos moderados que rompe a granular; muy friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

Ap2 18-33 cm; pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro (10YR 2,5/2) en húmedo; franco; bloques subangulares y finos moderados; friable; no plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.

Bw 33-62 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe en bloques angulares; friable; no plástico, ligeramente adhesivo; comunes microconcreciones calcáreas; comunes barnices "clay skins" medios de color pardo oscuros (10YR 3/3); límite inferior claro, suave.

BCtn 62-126 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques angulares medios y gruesos moderados que rompe en bloques angulares finos; mojado; no plástico, ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas comunes; escasos barnices "clay skins" medios; escasos moteados débiles de hierro; límite inferior gradual, suave.

Ckn 126-135 cm; pardo (10YR 4,5/3) en húmedo; franco limoso; masivo; mojado; no plástico; no adhesivo; abundantes concreciones calcáreas; moteados de hierros escasos, finos débiles; escasos nódulos cementados; abundantes carbonatos libres.

Observaciones: Actividad biológica (lombrices) en el Ap1 y Ap2 y krotovinas en el horizonte Bw.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

orizontes	Ap1	Ap2	Bw	BCtn	Ckn
Profundidad (cm)	0-18	18-33	33-62	62-126	126-130
Mat. orgánica (%)	3,53	1,75	0,5	0,2	0,1
Carbono total (%)	2,05	1,02	0,29	0,13	0,06
Nitrógeno (%)	0,210	0,108	0,043	0,026	-
Relación C/N	10	9,0	7,0	-	-
Arcilla <2 µ (%)	17,1	14,0	18,8	13,4	9,8
Limo 2-20 µ (%)	27,1	26,7	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	46,9	47,4	43,3	50,4	52,3
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	32,9	35,4	34,6	31,5	33,2
AF 100-250 µ (%)	3,1	3,2	3,3	4,7	4,7
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,3	0,0	0,0	00
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eq.humedad (%)	25,8	23,0	29,2	26,0	22,0
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,1	5,5	7,5	8,6	8,7
pH H2O 1:2,5	5,3	5,9	8,3	9,3	9,3
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	10,6	7,4	5,4	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2,3	1,2	6,6	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,2	0,4	2,3	4,2	2,7
K+ m.eq./100gr	2,2	1,8	3,3	3,5	3,2
+ m.eq./100gr	8,1	4,9	2,5	-	-
Na (% de T)	1,0	3,2	12,7	27,0	19,7
Suma Bases	15,3	10,8	17,6	-	-
CIC m.eq./100gr	19,9	12,3	18,0	15,5	13,7
Sat. con bases (%)	77	88	98	-	-