CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Molina (Mol)

## Descripción

El perfil Molina representa suelos que evolucionan en amplias planicies con pendientes que no superan el 1 %. Ocupan las pendientes y se desarrollan a partir de arenas eólicas que sobreyacen a un horizonte calcáreo fuertemente cementado. El perfil representativo es un suelo moderadamente profundo y algo excesivamente drenado.

Este perfil presenta un horizonte superficial Ap de 12 cm de espesor, con regular provisión de materia orgánica. El horizonte A se extiende desde los 12 hasta los 25 cm de profundidad: su contenido de materia orgánica es algo menor que en el Ap y es ligeramente más alcalino. Se reconoce a continuación el horizonte ACk, de 22 cm de potencia y moderadamente alcalino. El horizonte Ck aparece a los 47 cm y se extiende hasta los 86 cm de profundidad, donde el perfil se interrumpe abruptamente por la presencia de un horizonte petrocálcico (2Ckm).

**Clasificación taxonómica:** Paleustol petrocálcico, franca gruesa, mixta, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 38º 58' 8.8", Longitud: W 62º 44' 13.1", a 18 km al SO de la localidad de Ombucta.

**Drenaje y permeabilidad:** Algo excesivamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad rápida.


**Capacidad de uso:** IV sc

**Limitaciones de uso:** Clima, peligro de erosión eólica, drenaje excesivo.

**Índice de productividad según la región climática:** 22.5 (F).

## Descripción del perfil típico:

**C-23**
**Fecha de muestreo: Noviembre de 1989**
**Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca**




**Ap** 0-12 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; raíces comunes; límite abrupto, suave.

**A** 12-25 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; raíces comunes; límite claro, suave.

**ACk** 25-47 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces escasas; límite claro, suave.

**Ck** 47-86 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco; franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; límite abrupto, suave.

**2Ckm** 86 a + cm; pardo pálido (10YR 6/3) en húmedo; pardo muy pálido (10YR 8/3) en seco.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Ap | A | ACk | Ck | 2Ckm |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de laboratorio | 35150 | 35151 | 35152 | 35153 | 35154 |
| Profundidad (cm) | 0-12 | 12-25 | 25-47 | 47-86 | 86+ |
| Factor de Humedad | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| Mat. orgánica ( %) | 1.70 | 1.27 | 1.21 | 0.65 | 0.79 |
| Carbono Orgánico ( %) | 1.00 | 0.73 | 0.70 | 0.38 | 0.46 |
| Nitrógeno ( %) | 0.075 | 0.078 | 0.071 | 0.036 | 0.043 |
| Relación C/N | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Fósforo asimilable (ppm) | 21.8 | 7.8 | 27.9 | - | - |
| Arcilla <2 µ ( %) | 10.4 | 14.7 | 10.7 | 11.4 | 13.7 |
| Limo 2-20 µ ( %) | 7.6 | 6.1 | 8.4 | 11.2 | 13.1 |
| Limo 2-50 µ ( %) | 21.6 | 18.6 | 18.1 | 18.7 | 22.5 |
| AMF 50-74 µ ( %) | 9.6 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 4.4 |
| AMF 74-100 µ ( %) | 8.7 | 6.9 | 9.8 | 6.2 | 4.5 |
| AMF 50-100 µ ( %) | 18.3 | 13.4 | 17.0 | 8.9 | |
| AF 100-250 µ ( %) | 37.1 | 43.1 | 40.2 | 41.2 | 9.8 |
| AM 250-500 µ ( %) | 11.3 | 9.2 | 10.4 | 8.9 | 6.1 |
| AG 500-1000 µ ( %) | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2.0 |
| AMG 1-2 mm ( %) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| Calcáreo ( %) | vest. | vest. | 2.0 | 5.6 | 37.0 |
| Eq.humedad ( %) | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 17.8 |
| Cond. de la pasta (mmhs/cm) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| pH en pasta | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
| pH H2O 1:2,5 | 7.1 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | - |
| pH KCL 1:2,5 | 6.1 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | - |
| Cationes de cambio | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | - |
| K+ m.eq./100gr | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | - |
| PSI ( %) | 3 | 3 | 2 | 6 | - |
| Agua de Saturación ( %) | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
| Suma de bases [cmol (+)/kg] (S) | - | - | - | - | - |
| CIC [cmol (+)/kg] (T) | 12.6 | 14.2 | 13.8 | 12.6 | - |
| Saturación de bases % (S/T) | - | - | - | - | - |
| Saturación % (S+H) | - | - | - | - | - |