CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Monsalvo (Mon)

Descripción

Es un suelo oscuro, de aptitud agrícola ganadero, se encuentra en un paisaje de planicies extendidas, en posición de lomas y microlomas, en la "Subregión de la Llanura Marina", algo pobremente drenado, formado sobre material loéssico ligeramente alcalino en profundidad, con pendientes entre 0 y 1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol vértico, fina, mixta, térmica (Soil Taxonomy V. 2014).
Argiudol ácuico, fina, mixta, térmica. 7ª Aproximación (Soil Taxonomy V. 1975

Ubicación del perfil: Latitud S: 37° 5' 52.94"; longitud W: 57° 20' 31.59". Altitud: 8 m.s.n.m. a 22 km al SW de General Madariaga (Ea. El Cardal), partido de General Madariaga, provincia de Buenos Aires; Hoja I.G.M. 3757-21-1, General Madariaga.

Variabilidad de las características: El horizonte A, varía entre 27 y 44 cm. El Bt, tiene entre 68 a 88 cm. de espesor, con texturas arcillo limosas y franco arcillo limosas, con valores de arcilla que varía entre 34 a 42 %; el BC, puede tener concreciones calcáreas.

Fases: Por acumulación.

Series similares: Peyrano, Solis, Ramallo, Portela, Capilla del Señor.

Suelos asociados: Formando complejo de series con Las Armas, Maipú, Coronel Vidal, Cobo, Chelforó, Juncalito, Estancia Tarrhué, Estación Invernada.

Distribución geográfica: Partidos de Ayacucho, Mar Chiquita, General Madariaga, Maipú, General Lavalle, General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires. Hojas I.G.M. 3757-15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 32 y 33.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento medio a lento, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Trébol blanco (Trifolium repens), Pata de perdiz (Cynodon dactylon), Abrepuño (Centaurea calcytrapa), Gramillón (Stenotaphrum secundatum), lengua de vaca (Rumex crispus).

Capacidad de uso: III w


Limitaciones de uso: Drenaje, permeabilidad, fuertemente textural (relación arcilla B/A= 1,61; horizonte Btnss % Ap= 1,62), ligera alcalinidad.

Índice de productividad según la región climática: 59,8 (B)

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad údico, epipedón mólico (Ap), horizonte argílico, fuertemente textural, con características vérticas.

Descripción del perfil típico:

8/2415 C
Fecha de muestreo: 5 de Enero de 1972
Reconocedores: Rizzolo - Arteaga - Magneres



Ap 0-27 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris oscuro (10YR 4/1) en seco; franco; bloques subangulares medios, moderados que rompe a granular; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

2Btnss 27-42 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo (7,5YR 4/4) en seco; arcilloso; prismas irregulares fuertes que rompe a prismas menores y estos a bloques angulares medios, fuertes; muy duro; muy firme; muy plástico, muy adhesivo; barnices de arcilla (clayskins) comunes; moteados de hierro-manganeso escasos, finos y débiles, formaciones especiales: slikensides escasos; límite inferior abrupto, quebrado.

2Btn 42-54 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco; franco arcilloso; prismas compuestos, irregulares, débiles, moderados, que rompe en prismas irregulares medios y bloques subangulares, medios, moderados; extremadamente duro; firme; plástico, adhesivo; barnices arcillo-húmicos (clays humicos) comunes; moteados de hierro manganeso, comunes, medios y sobresalientes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

2BCnx 54-115 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo muy claro (7,5YR 7/4) en seco; franco arcilloso; bloques angulares medios moderados con tendencia a masivo; extremadamente firme; extremadamente duro; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices de arcilla (clay skins) escasos; formaciones especiales: microconcreciones de carbonato de calcio comunes y cementación moderada por hierro; raíces escasas.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	2Btnss	2Btn	2BCnx
Profundidad (cm)	0-27	27-42	42-54	54-115
Mat. orgánica (%)	8.02	1.00	0.40	-
Carbono total (%)	4.65	0.58	0.23	-
Nitrógeno (%)	0.453	0.074	-	-
Relación C/N	10	8	-	-
Fósforo (PPM)	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	26.2	42.2	34.6	27.4
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	39.5	35.5	35.9	40.8
AMF 50-75 µ (%)	19.9	14.0	19.7	19.0
AMF 75-100 µ (%)	13.0	7.9	9.4	9.5
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	0.5	0.4	0.4	0.4
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-
Calcáreo (%)	0.0	0.0	vest.	2.9
Eq.humedad (%)	27.6	37.4	28.4	24.9
Re. pasta Ohms	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-
pH en pasta	6.0	6.6	7.0	8.1
pH H2O 1:2,5	6.9	7.8	8.1	9.1
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	18.0	16.1	-	-
Mg++ m.eq./100gr	1.4	4.9	-	-
Na+ m.eq./100gr	0.5	1.0	1.1	1.8
K+ m.eq./100gr	1.7	1.8	2.0	1.7
H+ m.eq./100gr	14.3	8.4	-	-
Na (% de T)	2.0	4.0	5.0	10.0
Suma de Bases	21.6	23.8	-	-
CIC m.eq./100gr	24.9	24.6	22.8	18.0
Sat. con bases (%)	87	97	-	-