CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Ortiz de Rosas (Or)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo de aptitud agrícola, se encuentra en un paisaje suavemente ondulado de la Región Pampa Arenosa, en posición de loma, moderadamente bien drenado, poli-genético formado por una acumulación de un material arenoso, que sepulta un B textural formado en un sedimento mas antiguo de textura franco arcillo arenoso, no alcalino, no salino, con pendientes de 1 %.

Clasificación taxonómica: Hapludol thapto árgico, franca fina, mixta, térmica (Adaptación de la clasificación de los suelos argentinos al S.T. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 35º 24' 47". Longitud W 60º 23' 13". Altitud 55 m.s.n.m. a 1,5 km. al Sudoeste de la Estación Ortíz de Rosas, partido de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3560-27-1, Ortiz de Rosas.

Variabilidad de las características: El horizonte A puede tener hasta 40 cm. El horizonte C puede contener de 17 a 21 % de arcilla, algunos pedones que se encuentran al S y SE de la estación homónima pueden presentarse algo más livianos.

Fases: Se reconocieron en diversos grados por pendiente, drenaje, anegamiento y espesor, descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: Saladillo

Suelos asociados: Norumbega; 25 de Mayo.

Distribución geográfica: Partidos de 25 Mayo, 9 de Julio, Bragado y Carlos Casares, en las hojas I.G.M. 3560-20, 25, 26, 27, 31, 32.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: En la fecha del reconocimiento el uso es agrícola con labranza convencional, maíz.

Capacidad de uso: II w


Limitaciones de uso: Drenaje.

Índice de productividad según la región climática: 85,5 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, 55 cm. de material arenoso que sepulta un horizonte argílico de formación anterior.

Descripción del perfil típico:

23/184 C
Fecha de muestreo: 1 de Diciembre de 1983
Reconocedores: Maldonado - Díaz - Sánchez - Malone



Ap 0-23 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados; friable; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto y suave.

A 23-35 cm; pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados; friable; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro y suave.

AC 35-55 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; franco arenoso; granular; muy friable; no plástico; no adhesivo; moteados comunes; precisos y finos; raíces comunes; límite inferior abrupto y suave.

Bt 55-73 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso arenoso; prismas medios moderados; firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices de arcilla y complejo húmico arcilloso; abundantes concreciones de hierro manganeso; moteados comunes, precisos y medios; raíces comunes; límite inferior claro y suave.

BC 73-110 cm; pardo oscuro (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo arenosa; bloques subangulares; ligeramente plástico y adhesivo; moteados comunes, precisos y medios; raíces comunes; límite inferior claro y suave.

Ck 110-120 cm; pardo (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco; masiva; abundantes concreciones de cálcareo; moteados comunes precisos y medios; raíces escasas; reacción débil a los carbonatos libre.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	AC	Bt	BC	Ck
Profundidad (cm)	0-23	23-35	35-55	55-73	73-110	110-120
Mat. orgánica (%)	2,48	2,20	0,49	0,38	0,26	0,12
Carbono total (%)	1,44	1,28	0,26	0,22	0,15	0,07
Nitrógeno (%)	0,135	0,119	-	-	-	-
Relación C/N	10,7	10,7	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	14,9	17,3	13,3	29,5	25,1	21,0
Limo 2-20 µ (%)	20,6	18,4	14,7	12,2	8,8	19,2
Limo 2-50 µ (%)	35,9	36,8	29,4	23,3	21,2	31,8
AMF 50-75 µ (%)	15,2	14,9	18,8	11,2	19,1	12,2
AMF 75-100 µ (%)	16,6	15,1	18,8	11,2	19,1	12,2
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	15,5	13,8	17,6	13,3	15,3	14,0
AM 250-500 µ (%)	1,8	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	-	-
Eq.humedad (%)	15,2	20,5	14,9	24,7	22,9	24,7
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	5,9	6,3	6,3	7,2	7,8
pH H2O 1:2,5	6,0	6,2	6,6	6,8	7,6	8,5
pH KCL 1:2,5	5,3	5,4	5,5	5,4	6,2	7,0
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	8,9	8,9	5,1	8,1	10,1	-
Mg++ m.eq./100gr	4,2	3,2	2,1	6,8	4,3	-
Na+ m.eq./100gr	0,4	0,6	0,5	0,4	0,7	1,5
K+ m.eq./100gr	1,3	1,4	1,3	2,7	2,8	3,9
H+ m.eq./100gr	6,1	5,9	3,0	4,2	3,7	-
Na (% de T)	2,5	3,8	5,3	2,1	3,9	7,8
Suma bases	14,8	14,2	9,0	18,0	17,9	-
V.S m.eq./100gr	14,8	14,2	9,0	18	17,9	-
CIC m.eq./100gr	15,7	15,7	9,5	19,5	17,7	19,3
Sat. con bases (%)	94	90	95	92	100	-