CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Pila (Pi)

Descripción

Es un suelo pardo, profundo, de aptitud agrícola, que se encuentra en un paisaje de lomas planas extensas o en forma de cordones al pie de las lagunas, en posición de media loma baja en la Subregión Pampa Deprimida, algo pobremente drenado, desarrollado a partir de sedimentos eólicos finos, no alcalino, no salino, con pendiente de 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol abrúptico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy 2006).
Hapludol thapto árgico, fina, illítica, térmica (Adaptación Mapas INTA a la 7ª Aprox. USDA-ST 1975).

Ubicación del perfil: Latitud: S 36° 02' 03". Longitud: W 57º 52' 06". Altitud: 7 m.s.n.m. a 8 km. al noroeste de la localidad y partido de Castelli, provincia de Buenos Aires. Fotomosaico I.G.M. 3757-2-1, Castelli.

Variabilidad de las características: No se registraron.

Fases: No se registraron.

Series similares: Henry Bell, Abbott, Maizales, Atucha y Las Gamas.

Suelos asociados: Los Naranjos, El Carmen.

Distribución geográfica: Partidos de Pila, Castelli y Dolores. Fotomosaicos: 3757-1, 2, 7, 8, 13 y 14. Hojas 3557- 31, 32, 33.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta a lenta.

Uso y vegetación: Agrícola con implantación de cultivos realizados con labranza convencional. Pasturas naturales, Cardo negro (Cyrsium vulgare), Raigrass (Lolium multiflorum), Rama negra (Conyza bonariensis), Gramilla (Cynodon dactylon).

Capacidad de uso: III w


Limitaciones de uso: Drenaje y un Bt fuertemente textural (limitaciones de infiltración).

Índice de productividad según la región climática: 63,0 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte argílico entre los 40 y 68 cm. de profundidad, (relación arcilla B/A >1.2) con un incremento de más del 20 % de arcilla.

Descripción del perfil típico:

22/1042 C
Fecha de muestreo: 26 de Octubre de 1972
Reconocedores: Giorgi



Ap 0-26 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco; bloques subangulares finos , moderados con tendencia a granular fina; blando; friable; no plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior gradual, suave.

Ecn 26-40 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; pardo (10YR5/3) en seco; franco; bloques subangulares a masivo; blando; friable; no plástico; no adhesivo; concreciones de hierro abundantes; moteados escasos medios y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto irregular.

2Btcn 40-53 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; arcilloso; prismas semicolumnar, gruesos, fuertes; duro; firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados comunes medios y precisos; raíces comunes; límite inferior gradual y suave.

2Btckn 53-68 cm; pardo oscuro (75YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arcilloso; prismas compuestos irregulares medios moderados; seco; firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro abundantes; concreciones de calcio abundantes; barnices "clayskins" abundantes; moteados comunes precisos y medios; raíces comunes; límite inferior claro y suave.

3BCn1 68-93; pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; bloques subangulares medios, débiles; concreciones de hierro y de calcio escasas; barnices "clayskins" escasos; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite claro y suave.

3BCn2 93-130; franco; masivo con tendencia a laminar; concreciones de hierro y de calcio escasas; moteados escasos medios y precisos; nódulos cementados; límite gradual suave.

Cc 130-145 a + cm; franco; masivo con tendencia a laminar; nódulos cementados.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Ecn	2Btcn	2Btckn	3BCn1	3BCn2	Cc
Profundidad (cm)	5-15	26-36	43-51	57-66	75-90	100-120	130-145
Mat. orgánica (%)	4,43	0,58	0,87	0,48	0,10	-	-
Carbono total (%)	2,58	0,34	0,51	0,28	0,06	-	-
Nitrógeno (%)	0,228	0,045	0,057	-	-	-	-
Relación C/N	11	9	9	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	20,9	16,9	48,2	33,0	23,6	22,6	-
Limo 2-20 µ (%)	20,1	13,3	7,0	18,2	21,7	19,4	-
Limo 2-50 µ (%)	40,3	37,3	22,8	36,9	43,9	43,4	-
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	37,9	44,4	27,8	27,9	29,7	31,6	-
AF 100-250 µ (%)	0,9	1,4	1,2	1,4	2,8	2,4	-
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	0	0	0	0,8	vest.	0	-
Eq.humedad (%)	23,6	16,8	36,9	30,4	24,6	23,5	-
Re. pasta Ohms	0	0	0	0	0	0	-
Cond. mmhos/cm	0	0	0	0	0	0	-
pH en pasta	6,0	7,0	7,4	7,9	8,0	7,7	-
pH H2O 1:2,5	6,6	7,5	8,3	9,0	9,0	8,7	-
pH KCL 1:2,5	5,4	6,2	6,3	7,4	7,2	6,5	-
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	9,9	5,6	10,7	-	-	8,2	-
Mg++ m.eq./100gr	2,4	2,4	10,8	-	-	7,0	-
Na+ m.eq./100gr	0,7	1,0	3,2	3,2	2,3	2,0	-
K+ m.eq./100gr	2,0	1,4	3,7	3,2	2,8	2,6	-
H+ m.eq./100gr	6,1	2,0	4,1	-	-	-	-
Na (% de T)	4,0	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	-
Suma de Bases	15,0	10,4	28,4	-	-	19,8	-
CIC m.eq./100gr	17,1	9,1	28,1	31,6	24,4	20,0	-
Sat. con bases (%)	88	100	100	-	-	99	-