CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Saboya (Sy)

Descripción

Es un suelo muy oscuro y profundo, de aptitud agrícola, que se encuentra en un paisaje ondulado de antiguas lomas medanosas estabilizadas, en posición de loma de la Subregión Pampa Ondulada alta, bien drenado, desarrollado a partir de sedimentos loéssicos francos, no alcalino, no salino con pendiente de 0,5-1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol típico, franca fina, mixta, térmica (USDA-Soil Taxonomy 2006).

Ubicación del perfil: Latitud: S 34° 26' 10". Longitud: W 62º 39' 12". Altitud: 115 m.s.n.m. a 12,5 Km. al norte de la localidad de Saboya, partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Fotomosaico I.G.M. 3560-10-2.

Variabilidad de las características: No se registraron.

Fases: Por drenaje y alcalinidad.

Series similares: Alem.

Suelos asociados: Estación Naón y Ortiz de Rosas.

Distribución geográfica: Partidos de Lincoln, General Viamonte y Nueve de Julio. Fotomosaico 3560-19.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada a moderadamente rápida.

Uso y vegetación: Agrícola. Cultivo de soja.

Capacidad de uso: I


Limitaciones de uso: Ninguna.

Índice de productividad según la región climática: 85,5 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte argílico, (relación arcilla B/A >1.25).

Descripción del perfil típico:

13 C
Fecha de muestreo: 19 de Agosto de 1966
Reconocedores: Etchevehere



Ap 0-21 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/1) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados rompen a bloques subangulares finos a granular; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.

A 21-28 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco; bloques subangulares medios y fuertes rompe a bloques menores; friable; plástico y adhesivo; escasos barnices; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.

Bt 28-62 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; prismas regulares medios rompe a bloques angulares medios; firme; muy plástico y adhesivo; abundantes raíces; chorreaduras de materia orgánica; límite inferior gradual, suave.

BCc 62-98 cm; pardo rojizo (5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; prismas regulares medios, moderados, que rompe a bloques subangulares y angulares medios; firme; plástico y adhesivo; escasos barnices; raíces comunes; leve reacción de Carbonatos libres en la masa; nódulos cementados; chorreaduras de materia orgánica; límite inferior gradual y suave.

Cck 98-145 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; gris rosado (7,5YR 7/2) en seco; franco arenoso; estructura en bloques subangulares medio fuertes rompe a bloques subangulares medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; concreciones de calcio de 1 cm de diámetro, moteados escasos medios y débiles; escasas raíces; fuerte reacción de Carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	Bt	BCc	Cck
Profundidad (cm)	0-21	21-28	28-62	62-98	98-145
Mat. orgánica (%)	3,39	1,84	0,96	0,38	0,14
Carbono total (%)	1,97	1,07	0,56	0,22	0,08
Nitrógeno (%)	0,178	0,098	0,071	-	-
Relación C/N	11	10,9	7,9	-	-
Arcilla <2 µ (%)	18,9	18,5	23,8	18,7	13,4
Limo 2-20 µ (%)	14,5	16,6	8,9	12,7	8,3
Limo 2-50 µ (%)	29,9	31,8	24,7	24,8	23,5
AMF 50-75 µ (%)	10,7	10,4	10,4	11,6	13,5
AMF 75-100 µ (%)	17,5	20,9	16,7	23,0	17,9
AMF 50-100 µ (%)	28,2	31,3	27,1	34,6	31,4
AF 100-250 µ (%)	22,5	17,8	23,8	21,3	23,6
AM 250-500 µ (%)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9
AG 500-1000 µ (%)	0	0,1	0,1	0,1	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	-	-	-	-	8,2
Eq.humedad (%)	19,9	19,1	20,0	18,1	14,1
Re. pasta Ohms	4964	2836	2925	4875	4609
Cond. mmhos/cm	0	0	0	0	0
pH en pasta	6,0	6,1	6,1	6,4	7,4
pH H2O 1:2,5	7,0	6,8	6,7	6,9	7,9
pH KCL 1:2,5	5,5	5,3	5,3	5,5	6,6
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	8,2	7,3	8,3	9,4	-
Mg++ m.eq./100gr	1,1	2,2	2,7	3,1	-
Na+ m.eq./100gr	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
K+ m.eq./100gr	1,6	1,7	1,6	1,1	1,4
H+ m.eq./100gr	6,1	4,6	4,5	3,4	-
Na (% de T)	2,1	2,3	2,6	2,0	3,2
Suma de Bases	11,2	11,5	13,0	13,9	-
CIC m.eq./100gr	14,0	12,6	15,0	14,8	12,5
Sat. con bases (%)	80	91	87	94	-