CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Tecua (Tcu)

Descripción

Es un suelo moderadamente profundo, de aptitud ganadera, se encuentra en un paisaje muy suavemente ondulado, en la zona de los derrames con "tosca" generalizada, en depresiones cerradas y tendidos bajos en las Sierras y Pedemonte de Tandilia, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos limosos sobre "tosca", levemente salino, sódico de superficie, con pendientes de 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf petrocálcico, limosa fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (Adaptación INTA al USDA- Soil Taxonomy V. 2010). Natralbol típico, limosa fina, illítica, térmica (7ª Aproximacion USDA- Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 37º 23' 00". Longitud O: 60º 34'00". Altitud 216 m.s.n.m., 28 km. al noreste de la ciudad y cabecera del partido de Laprida, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3760-26-2, Voluntad.

Variabilidad de las características: En algunos perfiles el horizonte petrocálcico puede aparecer a los 70 cm. de profundidad.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: La Paulina, Coronel Bunge, Las Margaritas y Miñana.

Suelos asociados: Las Margaritas, Cruzada, Las Hermanas, Elena.

Distribución geográfica: Partidos de General La Madrid y Laprida en las hojas 3760-19, 20, 25, 26, 27 y 28.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Pastura para ganadería, vegetación natural, Pelo de chancho (Disticlis spicata), Gramilla (Cyperaceas sp.).

Capacidad de uso: VII ws


Limitaciones de uso: Moderada profundidad del solum, alcalinidad sódica desde la superficie y peligro de anegamiento.

Índice de productividad según la región climática: 6,17 (A)

Rasgos diagnósticos: En posición depresiones cerradas y tendidos bajos, tiene epipedón ócrico, ubicada en la región climática "D", con régimen de humedad ácuico, horizonte nátrico con mas de 16 % de sodio de intercambio desde la superficie, horizonte petrocálcico (2Ckkm) a los 83 cm. con 35,5 % de CaCo3.

Descripción del perfil típico:

60 C
Fecha de muestreo: Noviembre de 1988



An 0-11 cm; negro (10YR 2/1) húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios, moderados; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.

En 11-17 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico, no adhesivo; abundantes moteados de hierro-manganeso; límite inferior claro, suave.

Btnz 17-41 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas compuestos irregulares, medios, fuertes; firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices de "clayskins"; límite inferior claro, suave.

Btkn 41-61 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios moderados; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices "clayskins" escasos; fuerte reacción a los carbonatos libres en la masa; límite inferior claro, suave.

BCkn 61-83 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; masivo; muy friable; no plástico, no adhesivo; débil reacción a los carbonatos libres en la masa; límite inferior abrupto, suave.

2Ckkm 83-100 cm. a +; costra calcárea, horizonte petrocálcico, gris rosáceo (7,5YR 7/2) en húmedo.

Observaciones: Levemente salino desde los 17 cm. de profundidad.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	En	Btnz	Btkn	BCkn	2Ckkm
Profundidad (cm)	0-11	11-17	17-41	41-61	61-83	83 a +
Mat. orgánica (%)	5,10	1,14	0,98	0,41	0,33	0,31
Carbono total (%)	2,90	0,66	0,56	0,23	0,19	0,18
Nitrógeno (%)	0,346	0,065	0,052	-	-	-
Relación C/N	8,4	10,1	10,7	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	21,6	13,4	36,1	33,1	29,1	23,3
Limo 2-20 µ (%)	32,7	34,9	20,5	21,9	22,4	17,2
Limo 2-50 µ (%)	51,0	59,7	34,4	36,9	36,7	26,6
AMF 50-75 µ (%)	16,3	18,5	17,9	17,8	18,2	8,0
AMF 75-100 µ (%)	8,2	4,5	7,7	9,6	11,7	3,8
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	2,9	3,9	3,4	2,6	4,3	5,8
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0,5	vest.	vest.	35,5
Eq.humedad (%)	27,5	17,3	56,4	45,1	38,7	31,4
Re. pasta Ohms	2926	3251	812	786	1035	931
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,5	7,2	7,5	8,5	8,7	8,6
pH H2O 1:2,5	7,5	8,0	8,9	9,3	9,3	9,5
pH KCL 1:2,5	6,0	6,1	6,4	7,1	6,9	7,3
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	11,9	5,7	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2,6	1,6	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	3,3	3,5	13,8	2,8	15,7	12,6
K+ m.eq./100gr	1,3	0,7	2,2	3,1	1,9	1,5
H+ m.eq./100gr	3,4	2,4	-	-	-	-
Na (% de T)	16	33	43	9	51	41
Suma de Bases	19,1	11,5	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	20,2	10,6	32,2	31,6	30,8	30,8
Sat. con bases (%)	94	100	-	-	-	-