CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Aarón Castellanos (AC)

Descripción

Es un suelo profundo, de textura media, con aptitud ganadera que ocupa la periferia de ciertas depresiones y los planos bajos o tendidos con drenaje deficiente, tiene rasgos hidromórficos, situada en la Subregión Pampa Ondulada alta, pobremente drenado, desarrollado a partir de materiales franco limosos, no salino, fuertemente alcalino-sódico desde los 40 cm. de profundidad.

Clasificación taxonómica: Natralbol típico, franca fina, mixta, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2006)

Ubicación del perfil: Latitud: S 34º 10' 21''. Longitud W 61º 51' 00''. Altitud 95 m.s.n.m. a 13,5 km al SSO de la estación (F.N.G.M.B.) Sancti Spiritu, departamento General López, provincia de Santa Fe. Hoja I.G.M. 3563-5-2.

Variabilidad de las características: La capa freática puede hallarse cercana a la superficie y en general satura algunos horizontes en la parte inferior del perfil gran parte del año.

Fases: No presenta.

Series similares: Wheelwright (Familia Fina).

Suelos asociados: Santa Isabel, Saforcada, San Gregorio y María Teresa.

Distribución geográfica: Sur del departamento General López y Sud-sudoeste del partido General Arenales. Hoja I.G.M. 3563-6, Villa Cañás.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Pastura natural.

Capacidad de uso: VI ws

Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica.

Índice de productividad según la región climática: 17,50 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes diagnósticos álbico y nátrico, con rasgos de hidromorfismo.

Descripción del perfil típico:

1 C
Fecha de muestreo: 1976
Reconocedores: Alfieri - Ocampo - Bisonni - Aparicio

A1 0-18 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; muy friable; ligeramente duro; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto y ondulado.

E 18-32 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares fuertes; muy friable; duro; límite inferior abrupto y ondulado.

Btn 32-69 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco a franco arcilloso; semicolumnar media débil; firme; muy duro; plástico y adhesivo; límite inferior claro y ondulado.

BCn 69-95 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco a franco arcilloso; bloques angulares irregulares medios moderados; friable; duro; plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes medios y precisos.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A1	E	Btn	BCn
Profundidad (cm)	5-15	25-30	40-60	75-80
Mat. orgánica (%)	2,43	0,61	-	-
Carbono total (%)	1,41	0,38	-	-
Nitrógeno (%)	0,150	0,055	-	-
Relación C/N	10	7	-	-
Arcilla <2 µ (%)	15,9	13,6	27,5	20,9
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	27,7	25,5	21,1	25,2
AMF 50-75 µ (%)	26,8	27,6	22,4	18,7
AMF 75-100 µ (%)	27,5	30,9	26,3	32,0
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	2,2	2,3	2,7	3,2
AM 250-500 µ (%)	0,1	0,1	-	-
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	Vest	Vest
Eq.humedad (%)	18,5	12,6	25,6	22,9
Re. pasta Ohms	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-
pH en pasta	5,9	6,9	8,4	8,5
pH H2O 1:2,5	6,9	7,9	9,2	9,3
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	7,0	10,8	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2,8	3,0	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,4	0,4	9,0	11,0
K+ m.eq./100gr	2,3	2,2	4,7	5,1
H+ m.eq./100gr	4,4	2,0	-	-
Na (% de T)	2,8	2,4	35,8	46,4
Suma bases	12,5	16,4	-	-
CIC m.eq./100gr	14,1	16,6	25,3	23,7
Sat. con bases (%)	-	-	88	98