CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Ameghino (Agh)

Descripción

Es un suelo franco arenoso profundo, de color pardo oscuro a pardo. Se encuentra en posición de lomas, en pendientes de 0 a 1 %. Es algo excesivamente drenado; de escurrimiento medio y permeabilidad moderadamente rapida. La vegetacion es trigo. Su limitación de uso esta dada por la baja capacidad de retencion de humedad.

Clasificación taxonómica: Hapludol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Ubicación del perfil: Latitud S 34º 52' 19.2". Longitud: W 62º 24' 26.7", Altura 120 msnm, estancia del Sr. Moreno, a 6,3 km al ESE de la localidad de Ameghino, partido de Florentino Ameghino, Hoja 3563-17-3.

Drenaje y permeabilidad: Algo excesivamente drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente rápida.


Uso y vegetación: Trigo.

Limitaciones de uso: Baja capacidad de retención de humedad.

Índice de productividad según la región climática: 51(B), 48(C), 46(D)

Descripción del perfil típico:

37 C
Fecha de toma de muestra: 21 de Agosto de 1987



A1 0-36 cm; parduzco (7.5YR 5/3) en seco; pardo oscuro (7.5YR 3/3) en húmedo; franco arenoso; estructura en bloques subangulares, finos, débiles, que rompen a granular; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; límite gradual, suave.

AC 36-74 cm; pardo oscuro (7.5YR 3/4) en húmedo; franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos, débiles con tendencia masiva; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; límite gradual, suave.

C 74-140 cm; pardo claro (7.5YR 6/4) en seco, pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A1	AC	C
Profundidad (cm)	10-26	41-69	79-135
Mat. orgánica (%)	1.33	0.52	0.10
Carbono Orgánico (%)	0.77	0.30	0.06
Nitrógeno (%)	0.090	0.043	-
Relación C/N	9	7	-
Fósforo asimilable (ppm)	13.6	2.6	2.3
Arcilla <2 µ (%)	13.1	13.5	11.7
Limo 2-20 µ (%)	4.7	1.5	6.5
Limo 2-50 µ (%)	9.3	8.5	8.2
AMF 50-74 µ (%)	4.5	6.0	3.9
AMF 74-100 µ (%)	20.0	23.7	24.8
AMF 50-100 µ (%)	24.5	29.7	28.7
AF 100-250 µ (%)	47.0	45.1	47.3
AM 250-500 µ (%)	5.8	3.0	3.8
AG 500-1000 µ (%)	0.3	0.2	0.3
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-
Eq.humedad (%)	19.3	14.8	13.8
Cond. de la pasta (mmhs/cm)	-	-	-
pH en pasta	6.0	6.1	6.5
pH H2O 1:2,5	6.3	6.5	7.1
pH KCL 1:2,5	5.2	5.2	5.5
Cationes de cambio			
Ca++ m.eq./100gr	5.2	4.5	3.8
Mg++ m.eq./100gr	2.4	2.0	2.5
Na+ m.eq./100gr	0.3	0.3	0.4
K+ m.eq./100gr	1.4	0.9	0.9
PSI (%)	-	-	-
Agua de Saturación (%)	-	-	-
Suma de bases [cmol (+)/kg] (S)	9.3	7.7	7.6
CIC [cmol (+)/kg] (T)	8.0	7.2	6.4
Saturación de bases (%) (S/T)	100	100	100
Saturación (%) (S+H)	-	-	-